

Standard de la Faune Européenne d'Élevage



Table des matières

1	Participations	12
2	Passereaux	13
3	1.Généralité et jugement	19
4	2.Motacillidae	25
4.1	Bergeronnettes	25
4.1.1	Bergeronnette grise (<i>Motacilla alba</i>)	25
4.1.2	Bergeronnette des ruisseaux (<i>Motacilla cinerea</i>)	28
4.1.3	Bergeronnette printanière (<i>Motacilla flava</i>)	30
5	3.Bombycillidae	32
5.1	Jaseur	32
5.1.1	Jaseur boréal (<i>Bombycilla garrulus</i>)	32
6	4.Prunellidae	35
6.1	Accenteurs	35
6.1.1	Accenteur mouchet (<i>Prunella modularis</i>)	35
6.1.2	Accenteur alpin (<i>Prunella colleris</i>)	38
7	5.Turdidae	40
7.1	Rossignols	40
7.1.1	Rossignol philomèle (<i>Luscinia megarhynchos</i>)	40
7.1.2	Rossignol progné (<i>Luscinia luscinia</i>)	42
7.2	Rouge gorge	44
7.2.1	Rouge gorge (<i>Erithacus rubecula</i>)	44
7.3	Calliope	47
7.3.1	Calliope sibérienne (<i>Luscinia calliope</i>)	47
7.3.2	Gorgebleue à miroir (<i>Luscinia svecica</i>)	49
7.4	Tarriers	53
7.4.1	Tarier pâtre Mâle (<i>Saxicola torquata</i>)	53
7.4.2	Tarier pâtre Femelle (<i>Saxicola torquata</i>)	56
7.4.3	Tarier des près (<i>Saxicola rubetra</i>)	58
7.5	Rouges-queues	60
7.5.1	Rouge queue noir (<i>Phoenicurus ochruros</i>)	60
7.5.2	Rouge queue noir à front blanc (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	64
7.6	Monticules	66
7.6.1	Merle bleu (<i>Monticola solitarius</i>)	66
7.6.2	Merle de roche (<i>Monticola saxatilis</i>)	68

7.7	Merles	70
7.7.1	Merle noir Mâle (<i>Turdus merula</i>)	70
7.7.2	Merle noir Femelle (<i>Turdus merula</i>)	72
7.7.3	Merle noir Mâle Brun (<i>Turdus merula</i>)	74
7.7.4	Merle noir Femelle Brune (<i>Turdus merula</i>)	76
7.7.5	Merle noir Mâle Argenté Ancienne dénomination Pastel- (<i>Turdus merula</i>)	78
7.7.6	Merle noir Femelle Argenté Ancienne dénomination Pastel- (<i>Turdus merula</i>)	81
7.7.7	Merle noir Mâle Ancestral Dilué (<i>Turdus merula</i>)	83
7.7.8	Merle noir Femelle Ancestral Dilué (<i>Turdus merula</i>)	88
7.7.9	Merle noir Mâle Brun Argenté (ex- Brun Dilué)	90
7.7.10	Merle noir Femelle Brun Argenté (ex- Brun Dilué) (<i>Turdus</i> <i>merula</i>)	92
7.7.11	Merle noir Mâle Grizzle (<i>Turdus merula</i>)	94
7.7.12	Merle noir Mâle Siam (<i>Turdus merula</i>)	96
7.7.13	Merle noir Albinos (<i>Turdus merula</i>)	99
7.7.14	Merle noir Blanc (<i>Turdus merula</i>)	101
7.7.15	Merle à plastron (<i>Turdus torquatus alpestris</i>)	103
7.8	Grives	105
7.8.1	Grive musicienne (<i>Turdus philomelos</i>)	105
7.8.2	Grive musicienne Brune (<i>Turdus philomelos</i>)	107
7.8.3	Grive musicienne Blanche (<i>Turdus philomelos</i>)	110
7.8.4	Grive musicienne Satiné (<i>Turdus philomelos</i>)	112
7.8.5	Grive draine (<i>Turdus viscivorus</i>)	114
7.8.6	Grive mauvis (<i>Turdus iliacus</i>)	116
7.8.7	Grive mauvis Brune (<i>Turdus iliacus</i>)	118
7.8.8	Grive mauvis Facteur Foncé (<i>Turdus iliacus</i>)	121
7.8.9	Grive litorne (<i>Turdus pilaris</i>)	123
8	6.Sylviidae	125
8.1	Fauvettes	125
8.1.1	Fauvette à tête noire (<i>Sylvia atricapilla</i>)	125
8.1.2	Fauvette des jardins (<i>Sylvia borin</i>)	128
8.1.3	Fauvette grisette (<i>Sylvia communis</i>)	130
9	7.Panurinae	132
9.1	Panure à moustache	132
9.1.1	Panure à moustache (<i>Panurus biarmicus</i>)	132

10 8.Aegithalidae	135
10.1 Mésange à longue queue	135
10.1.1 Mésange à longue queue (<i>Aegithalos caudatus</i>)	135
11 9.Remiidae	137
11.1 Mésange rémiz	137
11.1.1 Mésange rémiz penduline (<i>Remiz pendulinus</i>)	137
12 10.Paridae	139
12.1 Mésanges	139
12.1.1 Mésange huppée (<i>Parus cristatus</i>)	139
12.1.2 Mésange nonnette (<i>Parus palustris</i>)	141
12.1.3 Mésange boréale (<i>Parus montanus</i>)	143
12.1.4 Mésange noire (<i>Parus ater</i>)	145
12.1.5 Mésange charbonnière (<i>Parus major</i>)	147
12.1.6 Mésange azurée (<i>Parus cyanus</i>)	149
12.1.7 Mésange bleue (<i>Parus caeruleus</i>)	151
13 11.Sittidae	153
13.1 Sittelle	153
13.1.1 Sittelle torchepot (<i>Sitta europea</i>)	153
14 12.Corvidae	156
14.1 Geai	156
14.1.1 Geai des chênes (<i>Garrulus glandarius</i>)	156
14.1.2 Geai des chênes Opale (<i>Garrulus glandarius</i>)	158
14.2 Pies	160
14.2.1 Pie bavarde (<i>Pica pica</i>)	160
14.2.2 Pie bavarde Brune (<i>Pica pica</i>)	162
14.2.3 Pie bleue (<i>Cyanopica cyanus</i>)	164
14.3 Corbeaux	166
14.3.1 Corbeau freux (<i>Corvus frugilegus</i>)	166
14.3.2 Corneille noire (<i>Corvus corone corone</i>)	168
14.3.3 Corneille mantelée (<i>Corvus corone cornix</i>)	170
14.3.4 Choucas des tours (<i>Coloeus monedula</i>)	172
14.3.5 Grand corbeau (<i>Corvus corax</i>)	174
15 13.Sturnidae	176
15.1 Étourneaux	176
15.1.1 Étourneau sansonnet (<i>Sturnus vulgaris</i>)	176
15.1.2 Étourneau sansonnet Brun (<i>Sturnus vulgaris</i>)	179

15.1.3	Étourneau sansonnet Agate (<i>Sturnus vulgaris</i>)	181
15.1.4	Étourneau sansonnet Phéo (<i>Sturnus vulgaris</i>)	183
15.1.5	Étourneau sansonnet Blanc (<i>Sturnus vulgaris</i>)	186
15.1.6	Étourneau sansonnet Pastel (<i>Sturnus vulgaris</i>)	188
15.1.7	Étourneau rose (<i>Sturnus roseus</i>)	190
16	14. Passeridae	192
16.1	Niverolle	192
16.1.1	Niverolle (<i>Montifringilla nivallis</i>)	192
16.2	Moineaux	195
16.2.1	Moineau soulcie (<i>Petronia petronia</i>)	195
16.2.2	Moineau Espagnol (<i>Passer hispaniolensis</i>)	197
16.2.3	Moineau Cisalpin (<i>Passer italiae</i>)	199
16.2.4	Moineau Domestique Mâle (<i>Passer domesticus</i>)	201
16.2.5	Moineau Domestique Femelle (<i>Passer domesticus</i>)	203
16.2.6	Moineau Domestique Mâle Brun (<i>Passer domesticus</i>)	205
16.2.7	Moineau Domestique Femelle Brune (<i>Passer domesticus</i>)	207
16.2.8	Moineau Domestique Mâle Phéo Récessif (<i>Passer domesti-</i> <i>cus</i>)	209
16.2.9	Moineau Domestique Femelle Phéo Récessif (<i>Passer do-</i> <i>mesticus</i>)	211
16.2.10	Moineau Domestique Mâle Phéo Dominant (<i>Passer domes-</i> <i>ticus</i>)	213
16.2.11	Moineau Domestique Femelle Phéo Dominant (<i>Passer do-</i> <i>mesticus</i>)	215
16.2.12	Moineau Domestique Mâle Agate (<i>Passer domesticus</i>)	217
16.2.13	Moineau Domestique Femelle Agate (<i>Passer domesticus</i>)	219
16.2.14	Moineau Domestique Pastel (<i>Passer domesticus</i>)	221
16.2.15	Moineau Domestique Silice SF (<i>Passer domesticus</i>)	223
16.2.16	Moineau Domestique Mâle Opale (<i>Passer domesticus</i>)	225
16.2.17	Moineau Domestique Femelle Opale (<i>Passer domesticus</i>)	227
16.2.18	Moineau Domestique Mâle brun pastel (<i>Passer domesticus</i>)	229
16.2.19	Moineau Domestique Femelle brun pastel (<i>Passer domesti-</i> <i>cus</i>)	232
16.2.20	Moineau Domestique Ino (ex-albino) (<i>Passer domesticus</i>)	235
16.2.21	Moineau Domestique Blanc (<i>Passer domesticus</i>)	238
16.2.22	Moineau Domestique Mâle Satiné (<i>Passer domesticus</i>)	240
16.2.23	Moineau Domestique Femelle Satiné (<i>Passer domesticus</i>)	242
16.2.24	Moineau Friquet (<i>Passer montanus</i>)	244
16.2.25	Moineau Friquet Opale (<i>Passer montanus</i>)	246
16.2.26	Moineau Friquet Brun (<i>Passer montanus</i>)	248

16.2.27	Moineau Friquet Brun Opale (<i>Passer montanus</i>)	250
17 15.	Fringillidae	252
17.1	Pinsons	252
17.1.1	Pinson des arbres Mâle (<i>Fringilla coelebs</i>)	252
17.1.2	Pinson des arbres Femelle (<i>Fringilla coelebs</i>)	255
17.1.3	Pinson des arbres Mâle Brun (<i>Fringilla coelebs</i>)	257
17.1.4	Pinson des arbres Femelle Brun (<i>Fringilla coelebs</i>)	259
17.1.5	Pinson des arbres Mâle Agate (<i>Fringilla coelebs</i>)	261
17.1.6	Pinson des arbres Femelle Agate (<i>Fringilla coelebs</i>)	263
17.1.7	Pinson des arbres Mâle Opale (<i>Fringilla coelebs</i>)	265
17.1.8	Pinson des arbres Femelle Opale (<i>Fringilla coelebs</i>)	267
17.1.9	Pinson des arbres Mâle et Femelle Brun-Opale (<i>Fringilla coelebs</i>)	269
17.1.10	Pinson du Nord (<i>Fringilla montifringilla</i>)	271
17.1.11	Pinson du Nord Mâle (<i>Fringilla montifringilla</i>)	273
17.1.12	Pinson du Nord Femelle (<i>Fringilla montifringilla</i>)	276
17.2	Venturons	278
17.2.1	Venturon montagnard (<i>Carduelis cintrinella</i>)	278
17.2.2	Venturon montagnard Mâle (<i>Carduelis cintrinella</i>)	279
17.2.3	Venturon montagnard Femelle (<i>Carduelis cintrinella</i>)	281
17.2.4	Venturon Corse Mâle (<i>Carduelis corsicana</i>)	282
17.2.5	Serin des canaris Mâle (<i>Serinus canaria</i>)	283
17.2.6	Serin des canaris Femelle (<i>Serinus canaria</i>)	286
17.3	Serins	289
17.3.1	Serin cini (<i>Serinus serinus</i>)	289
17.3.2	Serin cini Mâle (<i>Serinus serinus</i>)	290
17.3.3	Serin cini Femelle (<i>Serinus serinus</i>)	292
17.4	Sizerins	293
17.4.1	Sizerin flammé (<i>Acanthis flammea flammea</i>)	293
17.4.2	Sizerin cabaret (<i>Acanthis flammea cabaret</i>)	294
17.4.3	Sizerin flammé (<i>Acanthis flammea flammea</i>)	296
17.4.4	Sizerin flammé Brun (<i>Acanthis flammea flammea</i>)	297
17.4.5	Sizerin flammé Pastel (<i>Acanthis flammea flammea</i>)	299
17.4.6	Sizerin flammé Brun-Pastel (<i>Acanthis flammea flammea</i>)	301
17.4.7	Sizerin flammé Écaillé (<i>Acanthis flammea flammea</i>)	303
17.4.8	Sizerin flammé Brun-Écaillé (<i>Acanthis flammea flammea</i>)	305
17.4.9	Sizerin flammé Facteur Foncé (<i>Acanthis flammea flammea</i>)	307
17.4.10	Sizerin flammé Pastel Facteur Foncé (<i>Acanthis flammea flammea</i>)	309

17.4.11	Sizerin flammé Brun Facteur Foncé (<i>Acanthis flammea flammea</i>)	311
17.4.12	Sizerin flammé Phéo (<i>Acanthis flammea flammea</i>)	313
17.4.13	Sizerin blanchâtre (<i>Acanthis hornemanni</i>)	315
17.5	Linottes	318
17.5.1	Linotte mélodieuse (<i>Linaria cannabina</i>)	318
17.5.2	Linotte mélodieuse Mâle (<i>Linaria cannabina</i>)	319
17.5.3	Linotte mélodieuse Femelle (<i>Linaria cannabina</i>)	322
17.5.4	Linotte à bec jaune (<i>Linaria flavirostris</i>)	323
17.5.5	Linotte à bec jaune (<i>Linaria flavirostris</i>)	324
17.6	Tarin des aulnes	326
17.6.1	Tarin des aulnes (<i>Spinus spinus</i>)	326
17.6.2	Tarin des aulnes Mâle (<i>Spinus spinus</i>)	327
17.6.3	Tarin des aulnes Femelle (<i>Spinus spinus</i>)	329
17.6.4	Tarin des aulnes Mâle Brun (<i>Spinus spinus</i>)	331
17.6.5	Tarin des aulnes Femelle Brune (<i>Spinus spinus</i>)	334
17.6.6	Tarin des aulnes Mâle Agate (<i>Spinus spinus</i>)	336
17.6.7	Tarin des aulnes Femelle Agate (<i>Spinus spinus</i>)	338
17.6.8	Tarin des aulnes Mâle Brun Dilué (<i>Spinus spinus</i>)	340
17.6.9	Tarin des aulnes Femelle Brun Dilué (<i>Spinus spinus</i>)	342
17.6.10	Tarin des aulnes Mâle Brun Double Dilué (<i>Spinus spinus</i>)	344
17.6.11	Tarin des aulnes Femelle Brune Double Dilué (<i>Spinus spinus</i>)	347
17.6.12	Tarin des aulnes Mâle Vert Dilué (<i>Spinus spinus</i>)	349
17.6.13	Tarin des aulnes Femelle Verte Dilué (<i>Spinus spinus</i>)	351
17.6.14	Tarin des aulnes Mâle Vert Double Dilué (<i>Spinus spinus</i>)	353
17.6.15	Tarin des aulnes Femelle Verte Double Diluée (<i>Spinus spinus</i>)	355
17.6.16	Tarin des aulnes Mâle Pastel (<i>Spinus spinus</i>)	357
17.6.17	Tarin des aulnes Femelle Pastel (<i>Spinus spinus</i>)	360
17.6.18	Tarin des aulnes Mâle Pastel Dilué (<i>Spinus spinus</i>)	362
17.6.19	Tarin des aulnes Femelle Pastel Dilué (<i>Spinus spinus</i>)	364
17.6.20	Tarin des aulnes Mâle Brun Pastel (<i>Spinus spinus</i>)	366
17.6.21	Tarin des aulnes Femelle Brun Pastel (<i>Spinus spinus</i>)	369
17.6.22	Tarin des aulnes Mâle Brun Pastel Dilué (<i>Spinus spinus</i>)	371
17.6.23	Tarin des aulnes Femelle Brun Pastel Dilué (<i>Spinus spinus</i>)	373
17.6.24	Tarin des aulnes Mâle Ivoire (<i>Spinus spinus</i>)	375
17.6.25	Tarin des aulnes Femelle Ivoire (<i>Spinus spinus</i>)	377
17.6.26	Tarin des aulnes Mâle Pastel Ivoire (<i>Spinus spinus</i>)	379
17.6.27	Tarin des aulnes Femelle Pastel Ivoire (<i>Spinus spinus</i>)	381
17.7	Chardonnerets	383

17.7.1	Chardonneret élégant (<i>Carduelis carduelis carduelis</i>)	383
17.7.2	Chardonneret Frigoris (<i>Carduelis carduelis frigoris</i>)	385
17.7.3	Chardonneret Britannica (<i>Carduelis carduelis britannica</i>)	386
17.7.4	Chardonneret Parva (<i>Carduelis carduelis parva</i>)	387
17.7.5	Chardonneret Tschusii (<i>Carduelis carduelis tschusii</i>)	388
17.7.6	Chardonneret élégant (<i>Carduelis carduelis carduelis</i>)	389
17.7.7	Chardonneret élégant Brun (<i>Carduelis carduelis carduelis</i>)	391
17.7.8	Chardonneret élégant Agate (<i>Carduelis carduelis carduelis</i>)	394
17.7.9	Chardonneret élégant Pastel (<i>Carduelis carduelis carduelis</i>)	397
17.7.10	Chardonneret élégant Isabelle (<i>Carduelis carduelis carduelis</i>)	401
17.7.11	Chardonneret élégant Satiné (<i>Carduelis carduelis carduelis</i>)	403
17.7.12	Chardonneret élégant Blanc avec masque orange (<i>Carduelis carduelis carduelis</i>)	405
17.7.13	Chardonneret élégant Jaune (<i>Carduelis carduelis carduelis</i>)	407
17.7.14	Chardonneret élégant Aminet (<i>Carduelis carduelis carduelis</i>)	409
17.7.15	Chardonneret élégant Opale (<i>Carduelis carduelis carduelis</i>)	412
17.7.16	Chardonneret élégant Tête blanche Ancestral (<i>Carduelis carduelis carduelis</i>)	415
17.7.17	Chardonneret élégant Tête blanche Brun (<i>Carduelis carduelis carduelis</i>)	417
17.7.18	Chardonneret élégant Tête blanche Agate (<i>Carduelis carduelis carduelis</i>)	419
17.7.19	Chardonneret élégant Tête blanche Isabelle (<i>Carduelis carduelis carduelis</i>)	421
17.7.20	Chardonneret élégant Tête blanche Lutino (<i>Carduelis carduelis carduelis</i>)	423
17.7.21	Chardonneret élégant Tête blanche Satiné (<i>Carduelis carduelis carduelis</i>)	425
17.8	Verdiers	427
17.8.1	Verdier d'Europe (<i>Chloris chloris chloris</i>)	427
17.8.2	Verdier d'Europe (<i>Chloris chloris aurantiiventris</i>)	428
17.8.3	Verdier d'Europe Mâle (<i>Chloris chloris chloris</i>)	429
17.8.4	Verdier d'Europe Femelle (<i>Chloris chloris chloris</i>)	432
17.8.5	Verdier d'Europe Mâle Brun (<i>Chloris chloris chloris</i>)	434
17.8.6	Verdier d'Europe Femelle Brune (<i>Chloris chloris chloris</i>)	436
17.8.7	Verdier d'Europe Mâle Agate (<i>Chloris chloris chloris</i>)	438
17.8.8	Verdier d'Europe Femelle Agate (<i>Chloris chloris chloris</i>)	441
17.8.9	Verdier d'Europe Mâle Isabelle (<i>Chloris chloris chloris</i>)	443
17.8.10	Verdier d'Europe Femelle Isabelle (<i>Chloris chloris chloris</i>)	445

17.8.11 Verdier d'Europe Mâle Isabelle Satiné (<i>Chloris chloris chloris</i>)	447
17.8.12 Verdier d'Europe Femelle Isabelle Satiné (<i>Chloris chloris chloris</i>)	449
17.8.13 Verdier d'Europe Mâle Agate Satiné (<i>Chloris chloris chloris</i>)	451
17.8.14 Verdier d'Europe Femelle Agate Satiné (<i>Chloris chloris chloris</i>)	453
17.8.15 Verdier d'Europe Vert Pastel (<i>Chloris chloris chloris</i>)	455
17.8.16 Verdier d'Europe Mâle Agate Pastel (<i>Chloris chloris chloris</i>)	457
17.8.17 Verdier d'Europe Femelle Agate Pastel (<i>Chloris chloris chloris</i>)	459
17.8.18 Verdier d'Europe Mâle et Femelle Isabelle Pastel (<i>Chloris chloris chloris</i>)	461
17.8.19 Verdier d'Europe Mâle et Femelle Brun Pastel (<i>Chloris chloris chloris</i>)	463
17.8.20 Verdier d'Europe Ancestral Bec Jaune (<i>Chloris chloris chloris</i>)	465
17.8.21 Verdier d'Europe Brun Bec Jaune (<i>Chloris chloris chloris</i>)	467
17.8.22 Verdier d'Europe Mâle Agate Bec Jaune (<i>Chloris chloris chloris</i>)	469
17.8.23 Verdier d'Europe Femelle Agate Bec Jaune (<i>Chloris chloris chloris</i>)	471
17.8.24 Verdier d'Europe Mâle Isabelle Bec Jaune (<i>Chloris chloris chloris</i>)	473
17.8.25 Verdier d'Europe Femelle Isabelle Bec Jaune (<i>Chloris chloris chloris</i>)	475
17.8.26 Verdier Maltais (Major) (<i>Chloris chloris chloris</i>)	477
17.9 Bouvreuils	483
17.9.1 Bouvreuil pivoine (<i>Pyrrhula pyrrhula europaea</i>)	483
17.9.2 Bouvreuil ponceau (<i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i>)	484
17.9.3 Bouvreuil pivoine ibérique (<i>Pyrrhula pyrrhula iberiae</i>)	485
17.9.4 Bouvreuil pivoine (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	487
17.9.5 Bouvreuil pivoine Mâle Brun (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	490
17.9.6 Bouvreuil pivoine Femelle Brune (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	493
17.9.7 Bouvreuil pivoine pastel (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	495
17.9.8 Bouvreuil pivoine Mâle Brun Pastel (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	498
17.9.9 Bouvreuil pivoine Femelle Brune Pastel (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	500
17.9.10 Bouvreuil pivoine blanc (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	502
17.9.11 Bouvreuil pivoine jaune (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	504

17.9.12	Bouvreuil pivoine Mâle brun pastel jaune (<i>Pyrrhula pyr-</i> <i>rhula</i>)	506
17.9.13	Bouvreuil pivoine Mâle Topaze (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	508
17.9.14	Bouvreuil pivoine Femelle Topaze (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	510
17.10	Gros bec casse-noyaux	512
17.10.1	Gros bec casse-noyaux (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)	512
17.10.2	Gros bec casse-noyaux Mâle (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)	513
17.10.3	Gros bec casse-noyaux Femelle (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)	515
17.11	Roselin githagine	516
17.11.1	Roselin githagine (<i>Rhodopechys githaginea</i>)	516
17.11.2	Roselin githagine (<i>Rhodopechys githaginea</i>)	517
17.11.3	Roselin cramoisi Mâle (<i>Carpodacus erythrinus</i>)	520
17.11.4	Roselin cramoisi Femelle (<i>Carpodacus erythrinus</i>)	522
17.12	Durbec des sapins	524
17.12.1	Durbec des sapins (<i>Pinicola enucleator</i>)	524
17.12.2	Durbec des sapins Mâle (<i>Pinicola enucleator</i>)	525
17.13	Bec croisé	527
17.13.1	Bec croisé des sapins (<i>Loxia curvirostra</i>)	527
17.13.2	Bec croisé des sapins Mâle (<i>Loxia curvirostra</i>)	528
17.13.3	Bec croisé des sapins Femelle (<i>Loxia curvirostra</i>)	530
17.13.4	Bec croisé bifascié (<i>Loxia leucoptera</i>)	531
17.13.5	Bec croisé bifascié Mâle (<i>Loxia leucoptera</i>)	532
17.13.6	Bec croisé bifascié Femelle (<i>Loxia leucoptera</i>)	534
17.13.7	Bec croisé perroquet (<i>Loxia pytyopsittacus</i>)	535
17.13.8	Bec croisé perroquet Mâle (<i>Loxia pytyopsittacus</i>)	536
17.13.9	Bec croisé perroquet Femelle (<i>Loxia pytyopsittacus</i>)	538
18	16.Emberizidae	539
18.1	Bruants	539
18.1.1	Bruant fou (<i>Emberiza cia</i>)	539
18.1.2	Bruant mélanocéphale (<i>Emberiza melanocephala</i>)	541
18.1.3	Bruant ortolan (<i>Emberiza hortulanus</i>)	543
18.1.4	Bruant zizi (<i>Emberiza cirrus</i>)	546
18.1.5	Bruant à tête rousse Mâle (<i>Emberiza bruniceps</i>)	548
18.1.6	Bruant à tête rousse Femelle (<i>Emberiza bruniceps</i>)	550
18.1.7	Bruant des roseaux Mâle (<i>Emberiza schoeniclus</i>)	552
18.1.8	Bruant des roseaux Femelle (<i>Emberiza schoeniclus</i>)	554
18.1.9	Bruant Jaune (<i>Emberiza citrinella</i>)	556
18.1.10	Bruant proyer (<i>Emberiza calandra</i>)	559

1 Participations

Ont Participé à l'élaboration de ce standard :

Jacques FAIVRE, François VUILLAUME, Enrique GOMEZ,
Lionel DUROCHAT, Jean-Michel EYTORFF, David VETTESE,
Jean-Luc BERBUDEAU.

Documentations : UOF, FOI, FOA, KBOF.

Photographies : P. Rocher, E. Gomez, S. Chartier, R. Driesmans, J-M Eytorff,
J-L Berbudeau, B. Cormelieu, A. Cupido, Cazadilla, Mingeroot, P. Malburet,
J-P. Hennebique, Rafael Rios Arena, L. Durochat, R. Rojas, A. Van, D. Vettese.

Merçi aux auteurs de nous avoir permis la publication de leurs photos.
Un merçi tout particulier à Hermann Heinzl pour ses illustrations.

Terminé le 26 Mai 2014.

Modifié partiellement par la CNJF le 5 avril 2024.

**La reproduction et l'utilisation de ces
documents sont interdites sans
l'autorisation de leurs auteurs
ainsi que de la COM/OMJ.**

2 Passereaux

Ils font partie de l'ordre des Passériformes. Il s'agit d'oiseaux généralement petits sauf les corbeaux (Corvidae).

1. Généralité et Jugement

2. Motacillidae

Bergeronnettes

- Bergeronnette grise (*Motacilla alba*)
- Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*)
- Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*)

3. Bombycillidae : Bec assez court et épais.

Jaseurs

- Jaseur boréal (*Bombycilla garrulus*)

4. Prunellidae : Petits oiseaux terrestres ressemblant à des moineaux mais différents par un bec fin d'insectivore et par des flancs striés. Ils sautillent ou marchent comme s'ils se traînaient en entrouvrant souvent les ailes.

Accenteurs

- Accenteur mouchet (*Prunella modularis*)
- Accenteur alpin (*Prunella collaris*)

5. Turdidae : Vaste famille réunissant plusieurs milliers des meilleurs chanteurs européens. Tous sont insectivores et frugivores. Ils courent ou sautillent.

Rosignols

- Rossignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*)
- Rossignol progné *Luscinia luscinia*)

Rouge gorge

- Rouge gorge (*Erythacus rubecula*)

Calliopes

- Calliope sibérienne (*Luscinia calliope*)
- Gorge bleue à miroir (*Luscinia svecica*)

Tarriers

- Tarier pâle (*Saxicola torquata*)
- Tarier des prés (*Saxicola rubetra*)

Rouge queue

- Rouge queue noir (*Phoenicurus ochruros*)
- Rouge queue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*)

Monticules

- Merle bleu (*Monticola solitarius*)
- Merle de roche (*Monticola saxatilis*)

Merle

- Merle noir (*Turdus merula*)
- Merle à plastron (*Turdus torquatus alpestris*)

Grives

- Grive litorne (*Turdus pilaris*)
- Grive mauvis (*Turdus iliacus*)
- Grive musicienne (*Turdus philomelos*)
- Grive draine (*Turdus viscivorus*)

6. **Sylviidae** : Petits passereaux insectivores. Sexes généralement semblables, juvéniles comme adultes.

Fauvettes

- Fauvette des jardins (*Sylvia borin*)
- Fauvette grisette (*Sylvia communis*)
- Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*)

7. **Panurinae (Timallidae)** : ressemblent superficiellement aux « mésanges » à longue queue.

Panure à moustache

- Panure à moustache (*Panurus biarmicus*)

8. **Aegithalidae** : Petit oiseau au bec très court, longue queue étagée correspondant à plus de la moitié de la longueur totale.

Mésange à longue queue

- Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus*)

9. **Remizidae** : Allure de mésange, mais le bec est un peu plus long et fin. Oiseau actif et acrobate.

Mésange Rémiz

- Mésange Rémiz (*Remiz pendulinus*)

-
10. **Paridae** : Petits oiseaux insectivores très actifs, acrobates. Sexes semblables.

Mésanges

- Mésange huppée (*Parus cristatus*)
- Mésange nonnette (*Parus palustris*)
- Mésange boréale (*Parus montanus*)
- Mésange noire (*Parus ater*)
- Mésange charbonnière (*Parus major*)
- Mésange azurée (*Parus cyanus*)
- Mésange bleue (*Parus caeruleus*)

11. **Sittidae** : Passereau trapu, queue courte, sexes généralement semblables. très actives, les meilleurs oiseaux grimpeurs, se déplacent dans tous les sens sur les arbres. Ils se nourrissent d'invertébrés, de graines, de fruits secs et coincent les plus durs dans une fente pour les ouvrir à coup de bec.

Sittelle

- Sittelle torchepot (*Sitta europea*)

12. **Corvidae** : Grands passereaux souvent grégaires. Comportement très évolué. Ne chantent pas. Bec souvent robuste. Sexes semblables.

Geai

- Geai des chênes (*Garrulus glandarius*)

Pies

- Pie bavarde (*Pica pica*)
- Pie bleue (*Cyanopica cyanus*)

Corbeaux

- Corbeau freux (*Corvus frugilegus*)
- Corneille noire (*Corvus corone corone*)
- Corneille mantelée (*Corvus corone cornix*)
- Choucas des tours (*Coloeus monedula*)
- Grand corbeau (*Corvus corax*)

-
13. **Sturnidae** : Passereaux grégaires de taille moyenne. Plumage souvent noirâtre et irisé. Pattes plus ou moins courtes, bec robuste. Sexes semblables. Marchent à petits pas et courent.

Etourneaux

- Etourneaux sansonnet (*Sturnus vulgaris*)

Martins

- Martin roselin (*Sturnus roseus*)

14. **Passeridae** : Plumage dépourvu de couleurs vives. Bec court, épais, queue peu ou pas échancrée.

Niverolle

- Niverolle (*Montifringilla nivalis*)

Moineaux

- Moineau soulcy (*Petronia petronia*)
➤ Moineau espagnol (*Passer hispaniolensis*)
➤ Moineau cisalpin (*Passer italiae*)
➤ Moineau domestique (*Passer domesticus*)
➤ Moineau friquet (*Passer montanus*)

15. **Fringillidae** : Petits passereaux plus ou moins grégaires après la reproduction. Bec robuste de granivore. Chant souvent plus mélodieux que celui des bruants.

Pinsons

- Pinson du nord (*Fringilla montifringilla*)
➤ Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*)

Venturons

- Venturon montagnard (*Serinus citrinella*)
➤ Venturon corse (*Serinus corsicana*)

Serins

- Serin cini (*Serinus serinus*)

Sizerins

- Sizerin flammé (*Acanthis flammea flammea*)
➤ Sizerin cabaret (*Acanthis flammea cabaret*)
➤ Sizerin blanchâtre (*Acanthis flammea hornemanni*)

Linottes

- Linotte à bec jaune (*Linaria flavirostris*)
➤ Linotte mélodieuse (*Linaria cannabina*)

Tarins

- Tarin des aulnes (*Spinus spinus*)

Chardonnerets

- Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis carduelis*)
- Chardonneret parva (*Carduelis carduelis parva*)
- Chardonneret major (*Carduelis carduelis frigoris*)
- Chardonneret britannique (*Carduelis carduelis britanica*)
- Chardonneret tschusii (*Carduelis carduelis tschusii*)

Verdier

- Verdier d'Europe (*Chloris chloris*)
- Verdier d'Europe (*Chloris aurantiiventris*)

Bouvreuils

- Bouvreuil ponceau (*Pyrrhula Pyrrhula Pyrrhula*)
- Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula Pyrrhula europea*)
- Bouvreuil pivoine ibérique (*Pyrrhula Pyrrhula iberiae*)

Gros bec

- Gros bec casse noyau (*Coccothrauste coccothrauste*)

Roselins

- Roselin githagine (*Rhodopechys githaginea*)
- Roselin cramoisi (*Carpodacus erythrinus*)

Dur-bec

- Dur bec des sapins (*Pinicola enucleator*)

Becs-coisés

- Bec croisé des sapins (*Loxia curvirostra*)
- Bec croisé bifascié (*Loxia leucoptera*)
- Bec croisé perroquet (*Loxia pythopsitacus*)

-
16. **Emberizidae** : La majorité diffère de la plupart des fringilles et des moineaux par une tête plus petite, un bec conique, une queue plus longue et peu fourchue. Le chant est plutôt médiocre.

Bruants

- Bruant proyer (*Emberiza calandra*)
- Bruant fou (*Emberiza cia*)
- Bruant jaune (*Emberiza citrinella*)
- Bruant zizi (*Emberiza cirlus*)
- Bruant à tête rousse (*Emberiza bruniceps*)
- Bruant mélanocéphale (*Emberiza melanocephala*)
- Bruant ortolan (*Emberiza hortulanus*)
- Bruant des roseaux (*Emberiza schoeniclus*)

17. **Mutations de la Faune Européenne homologuées par la COM/OMJ**

6

3 1.Généralité et jugement

1. Généralité et jugement.

Dessin

Caractéristiques

Dessin typique de la race selon le standard.

Points à disposition 30

Evaluations	Pénalisations	Points
EXCELLENT	➤ Dessin caractéristique de l'espèce. ➤ Sans dessin pour les mutations lipochromes	29
BON	➤ Léger manque de dessin ou dessin légèrement flou de l'espèce ➤ Dessin apparent chez les mutations lipochromes	27
SUFFISANT	➤ Manque de dessin ou flou	26-25
INSUFFISANT	➤ Sans dessin ou très flou	24 =>

Couleur

Caractéristiques

Couleur typique de la race selon le standard.

Points à disposition 30

Evaluations	Pénalisations	Points
EXCELLENT	➤ Aucun défaut	29
BON	➤ Un défaut	28
SUFFISANT	➤ Deux ou Trois défauts	27-26
INSUFFISANT	➤ Plus de trois défauts ou des défauts graves, plumage en mue sur le manteau	25 =>

7

7. Standard COM/OMJ Edition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Forme & Grandeur

Caractéristiques

Forme et Grandeur typique de la race selon le standard.

Défauts pénalisants :

- Longueur : Inférieure ou supérieure au standard,
- Tête : Aplatie ou trop petite ou au contraire trop grande et pesante en proportion du corps,
- Dos : concave ou convexe,
- Poitrine : Plate ou étroite ou bien proéminente et massive,
- Tronc : Top fin ou trop massif,
- Jambes : Trop longues avec un tibia fin et cuisses visibles ou trop courtes ou bien recouvertes par le plumage de l'abdomen.

Points à disposition 20

Evaluations	Pénalisations	Points
EXCELLENT	➤ Aucun défaut	19
BON	➤ Un défaut	18
SUFFISANT	➤ Deux ou Trois défauts	17-16
INSUFFISANT	➤ Plus de trois défauts et/ou défauts graves	15 =>

8

Plumage

Caractéristiques :

Le plumage se compose de plumes et de pennes. Il devra être complet, intact, uniforme, lisse, compact, serré et brillant.

Les pennes et les plumes devront se chevaucher les unes sur les autres comme des tuiles bien ordonnées. La queue et les ailes devront être compactes, fermées et intactes.

Sont considérés comme défauts :

- Plumage trop long et abondant, qui rend le manteau moins compact,
- Plumage trop abondant sur les flancs, sourcils trop touffus et marqués,
- Coup de vent dans la gorge et sur la poitrine,
- Plumage lâche sur un ou les deux flancs, à l'abdomen ou sur la poitrine,
- Plumes de coq.
- Dos avec des plumes qui ont tendance à se séparer.
- Plumage court, rare et sec.
- Mue pas terminée.
- Rémiges et rectrices pas uniforme (avec des plumes en repousse).
- Rémiges et rectrices cassées.
- Rémiges non complètes et pas uniformément en ligne.
- Queue en éventail ou / et queue d'hirondelle.

Points à disposition 10

Evaluations	Pénalisations	Points
EXCELLENT	➤ Aucun défaut	9
BON	➤ Un défaut	8
SUFFISANT	➤ Deux ou Trois défauts ou des défaut graves	7-6
INSUFFISANT	➤ Plus de trois défauts et/ou de façon voyante, plumage en mue sur tout le manteau	5 =>

Sont considérés comme « défauts graves », ceux qui sont particulièrement accentués.

9

Maintien, Condition & Impression

Attitude et position de l'oiseau en mouvement, pas amorphe.

Condition de l'oiseau : bec court, ongles soignés.

Impression : Propreté de la cage, bien être de l'oiseau.

Caractéristiques : Par maintien, s'entend l'attitude du corps du sujet et comment il se présente sur le perchoir dans la cage.

Donc la forme et le maintien, souvent se comparent et s'influencent l'un l'autre, ils sont complémentaires. Un canari che qui la forme laisse à désirer aura difficilement un bon maintien et vice-versa.

Au repos, le sujet doit présenter à une ligne corps-queue droite et continue ; et avoir une position d'environ 45 degrés par rapport au perchoir.

Les défauts de pénalisations sont de deux types :

1. Caractère

- Sauvage ou inquiet,
- Timide et peureux.

2. Structurel

- Ailes portées trop basses avec une ligne corps queue concave ou convexe,
- Ailes croisées,
- Queue portée trop basse avec une ligne corps queue concave ou convexe,
- Membres raides sans la semi flexion normale de la cheville,
- Épaules saillantes,
- Bec : croissance anormale d'une mandibule.

Points à disposition 10

Evaluations	Pénalisations	Points
EXCELLENT	➤ Aucun défaut	9
BON	➤ Un défaut	8
SUFFISANT	➤ Deux ou Trois défauts ou des défaut graves	7-6
INSUFFISANT	➤ Plus de trois défauts ou des défaut graves	5 =>

10

10. Standard COM/OMJ Edition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

O.M.J.

FICHE DE JUGEMENT

Exposant				
Pays				
N° de l'éleveur				
FAUNE EUROPENNE				
Dénomination				
Bague				
Cage n°				
Dessin	30			
Couleur	30			
Forme et Grandeur	20			
Plumage	10			
Maintien, condition et impression	10			
Total	100			
Total pour le Stam				
Harmonie				
Total pour la collection				

Remarques :

Juges:

Date:

FIGURE 1 – Fiche de jugement COM/OMJ.




FIGURE 2 – Topographie d'un oiseau.

4 2.Motacillidae

2. Motacillidae :

Plumage comportant des tons gris, blanc noirs jaunes. Hochent la queue de haut en bas presque continuellement. Marchent à petits pas rapides.

4.1 Bergeronnettes

Bergeronnettes

4.1.1 Bergeronnette grise (*Motacilla alba*)

Phénotype ancestral



FIGURE 3 – Bergeronnette grise.

Taille du corps : 18 cm. Forme élégante et élancée.
Assez haute sur pattes. Balance verticalement la queue.

Zone du plumage	Couleur
Tête, Cou, Gorge, Nuque	Plumage nuptial : ➤ De forme elliptique, avec l'arrondi du crâne élégant. ➤ Zone frontale et joues blanches jusqu'au dessus de l'oeil. ➤ Dessus du crâne et nuque noire. ➤ Plastron noir, couvrant le menton, la gorge et le haut du poitrail ou il se divise en arrondi. Plumage hivernal : ➤ La bavette se réduit à un demi-collier noir en forme de croissant. ➤ Le menton et la gorge sont blancs. ➤ Le noir du crâne devient gris foncé.
Dos	Gris uniforme.
Poitrine	Blanc.
Flancs	Blancs voilés de gris.
Ventre, Région anale	Blanc.
Ailes	➤ Épaules grise ➤ Petites couverture noire à bordure grise ➤ Grandes couvertures grise à bordure blanche ➤ Grandes rémiges gris noir ➤ Rémiges secondaires noires bordées de blanc.
Croupion	Gris
Queue	➤ Rectrices externes blanches ➤ Rectrices centrales noires.
Bec	Gris noirâtre. Assez long, fin et pointu.
Yeux	Noirs.
Pattes, Doigts	Gris noirs.
Ongles	Noirs.

Remarques : La femelle présente des couleurs plus ternes et un dessin réduit.



FIGURE 4 – Bergeronnette grise.

12

12. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

4.1.2 Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*)

Phénotype ancestral



FIGURE 5 – Bergeronnette des ruisseaux.

Remarques : La femelle est dépourvue de bavette noire et présente un menton et une gorge blanchâtre. L'ensemble des couleurs est un peu plus pâle que chez le mâle.

13

13. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 18 cm. Forme élégante et svelte.
Haute sur pattes. Longue queue balancée verticalement.

Zone du plumage	Couleur
Tête	➤ De forme elliptique bien proportionnée au corps. ➤ Dessus du crâne et nuque gris. ➤ Joues grises rejoignant la nuque. ➤ Zone loreale grise. ➤ Trait sourcilier blanc. ➤ Trait moustachal blanc servant de délimitation entre la joue et la bavette. En plumage nuptial : ➤ Bavette noire couvrant le menton et la gorge. En hiver : ➤ Le noir de la bavette est remplacé par une couleur blanche qui peut être légèrement moucheté de noir.
Cou, Nuque	Gris.
Dos	Gris uniforme.
Poitrine, Gorge	Jaune citron couvrant toute la face ventral.
Flancs	Jaune, parfois légèrement teinté de gris verdâtre à hauteur de l'épaule.
Ventre, Région anale	Jaune citron
Ailes	➤ Grises foncées voilées de brun. ➤ Extrémité des grandes couvertures internes frangée de blanc. ➤ Grandes rémiges gris noir, les secondaires étant bordées de blanc.
Croupion	Jaune verdâtre.
Queue	➤ Longue. ➤ Rectrices externes blanches ➤ Rectrices internes gris noirâtre.
Bec	Gris noirâtre. Assez long, Pointu.
Yeux	Noirs. Léger cercle oculaire blanc.
Pattes, Doigts	Couleur chair. Pattes longues et fines.
Ongles	Couleur chair.

4.1.3 Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*)

Phénotype ancestral



FIGURE 6 – Bergeronnette printanière.

Remarques : La femelle est plus pâle que le mâle.

14

14. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 17 cm. Forme élégante et svelte. Haute sur pattes.

Zone du plumage	Couleur
Tête	Fine, Crâne assez plat : ➤ Front, dessus de la tête et nuque gris clair. ➤ Traits sourciliers blanc. ➤ Dessin de la joue gris foncé. ➤ Menton et gorge jaune, comme la face ventrale, blanchâtre en hiver. Il existe plusieurs sous-espèce dont la couleur de tête diffère.
Cou, Nuque	Gris clair.
Dos	Gris beige verdâtre.
Poitrine, Gorge, Flancs Ventre, Région anale	Jaune citron plus pâle en hiver.
Ailes	➤ Couvertures gris foncé, bordée de blanc. ➤ Rémiges gris brun foncé avec une bordure blanchâtre.
Croupion	Gris verdâtre.
Queue	Assez longue ➤ Rectrices externes blanches. ➤ Rectrices internes gris brun foncé.
Bec	Gris.
Yeux	Noirs. Léger cercle oculaire blanc.
Pattes, Doigts	Gris.
Ongles	Gris.

5 3.Bombycillidae

3.Bombycillidae :

5.1 Jaseur

Jaseur

5.1.1 Jaseur boréal (*Bombycilla garrulus*)

Phénotype ancestral



FIGURE 7 – Jaseur boréal. Photo UOF P. Rocher

Taille du corps : 18 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec	Noir avec une couleur chair à la racine. Une ligne blanche est visible à la base de la mandibule inférieure.
Yeux	Brun foncé.
Tête	Possède une huppe érectile de couleur lie de vin. Front, lorums, traits sourciliers, menton et gorge : noir. La couleur du front et de l'avant des joues est rouille. La région auriculaire, les joues, le haut de la poitrine et l'occiput sont lie de vin.
Dos	Manteau, scapulaires et couvertures alaires sont de couleur brun foncé, devenant graduellement gris vers le sus-caudale.
Poitrine	Gris brunâtre pâle.
Ventre et Flancs	Gris brunâtre pâle. Le centre du ventre est jaunâtre.
Ailes	Rémiges primaires : Noires, bordées d'une ligne blanche avec l'extrémité du vexille externe jaune. Rémiges secondaires : De couleur noir grisâtre avec à leur extrémité une large tache blanche terminée par des spots cornés rouge vif.
Queue	Rectrices : Grise à la racine devenant graduellement noirâtres. L'extrémité des rectrices est jaune, ceci forme une bande jaune à l'extrémité de la queue. Les sous-caudales sont de couleur roux.
Pattes, Doigts, Ongles	Noirs



FIGURE 8 – Jaseur boréal. Photo UOF P. Rocher

6 4.Prunellidae

4.Prunellidae :

Petits oiseaux terrestres ressemblant à des moineaux mais différent par un bec fin d'insectivore et des flancs striés. Sautillent ou marche comme s'ils se traînaient entrouvrant souvent les ailes.

6.1 Accenteurs

Accenteurs

6.1.1 Accenteur mouchet (*Prunella modularis*)

Phénotype ancestral



FIGURE 9 – Accenteurs mouchet.

Taille du corps : 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête	➤ Dessin brun finement strié. ➤ Zone loreale et joues brun finement strié. ➤ Sourcil gris bleuté qui se prolonge sur le côté du cou en contournant la joue et s'étale sur le menton et la gorge.
Cou. Nuque.	➤ Nuque brune légèrement striée. ➤ Côté du cou gris bleuté.
Dos	Brun marqué de larges stries brun noir.
Poitrine. Gorge.	Gris bleuté uniforme qui se dégrade et gris beiges crémeux vers le ventre.
Flancs	Brun roux strié de gris noirâtre.
Ventre, Région anale	Gris beige crémeux strié de noir en zone anale.
Ailes	➤ Couvertures brun foncé avec liseré clair en partie inférieure dessinant une double barre alaire peu distincte. ➤ Grandes rémiges brun roux plus foncé à l'extrémité. ➤ Rémiges secondaires brun noirâtre légèrement bordées de blanc.
Croupion	Gris brun.
Queue	Rectrices brun noirâtre.
Bec	Gris noirâtre.
Yeux	Noirs.
Pattes, Doigts	Brun rougeâtre.
Ongles	Brun.

Remarques : Silhouette fine et élégante. Pas de dimorphisme sexuel important.



FIGURE 10 – Accenteur mouchet.



FIGURE 11 – Accenteur mouchet.

6.1.2 Accenteur alpin (*Prunella colleris*)

Phénotype ancestral



FIGURE 12 – Accenteur alpin. Photo Thomas Koffel. Source Wikipedia.

17

17. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 18 cm. Forme robuste. Tête ronde sans encolure marquée.

Zone du plumage	Couleur
Tête	➤ Ronde. ➤ Crâne et joues gris bleuté. ➤ Menton et gorge marqué d'une bavette blanchâtre. finement écaillé de noir
Cou. Nuque.	➤ Encolure et cou peu marqués. ➤ Nuque gris bleuté comme le crâne.
Dos	Gris brun marqué de larges stries brun noirâtre.
Poitrine. Gorge.	➤ Bavette blanchâtre écaillée de noir couvrant toute la gorge. ➤ Poitrail gris.
Flancs	Fortement marqué de stries brunes sur fond gris brun.
Ventre, Région anale	➤ Gris comme le poitrail, s'éclaircissant sur le bas ventre. ➤ Zone sous-caudale blanchâtre striée de brun noir.
Ailes	➤ Scapulaires et couvertures gris noirâtre dont l'extrémité blanche forme une double barre alaire. ➤ Grandes rémiges gris brun plus clair sur le vexille externe. ➤ Rémiges secondaires brun noir avec liseré brun clair virant au blanc à l'extrémité.
Croupion	Gris brun strié de noir.
Queue	Rectrices brun foncé noirâtre dans l'axe central.
Bec	Fin et pointu. Gris noirmarqué de jaune près des commissures.
Yeux	Noirs.
Pattes, Doigts	Brun grisâtre.
Ongles	Brun grisâtre.

Remarques : Pas de dimorphisme sexuel important.

7 5.Turdidae

5.Turdidae :

Vaste famille réunissant plusieurs des meilleurs chanteurs européens. Tous sont insectivores et frugivores. Ils courent ou sautillent.

7.1 Rossignols

Rossignols

7.1.1 Rossignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*)

Phénotype ancestral



FIGURE 13 – Rossignol philomèle.

Taille du corps : 17 cm. Forme élégante. Assez rebondi. Tête ovale. Encolure peu marquée. Assez haut sur pattes.

Zone du plumage	Couleur
Tête	➤ Assez fine plus arrondie à la nuque. ➤ Crâne et joues brun roux. ➤ Peut porter un léger sourcil gris.
Cou. Nuque.	Brun assez soutenu.
Dos	Brun uniforme.
Poitrine. Gorge.	➤ Dessous du bec blanchâtre. ➤ Poitrine beige clair uniforme.
Flancs	Beige clair.
Ventre, Région anale	Blanchâtre.
Ailes	Brunes plus foncées sur leurs partie centrale.
Croupion	Brun roux soutenu.
Queue	Brun roux soutenu.
Bec	Gris fin et pointu.
Yeux	Noirs, assez grands, léger cercle oculaire.
Pattes, Doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.

Remarques : Pas de dimorphisme sexuel. Peut être confondu avec le rossignol progré.

7.1.2 Rossignol progré (*Luscinia luscinia*)

Phénotype ancestral



FIGURE 14 – Rossignol progré.

19

19. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 17 cm. Forme élégante. Tête ovale à encolure faiblement marquée. Assez haut sur pattes.

Zone du plumage	Couleur
Tête	➤ Assez fine plus arrondie sur la nuque. ➤ Crâne brun clair. ➤ Dessus du bec crème grisâtre.
Cou. Nuque.	Brun clair comme le crâne.
Dos	Brun clair uniforme.
Poitrine. Gorge.	Gris beige très légèrement écaillé de gris foncé.
Flancs	Gris beige très légèrement écaillé.
Ventre, Région anale	Blanchâtre. Un peu plus foncé à la région anale.
Ailes	➤ Brunes, Rémiges légèrement plus clair sur le pourtour. ➤ Rémiges secondaires un peu plus brunes. ➤ Les grandes rémiges sont assez grandes.
Croupion	Brun roux.
Queue	Brun roux comme le croupion.
Bec	Gris fin et pointu.
Yeux	Noirs, assez grands, enchâssés assez haut sur le crâne, léger cercle oculaire.
Pattes, Doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.

Remarques : Pas de dimorphisme sexuel. Peut être confondu avec le rossignol pphilomèle.

7.2 Rouge gorge

Rouge gorge

7.2.1 Rouge gorge (*Erithacus rubecula*)

Phénotype ancestral



FIGURE 15 – Rouge gorge.

Taille du corps : 14cm. Forme arrondie assez trapue. Haut sur pattes.

Zone du plumage	Couleur
Tête	➤ Calotte crânienne brune. ➤ Front et face roux orangé lumineux. ➤ Arrière de la joue gris.
Cou. Nuque.	➤ Cou pais. ➤ Nuque brune.
Dos	Brun uniforme.
Poitrine. Gorge.	Roux orangé comme la face.
Flancs	➤ Haut des flancs gris bleu en forme de bandes remontant jusqu'à l'arrière de la joue. ➤ Bas des flancs chamois clair.
Ventre, Région anale	Blanc sale.
Ailes	Couvertures et rémiges brunes uniforme comme le dos.
Croupion	Brun.
Queue	Rectrices brunes.
Bec	Noirâtre. Assez long. Pointu.
Yeux	Noirs. Assez grands, enchâssé au centre de la tête.
Pattes, Doigts	Brun.
Ongles	Brun.

Remarques : Pas de dimorphisme sexuel apparent.



FIGURE 16 – Rouge gorge.

7.3 Calliope

Calliope

7.3.1 Calliope sibérienne (*Luscinia calliope*)

Phénotype ancestral



FIGURE 17 – Calliope sibérienne. Photo Oiseau.net.

Taille du corps : 15 cm. Forme fuselée et élancée. Assez haut sur pattes.

Zone du plumage	Couleur
Tête	Ovale de forme élégante Mâle : ➤ Crâne brun clair. Sourcil blanc. Large trait, moustache blanc souligné de noir. ➤ Zone loreale et joues gris noir. ➤ Dessous du bec rouge carmin lumineux.
Cou. Nuque.	Brun clair comme la tête.
Dos	Brun clair comme la tête.
Poitrine. Gorge.	➤ Chez le mâle, la gorge porte une bavette rouge carmin lumineuse qui peut être très légèrement délimitée de noir. ➤ Zone gris beige sur le haut du poitrail se dégradant en beige.
Flancs	Beige.
Ventre, Région anale	Blanc crémeux du bas du poitrail à la zone anale.
Ailes	Épaule et rémiges brunes.
Croupion	Brun foncé.
Queue	Brun foncé.
Bec	Noirâtre. Assez long et fin. Gris noirâtre.
Yeux	Noirs.
Pattes, Doigts	Gris brun.
Ongles	Gris brun.

Remarques : La femelle porte une livrée brune assez uniforme avec des sourcils et trait moustaches atténués. Bavette et zone ventrale blanc crémeux.

7.3.2 Gorgebleue à miroir (*Luscinia svecica*)

Phénotype ancestral



FIGURE 18 – Gorgebleue à miroir.

Taille du corps : 14 cm. Forme du corps ronde voisine de celle du rouge gorge.
Haut sur pattes. Se tient souvent queue dressée et ailes tombantes.

Zone du plumage	Couleur
Tête	➤ Mâle : ➤ Dessus du crâne gris brun. ➤ Zone loreale et joues grise brun très légèrement écaillé. ➤ Trait sourcilier blanchâtre. ➤ Menton et gorge bleu lustré.
Cou. Nuque.	Gris brun un peu plus clair que la tête.
Dos	Gris brun.
Poitrine. Gorge.	Mâle : ➤ Dessin en forme de bavette bleu intense, lumineux à reflet satiné jusqu'en haut du poitrail et portant en son centre un ocelle de forme ovale, blanche (ssp L.s.svecica), centre rouge (ssp.L.s.cynecula). ➤ Le bas de la bavette est bordé de noir puis souligné d'une bande rousse.
Flancs	Beige rosâtre à la partie inférieure.
Ventre, Région anale	Partie inférieure du poitrail, zone ventrale et anale blanc grisâtre.
Ailes	➤ Gris brun comme le dos. ➤ Partie centrale des rémiges plus foncé.
Croupion	Gris brun.
Queue	Partie inférieure des rectrices rousse (très visible en vol) se dégradant en brun noirâtre à l'extrémité.
Bec	Gris noirâtre.
Yeux	Noirs assez grand.
Pattes, Doigts	Brun noirâtre.
Ongles	Brun noirâtre.

Remarques : La femelle porte à la gorge une bavette blanchâtre délimitée de brun noir (parfois teintée de bleu à l'état adulte), le reste de la livrée est gris brun, plus clair sur le ventre.



FIGURE 19 – Gorgebleue à miroir.



FIGURE 20 – Gorgebleue à miroir.



FIGURE 21 – Gorgebleue à miroir. Photo Rafael de Rojas.

7.4 Tariers

Tariers

7.4.1 Tarier pâtre Mâle (*Saxicola torquata*)

Phénotype ancestral



FIGURE 22 – Tarier pâtre Mâle Adulte. Photo Rafael Rios Arenas.

Taille du corps : 12 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête	Ronde, robuste par rapport au corps. ➤ La tête est entièrement noire de couleur uniforme qui se prolonge sur la nuque, les joues et la gorge.
Cou. Nuque.	➤ Partie dorsale de la nuque noire qui rejoint le dos. ➤ Côté du cou blanc pur, de la base de la joue à l'épaule.
Dos	Gris noir, marqué de stries noires.
Poitrine. Gorge.	➤ Gorge noire nettement délimitée au poitrail. ➤ Poitrail roux lumineux se dégradant en blanc en partie inférieure.
Flancs	Roux comme le poitrail.
Ventre, Région anale	Blanchâtre.
Ailes	➤ Épaules et couvertures carpiennes noires. ➤ Grandes couvertures blanches en forme de barre de couleur claire. ➤ Rémiges noires finement liserées de gris foncé.
Croupion	Blanc marqué de noir.
Queue	Noire.
Bec	Noir, fin et pointu.
Yeux	Noirs.
Pattes, Doigts	Gris brun foncé.
Ongles	Gris brun foncé.

Remarques : Forme générale trapue mais harmonieuse.



FIGURE 23 – Tarier pâtre Mâle Juvénile. Photo Rafael Rios Arenas.

7.4.2 Tarier pâtre Femelle (*Saxicola torquata*)

Phénotype ancestral



FIGURE 24 – Tarier pâtre Femelle.

Taille du corps : 12 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête	➤ Assez massive. ➤ Même capuchon que le mâle, de couleur gris brun avec des stries plus foncé.
Cou. Nuque.	Nuque gris brun. Demi collier blanchâtre sur les côtés du cou.
Dos	Gris brun portant des stries.
Poitrine. Gorge.	➤ Gorge brun noirâtre nettement délimitée. ➤ Poitrail gris beige se dégradant en blanc pâle.
Flancs	Gris beige.
Ventre, Région anale	Blanchâtre.
Ailes	➤ Épaules et couvertures carpiennes brun noirâtre à liseré plus clair. ➤ Grandes couvertures blanchâtre en forme de barre de couleur claire.
Croupion	Gris beige strié de brun foncé.
Queue	Brun noirâtre.
Bec	Gris brun foncé.
Yeux	Noirs.
Pattes, Doigts	Gris brun foncé.
Ongles	Gris brun foncé.

Remarques : Le premier hiver, les femelles sont de couleur plus claire, brun noirâtre.

7.4.3 Tarier des près (*Saxicola rubetra*)

Phénotype ancestral



FIGURE 25 – Tarier des près Mâle. Photo Jean-Louis Corsin.



FIGURE 26 – Tarier des près Femelle. Photo Jean-Louis Corsin.

Taille du corps : 12,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête	➤ Mâle : ➤ Dessous de la tête gris beige fortement strié de noir. ➤ Sourcil blanc partant de la base du bec et s'élargissant vers l'arrière de l'oeil. ➤ Zone loreale et joues brun noirâtre, un peu plus clair au centre. La joue est surlignée d'un trait blanc qui la contourne jusqu'à la nuque.
Cou. Nuque.	Gris brun strié de noir.
Dos	Gris brun strié de noir.
Poitrine. Gorge.	Dessous du bec, gorge et poitrail chamois orangé se dégradant en blanc.
Flancs	Chamois orangé s'estompant vers le bas.
Ventre, Région anale	Blanc crémeux.
Ailes	➤ Couvertures brun noir à liseré clair. ➤ Une partie des couvertures porte une tâche blanche. ➤ Rémiges brun noir foncés à leurs extrémités et comportant un liseré gris beige.
Croupion	Gris brun strié de noir.
Queue	Rectrices brun noirâtre.
Bec	Gris noir fin et pointu.
Yeux	Noirs.
Pattes, Doigts	Gris noir.
Ongles	Gris noir.

Remarques : La femelle présente le même patron avec des couleurs très atténuées principalement sur le poitrail. En plumage hivernale, les mâles sont de couleurs moins vives.

7.5 Rouges-queue

Rouges-queue

7.5.1 Rouge queue noir (*Phoenicurus ochruros*)

Phénotype ancestral



FIGURE 27 – Rouge queue noir Mâle Adulte. Photo Rafael de Rojas.

Taille du corps : 14 cm. Forme élancée et élégante. Tête proportionnée au corps.
Pattes longues.

Zone du plumage	Couleur
Tête	Mâle : ➤ Dessus du crâne gris anthracite jusqu'à la hauteur de l'oeil. ➤ Fine bande frontale, joues et menton noir se prolongeant sur la gorge.
Cou. Nuque.	➤ Nuque gris anthracite. ➤ Côté du cou noir.
Dos	Gris noir, plus foncé que le crâne.
Poitrine. Gorge.	➤ Noir lustré. ➤ La zone inférieure du poitrail se dégrade en gris foncé vers le ventre.
Flancs	Gris foncé uniforme.
Ventre, Région anale	Ventre gris foncé, se fondant en brun rouille sur la partie anale.
Ailes	➤ Couvertures noires légèrement liserés de gris. ➤ Rémiges gris foncé portant une zone claire à la partie médiane, en forme de miroir alaire.
Croupion	Roux.
Queue	➤ Rectrices externes rousses. ➤ Rectrices internes rousses à la base devenant noirâtre.
Bec	Noir assez long, fin et pointu.
Yeux	Noirs.
Pattes, Doigts	➤ Noirs. ➤ Tarse long.
Ongles	Noirs.

Remarques : La femelle présente une livrée gris brun unie, un peu plus foncée sur la partie dorsale. L'oeil est entouré d'un cercle clair très fin, la couleur de la queue est identique à celle du mâle. En première année les mâles peuvent présenter un plumage intermédiaire entre mâle et femelle.



FIGURE 28 – Rouge queue noir.



FIGURE 29 – Rouge queue noir Femelle.



FIGURE 30 – Rouge queue noir. Couple. Photo Standard KBOF.

7.5.2 Rouge queue noir à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*)

Phénotype ancestral



FIGURE 31 – Rouge queue noir à front blanc. Photo Rafael de Rojas.

Taille du corps : 14 cm. Forme élancée et élégante. Tête proportionnée au corps.
Pattes longues.

Zone du plumage	Couleur
Tête	Mâle : ➤ Fine bande frontale noire, nettement délimitée d'une bande blanche plus large qui se prolonge au-dessus de l'oeil. ➤ Sommet et partie arrière du crâne gris souris. ➤ Masque noir couvrant les joues, le menton et la gorge.
Cou. Nuque.	➤ Nuque et partie dorsale du cou gris souris. ➤ Côté du cou noir comme les joues et la gorge.
Dos	Gris souris.
Poitrine. Gorge.	➤ Gorge noire en prolongement du dessin facial. Nettement délimité du poitrail roux lumineux.
Flancs	Toute la partie du poitrail et des flancs sont de couleur rousse uniforme et lumineuse.
Ventre, Région anale	Ventre blanc, se dégradant en roux vers la région anale.
Ailes	➤ Petites couvertures gris foncé. ➤ Grandes couvertures noires finement bordées de gris. ➤ Rémiges noires avec un liseré gris brun.
Croupion	Roux.
Queue	➤ Rectrices externes rousses. ➤ Rectrices centrales rousses à la base devenant noirâtres jusqu'à leurs extrémités.
Bec	Noir assez long , fin et pointu.
Yeux	Noirs.
Pattes, Doigts	Noirâtres. Tarse long.
Ongles	Noirs.

Remarques : La femelle est de couleur gris brun sur la tête et la partie dorsale. Les rémiges sont brun noirâtre avec une bordure gris brun. Croupion et queue comme le mâle. Gorge gris brun. Poitrail et flancs gris beige incrusté de chamois. Ventre blanchâtre. Zone anale rousse. En première année les mâles peuvent présenter un plumage intermédiaire entre mâle et femelle.

7.6 Monticules

Monticules

7.6.1 Merle bleu (*Monticola solitarius*)

Phénotype ancestral



FIGURE 32 – Merle bleu.

Taille du corps : 20 cm. Oiseau élégant et bien équilibré.

Zone du plumage	Couleur
Tête	➤ Bien dégagé du corps, assez plate, en gris-ardoise très nettement bleuté. ➤ Trait loreal : sombre. ➤ Cercle oculaire : clair.
Cou. Nuque.	➤ Gris ardoise bleuté.
Dos	Gris ardoise bleuté. Légèrement ombré.
Poitrine. Gorge.	Gris ardoise bleuté.
Flancs	Gris ardoise bleuté.
Ventre, Région anale	Gris noirâtre avec reflet bleu.
Ailes	Rémiges et couvertures : noirâtres, portant un liseré gris bleuté.
Croupion	Gris ardoise bleuté.
Queue	➤ De longueur moyenne. ➤ Rectrices : noirâtres, finement liserées de gris bleuté.
Bec	Gris noir, long, pointu mais robuste.
Yeux	Noirs, assez grands.
Pattes, Doigts	Gris noirâtre, assez longues.
Ongles	Noirs mat.

Remarques : La femelle porte une livrée brun-ocre soutenu avec un écaillage noirâtre sur la tête, le dos et la face ventrale où il est plus visible.

7.6.2 Merle de roche (*Monticola saxatilis*)

Phénotype ancestral



FIGURE 33 – Merle de roche. Plumage Nuptial.



FIGURE 34 – Merle de roche. Plumage hivernal.

Taille du corps : 19 cm. Oiseau élégant et proportionné. Position dressée.

Zone du plumage	Couleur
Tête	Bien dégagé du corps, légèrement plate d'une couleur grise-brune tachetée en noire et blanche avec un léger voile bleuâtre que couvre la tête.
Cou. Nuque.	D'une couleur pareille à la tête mais plus blanchâtre du côté antérieur (gorge)..
Dos	Gris brun tachetée en noir et blanc.
Poitrine. Gorge.	Orangée et avec un dessin écaillé en noir et blanc.
Flancs	Semblable à la poitrine mais plus orangé et les écailles sont plus petites.
Ventre, Région anale	Orangée et avec un dessin écaillé en noir et blanc.
Ailes	Rémiges et couvertures alaires noirâtres avec un clair liseré plus évident dans ces dernières.
Croupion	Gris brun tacheté en noir et blanc.
Queue	➤ Courte, d'une couleur châtain orangée avec deux rectrices centrales brunes foncées. ➤ Châtain orangée.
Bec	Grisâtre, plus foncé vers l'extrémité.
Yeux	Noirs et grands avec cercle oculaire clair.
Pattes, Doigts	Brunâtres.
Ongles	Noirâtres.

Remarques : Les femelles sont de couleurs plus pâles et ternes. En général d'une couleur brunâtre et très tachetée, spécialement sur la poitrine et le ventre où les tâches ont une forme d'écailles.

7.7 Merles

Merles

7.7.1 Merle noir Mâle (*Turdus merula*)

Phénotype ancestral



FIGURE 35 – Merle noir Mâle. Photo Sylvain Chartier.

Taille du corps : 24/25 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête	La totalité du plumage est uniformément noire.
Dos	Idem.
Poitrine. Gorge.	Idem.
Flancs Ventre	Idem.
Ailes	Noir. En première année, brun noirâtre.
Croupion	Idem.
Queue	Noir. En première année, brun noirâtre.
Yeux	Noirs, Cercle oculaire jaune à orange.
Bec	Jaune à orange.
Pattes, Doigts, Ongles	Gris brun.



FIGURE 36 – Merle noir Mâle.

7.7.2 Merle noir Femelle (*Turdus merula*)

Phénotype ancestral



FIGURE 37 – Merle noir Femelle. Photo Lionel Durochat.

Taille du corps : 24/25 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête	Gris brun foncé.
Dos	Idem.
Poitrine. Gorge.	Menton gris beige pointillé noir. Poitrail brun écaillé.
Flancs Ventre	Brun écaillé. Brun foncé.
Ailes	Gris brun foncé.
Croupion	Idem.
Queue	Idem.
Yeux	Brun noirs.
Bec	Brun foncé. Peut porter des marques jaunes.
Pattes, Doigts, Ongles	Brun foncé.

7.7.3 Merle noir Mâle Brun (*Turdus merula*)

Mutation Brune

Standard en attente de validation par la COM/OMJ



FIGURE 38 – Merle noir Mâle Mutation Brune. Photo Nick Michielson.

Taille du corps : 24/25 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête	Brun foncé tirant sur le noir.
Dos	Brun foncé tirant sur le noir.
Poitrine.	Brun foncé tirant sur le noir.
Gorge.	Brun foncé.
Flancs Ventre	Brun foncé.
Ailes	Gris brun foncé. Brun plus clair sur les rémiges primaires.
Croupion	Brun foncé.
Queue	Brun foncé.
Yeux	Brun noirs.
Bec	Jaune orangé.
Pattes, Doigts, Ongles	Couleur chair avec des nuances de brun.
Hérédité	Mutation liée au sexe et récessive.

7.7.4 Merle noir Femelle Brune (*Turdus merula*)

Mutation Brune

Standard en attente de validation par la COM/OMJ



FIGURE 39 – Merle noir Femelle Mutation Brune. Photo Nick Michielson.

Taille du corps : 24/25 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête	Brun avec une tonalité plus claire que le mâle.
Dos	Brun.
Poitrine. Gorge.	Menton beige pointillé de brun. Poitrail brun écaillé.
Flancs Ventre	Brun écaillé. Brun foncé.
Ailes	Brun, plus clair au niveau des rémiges primaires.
Croupion	Brun.
Queue	Brune plus foncée.
Yeux	Brun noirs.
Bec	Brun foncé. Peut porter des marques jaunes orangées.
Pattes, Doigts, Ongles	Couleur chair avec des nuances de brun.
Hérédité	Mutation liée au sexe et récessive.

7.7.5 Merle noir Mâle Argenté ~~Ancienne dénomination Pastel.~~ (*Turdus merula*)

Mutation Argenté. ~~Ancienne dénomination Pastel.~~

Travail en cours d'étude pour la détermination de la mutation.

Taille du corps : 24/25 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête	Grise. Légèrement striée.
Dos	Gris argenté avec un liseré foncé sur les couvertures et de légères striures sur le milieu.
Poitrine. Gorge.	Gris argenté avec de légères stries interrompues.
Flancs Ventre	Gris argenté avec un dessin en forme de gouttes.
Ailes	Rémiges primaires gris foncé avec une barre alaire gris clair(les jeunes oiseaux ont des scapulaires foncées).
Croupion	Gris argenté avec un liseré foncé sur les couvertures.
Queue	Gris foncé, plus claire que les rémiges primaires.
Yeux	Brun foncé avec un cercle oculaire jaunâtre.
Bec	Jaune orange chez l'adulte.
Pattes, Doigts, Ongles	Bruns.
Hérédité	Mutation dominante incomplète.



FIGURE 40 – Merle noir Mâle Mutation Argenté. Photo R. Rojas.



FIGURE 41 – Merle noir Couple Mutation Argenté. Photo JL Berbudeau.

7.7.6 Merle noir Femelle Argenté ~~Ancienne dénomination Pastel.~~
(*Turdus merula*)

Mutation Argenté. ~~Ancienne dénomination Pastel.~~

Travail en cours d'étude pour la détermination de la mutation.



FIGURE 42 – Merle noir Femelle Mutation Argenté.

Taille du corps : 24/25 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête	Grise très foncée avec un léger pigment et liseré.
Dos. Gorge. Poitrine	➤ Gris foncé. ➤ Bavette brunâtre. ➤ Légèrement strié.
Flancs. Ventre.	Gris foncé avec un dessin en forme de gouttelettes.
Ailes	Grises foncées (les jeunes oiseaux ont des scapulaires encore plus foncées).
Croupion	Gris foncé légèrement strié.
Queue	Grise très foncée.
Yeux	Brun foncé avec un cercle oculaire orange.
Bec	Brun foncé à base orangée.
Pattes, Doigts, Ongles	Bruns.
Hérédité	Mutation dominante incomplète.

7.7.7 Merle noir Mâle Ancestral Dilué (*Turdus merula*)

Mutation Ancestral Dilué.

Travail en cours d'étude pour la détermination de la mutation.



FIGURE 43 – Merle noir Mâle Ancestral Dilué.
Oiseau de 1 an. Photo JL Berbudeau.



FIGURE 44 – Merle noir Mâle Ancestral Dilué.
Oiseau de 2 ans. Photo JL Berbudeau.



FIGURE 45 – Merle noir Mâle Ancestral Dilué. Photo JL Berbudeau.



FIGURE 46 – Merle noir Mâle Ancestral Dilué. Photo JL Berbudeau.

Taille du corps : 24/25 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête	Gris noir.
Dos	Gris noir.
Poitrine. Gorge.	Gris noir.
Flancs Ventre	Gris noir.
Ailes	Rémiges primaires gris foncé un peu plus clair que sur l'ensemble du corps.
Croupion	Gris noir.
Queue	Gris noir légèrement striée comme sur les rémiges primaires.
Yeux	Brun foncé avec un cercle oculaire jaunâtre.
Bec	Jaune orange chez l'adulte.
Pattes, Doigts, Ongles	Bruns.
Hérédité	Mutation dominante incomplète.

7.7.8 Merle noir Femelle Ancestral Dilué (*Turdus merula*)

Mutation (Pastel ou Dilué?).

Travail en cours d'étude pour la détermination de la mutation.



FIGURE 47 – Merle noir Femelle Ancestral Dilué. Photo JL Berbudeau.

Taille du corps : 24/25 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête	Grise foncée.
Dos	Gris foncé.
Poitrine. Gorge.	Gris foncé.
Flancs Ventre	Gris foncé.
Ailes	Rémiges primaires grises clair. Rémiges secondaires grises foncées.
Croupion	Gris foncé.
Queue	Grise foncée.
Yeux	brun foncé. Cercle oculaire jaunâtre.
Bec	Mandibule supérieure grise légèrement orangée. Mandibule inférieure légèrement orangée.
Pattes, Doigts, Ongles	Bruns.
Hérédité	Mutation dominante incomplète.

7.7.9 Merle noir Mâle Brun Argenté (~~ex. Brun Dilué~~)

(*Turdus merula*)

Mutation Brun Argenté (~~ex. Brun Dilué~~).

Travail en cours d'étude pour la détermination de la mutation.



FIGURE 48 – Merle noir Mâle Brun Argenté (~~ex. Brun Dilué~~).
Photo JL Berbudeau.

Taille du corps : 24/25 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête	Blanche.
Dos	Blanc brunâtre.
Poitrine. Gorge.	Blanc cassé.
Flancs Ventre	Blanc.
Ailes	Blanches.
Croupion	Blanc avec des reflets bruns.
Queue	Blanc avec des reflets bruns.
Yeux	Brun foncé avec un cercle oculaire jaunâtre.
Bec	Jaune orange.
Pattes, Doigts, Ongles	Blanc. légèrement grisâtre.
Hérédité	Mutation liée au sexe et récessive. Dominante incomplète aussi de part le facteur Argenté.

7.7.10 Merle noir Femelle Brun Argenté (~~ex. Brun Dilué~~) (*Turdus merula*)

Mutation Brun Argenté (~~ex. Brun Dilué~~).

Travail en cours d'étude pour la détermination de la mutation.



FIGURE 49 – Merle noir Femelle Brun Argenté (~~ex. Brun Dilué~~).
Photo JL Berbudeau.

Taille du corps : 24/25 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête	Blanche.
Dos	Blanc brunâtre.
Poitrine. Gorge.	Blanc cassé.
Flancs Ventre	Gris noir.
Ailes	Blanches.
Croupion	Blanc avec des reflets bruns.
Queue	Blanc avec des reflets bruns.
Yeux	Brun foncé avec un cercle oculaire jaunâtre.
Bec	Jaune orange.
Pattes, Doigts, Ongles	Blanc. légèrement grisâtre.
Hérédité	Mutation liée au sexe et récessive. Dominante incomplète aussi de part le facteur Argenté.

7.7.11 Merle noir Mâle Grizzle (*Turdus merula*)

Mutation Mâle Grizzle

Travail en cours d'étude pour la détermination de la mutation.



FIGURE 50 – Merle noir Mâle Grizzle. Photo JL Berbudeau.



FIGURE 51 – Merle noir Mâle Grizzle. Photo JL Berbudeau.

Taille du corps : 24/25 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête	Blanche.
Dos	Gris argenté.
Poitrine. Gorge.	Blanc cassé.
Flancs Ventre	Gris noir.
Ailes	Blanches avec le bout des rémiges brunâtres.
Croupion	Blanc.
Queue	Blanche.
Yeux	Brun foncé avec un cercle oculaire jaunâtre.
Bec	Jaune orange.
Pattes, Doigts, Ongles	Blanc. légèrement grisâtre.
Hérédité	Mutation récessive.

7.7.12 Merle noir Mâle Siam (*Turdus merula*)

Mutation Siam

Travail en cours d'étude pour la détermination de la mutation.



FIGURE 52 – Merle noir Mâle Siam. Photo JL Berbudeau.



FIGURE 53 – Merle noir Mâle Siam. Photo JL Berbudeau.

Taille du corps : 24/25 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête	Grise noire jusqu'au cou.
Dos	Brunâtre.
Poitrine. Gorge.	Brunâtre.
Flancs Ventre	Brunâtre.
Ailes	Brunâtre. avec le bout des rémiges brunes.
Croupion	Brunâtre.
Queue	Brunâtre.
Yeux	Rouge foncé avec un cercle oculaire jaunâtre.
Bec	Jaune très clair.
Pattes, Doigts, Ongles	Blanc. légèrement grisâtre.
Hérédité	Mutation récessive.

7.7.13 Merle noir Albinos (*Turdus merula*)

Mutation Albinos



FIGURE 54 – Merle noir Albinos. Photo Ricardo Sabariego.

Remarques : Le blanc pur aux yeux rouges est dénommé albinos.

41

41. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 24/25 cm.

Zone du plumage	Couleur
Corps	Blanc.
Ailes	Blanches.
Queue	Blanche.
Yeux	Rouge avec un cercle oculaire jaunâtre.
Bec	Jaune.
Pattes, Doigts, Ongles	Couleur chair.
Hérédité	Mutation récessive.

7.7.14 Merle noir Blanc (*Turdus merula*)

Mutation Blanche



FIGURE 55 – Merle noir Blanc. Photo R. Driesmans.

Remarques : Le blanc pur aux yeux rouges est dénommé albinos.

42

42. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 24/25 cm.

Zone du plumage	Couleur
Corps	Blanc.
Ailes	Blanches.
Queue	Blanche.
Yeux	Noir avec un cercle oculaire jaunâtre.
Bec	Jaune.
Pattes, Doigts, Ongles	Couleur chair.
Hérédité	???????????

7.7.15 Merle à plastron (*Turdus torquatus alpestris*)

Phénotype ancestral



FIGURE 56 – Merle à plastron.

Remarques : Le noir est remplacé par un brun sombre. Le dessin du poitrail est crème grisâtre. L'écaillage est plus nettement marqué sur le dos et les flancs. La gorge est crème grisâtre mouchetée de brun sombre.

43

43. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 24 cm. Harmonieuse, svelte.

Zone du plumage	Couleur
Tête	Fine et élégante, bien dégagée du corps en noir mat.
Cou. Nuque	Assez long en noir mat.
Dos	Noir mat. Les plumes sont ourlées d'une fine bordure grisâtre bien nette.
Poitrine. Gorge.	➤ <i>Poitrine</i> : Le haut de la poitrine porte une marque blanche nette, horizontale, en forme de croissant, formant un demi-collier d'une épaule à l'autre. ➤ <i>Partie basse du poitrail</i> : Noir mat, indistinctement écaillé de grisâtre. ➤ <i>Gorge</i> : Noir mat.
Flancs	Noir mat, portant un écaillage grisâtre bien contrasté et régulier.
Ventre. Région anale.	Noir mat, écaillé, s'unissant sur la zone anale.
Ailes	➤ <i>Rémiges</i> : Noires, liserées de gris-blanchâtre sur les deux tiers inférieur de leur longueur, ce qui détermine une zone claire sur la partie médiane de l'aile. ➤ <i>Couvertures</i> : Noires, bordées de gris-blanchâtre. ➤ <i>Les ailes</i> : Sont longues et fines.
Croupion.	Noir mat.
Queue	➤ <i>Rectrices</i> : Noir mat. ➤ <i>La queue</i> : Est assez longue.
Bec	➤ Long, pointu et robuste. ➤ Jaune à la base, passant au noir à la pointe.
Yeux	➤ Noir assez grands. ➤ Cercle oculaire très peu marqué.
Pattes, Doigts,	Assez longues, robustes et noires.
Ongles	Noir.

7.8 Grives

Grives

7.8.1 Grive musicienne (*Turdus philomelos*)

Phénotype ancestral



FIGURE 57 – Grive musicienne. Photo P. Rocher.

Taille du corps : 23 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête	➤ Vertex et occiput brun chaud. ➤ Vertex pointillé brun foncé. ➤ Sourcil et cercle oculaire crème. Lore noir brun pointillé crème. ➤ Joue brun pointillé noir.
Gorge	Beige clair uni. Délimité par deux traits foncés.
Dos	Brun chaud. Croupion et sous caudales bruns.
Poitrine.	Beige clair. Dessin brun foncé en forme de pointe de flèche.
Couvertures	Brun légèrement liseré de blanc formant une légère barre alaire.
Rémiges.	Brun foncé chaud. Liseré externe plus clair.
Croupion.	Brun.
Queue	Brun foncé chaud.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Brun noir. Base inférieure jaunâtre.
Pattes, Doigts,	Rose chair.
Ongles	Foncés.

7.8.2 Grive musicienne Brune (*Turdus philomelos*)

Mutation Brune



FIGURE 58 – Grive musicienne Brune. Photo S. Chartier.



FIGURE 59 – Grive musicienne Brune. Photo S. Chartier.

Taille du corps : 23 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête	Brun clair.
Gorge	Couleur crème.
Dos	Brun clair.
Poitrine.	Crème avec dessin brun clair en forme de gouttes.
Couvertures	➤ Petites et moyennes couvertures brun clair. ➤ Grandes couvertures brun clair avec dessin scapulaire crème.
Rémiges.	Brun clair.
Croupion.	Brun clair.
Queue	Brun clair.
Yeux	Brun.
Bec	Couleur chair.
Pattes, Doigts,	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.

7.8.3 Grive musicienne Blanche (*Turdus philomelos*)

Mutation Blanche



FIGURE 60 – Grive musicienne Blanche. Photo R. Driesmans.

Taille du corps : 23 cm.

Zone du plumage	Couleur
Corps	Blanc pur sans aucun dessin.
Ailes	Blanches.
Queue	Blanche.
Yeux	Rouges.
Bec	Noir.
Pattes, Doigts,	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.

7.8.4 Grive musicienne Satiné (*Turdus philomelos*)

Mutation Satiné



FIGURE 61 – Grive musicienne Satiné. Photo Philippe Rocher.

Taille du corps : 23 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête	Crème clair avec des écailles brun clair sur le vertex et un voile brun clair sur les joues.
Gorge.	➤ Crème clair. ➤ Moustaches brun clair visibles de chaque côté de la gorge.
Dos.	Crème clair.
Poitrine. Flancs.	Crème clair avec dessin brun clair en forme de gouttes bien réparties sur la poitrine.
Couvertures.	Crème clair avec un dessin d'épaule et une barre alaire brun clair.
Croupion.	Crème clair.
Queue	Crème clair avec un dessin brun clair visible aux sous-caudales.
Yeux	Rouges foncés.
Bec	Couleur chair.
Pattes, Doigts,	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.

7.8.5 Grive draine (*Turdus viscivorus*)

Phénotype ancestral



FIGURE 62 – Grive draine.

Remarques : Il n'y a pas de dimorphisme marqué entre les sexes.

Défauts classiques chez les grives draines :

- Dessin de la poitrine irrégulier.
- Sourcils irréguliers.
- Cercles oculaires irréguliers.
- Dessin des couvertures pas net.

48

48. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 27 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	De couleur corne foncé avec la base de la mandibule inférieure jaune.
Yeux.	Brun avec cercle oculaire gris blanchâtre.
Tête	➤ Gris brun à brun. ➤ <i>Lorum</i> : gris blanc. ➤ <i>Région auriculaire</i> : gris blanc avec liserés plus foncés.
Dos.	Brun à gris brun avec une nuance jaunâtre plus claire.
Menton. Gorge.	➤ Jaunâtre, teinté de brun avec un dessin de petites taches brunes foncées. ➤ Dessin des moustaches : brun foncé et pas très net.
Poitrine.	Le haut de la poitrine est jaunâtre avec un dessin de petites taches brunes foncées en forme de pointes de flèches qui s'agrandissent progressivement sur la poitrine.
Ventre. Flancs.	Jaune brunâtre avec un dessin de taches brun foncé.
Ailes.	➤ Rémiges de couleur brun foncé avec un liseré plus clair le long du vexille externe. ➤ L'extrémité des rémiges est blanchâtre. ➤ Les grandes, les moyennes et les petites couvertures sont de couleur brun foncé avec un liseré plus clair.
Queue.	Rectrices de couleur brun grisâtre avec un liseré plus clair le long du vexille externe.
Croupion.	Brun à brun gris.
Sus-caudale.	Brun à gris brun avec liseré blanc.
Pattes. Doigts.	De couleur jaune brunâtre.
Ongles.	Foncés.

7.8.6 Grive mauvis (*Turdus iliacus*)

Phénotype ancestral



FIGURE 63 – Grive mauvis. Photo KBOF.

Remarques : Il n'y a pas de dimorphisme marqué entre les sexes.

Défauts classiques chez les grives mauvis :

- Sourcils irréguliers.
- Dessin de la poitrine irrégulier.
- Barre alaire irrégulières.
- Moustaches irrégulières.
- Couleur des flancs pas assez visible.

49

49. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 21 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Brun noir avec la base de la mandibule inférieure jaunâtre.
Yeux.	De couleur noirâtre.
Tête	➤ Longs sourcils réguliers de couleur crème. Moustaches de couleur crème. ➤ <i>Lorum</i> : Lorums de couleur brun foncé. ➤ <i>Région auriculaire</i> : De couleur brun foncé avec une nuance crème. ➤ Long trait de couleur crème en dessous de l'oeil. Couronne de couleur brun foncé avec des écailles noires.
Cou.	Brun foncé avec une tache beige de chaque côté du cou.
Manteau.	Brun foncé avec un léger dessin écaillé.
Croupion.	Brun, un peu plus clair que le manteau.
Sus-caudale.	Brun, un peu plus clair que le manteau.
Menton. Gorge.	Blanc sale avec un dessin strié de brun. La gorge est bordée d'une bande noirâtre découpée et qui suit les moustaches.
Poitrine.	Blanc sale, tachetée de brun foncé.
Flancs.	Brun rouge à la partie supérieure des flancs et blanc sale, strié de brun à la partie inférieure des flancs.
Ventre.	Blanchâtre.
Ailes.	➤ De couleur brun foncé avec le vexille externe des rémiges beige. ➤ Les grandes sus alaires sont ourlées de beige.
Queue.	De couleur brun foncé.
Sous-caudale.	Blanc sale avec un dessin écaillé de brun.
Pattes. Doigts.	De couleur chair foncé.
Ongles.	Noirs.

7.8.7 Grive mauvis Brune (*Turdus iliacus*)

Mutation brune



FIGURE 64 – Grive mauvis brune. Photo D. Vettese.



FIGURE 65 – Grive mauvis brune. Photo D. Vettese.

Taille du corps : 21 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Mandibule supérieure jaunâtre et brune sur les deux côtés partant de la narine à la pointe du bec. Mandibule inférieure jaunâtre .
Yeux.	De couleur noirâtre.
Tête	➤ Longs sourcils réguliers de couleur crème. Moustaches de couleur crème. ➤ <i>Lorum</i> : Lorums de couleur brun. ➤ <i>Région auriculaire</i> : De couleur brunes. ➤ Long trait de couleur crème en dessous de l'oeil.
Cou.	Brun avec une tache beige de chaque côté du cou.
Manteau.	Brun avec un léger dessin écaillé.
Croupion.	Brun, un peu plus clair que le manteau.
Sus-caudale.	Brunes, un peu plus clair que le manteau.
Menton. Gorge.	Blanc sale avec un dessin strié de brun. La gorge est bordée d'une bande brunâtre découpée et qui suit les moustaches.
Poitrine.	Blanc sale, tachetée de brun.
Flancs.	Brun roux à la partie supérieure des flancs et blanc sale, strié de brun à la partie inférieure des flancs.
Ventre.	Blanchâtre strié de brun.
Ailes.	➤ De couleur brunes avec le vexille externe des rémiges beige. ➤ Les grandes sus alaires sont ourlées de beige.
Queue.	De couleur brune.
Sous-caudale.	Blanc sale avec un dessin écaillé de brun.
Pattes. Doigts.	De couleur chair.
Ongles.	De couleur chair.

7.8.8 Grive mauvis Facteur Foncé (*Turdus iliacus*)

Mutation Facteur Foncé



FIGURE 66 – Grive mauvis Facteur Foncé. Photo D. Vettese.

Taille du corps : 21 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Mandibule supérieure de couleur noire. Mandibule inférieure noire du bout du bec au milieu et jaunâtre du milieu à la base du bec.
Yeux.	De couleur noirâtre.
Tête	➤ Longs sourcils réguliers de couleur crème foncé. Moustaches de couleur crème. ➤ <i>Lorum</i> : Lorums de couleur brun noir. ➤ <i>Région auriculaire</i> : De couleur brun noir. ➤ Long trait de couleur crème en dessous de l'oeil. Couronne de couleur brun noir avec des écailles noires.
Cou.	Brun noir avec une tache beige de chaque côté du cou.
Manteau.	Brun foncé avec un léger dessin écaillé.
Croupion.	Brun, un peu plus clair que le manteau.
Sus-caudale.	Brun, un peu plus clair que le manteau.
Menton. Gorge.	Blanc sale avec un dessin strié de brun noir. La gorge est bordée d'une bande noirâtre découpée et qui suit les moustaches.
Poitrine.	Blanc sale, tachetée de brun noir.
Flancs.	Brun foncé à la partie supérieure des flancs et blanc sale, strié de brun noir à la partie inférieure des flancs.
Ventre.	Crème strié de brun noir.
Ailes.	➤ De couleur brun foncé. ➤ Les grandes sus alaires sont ourlées de brun noir.
Queue.	De couleur brun foncé.
Sous-caudale.	Blanc sale avec un dessin écaillé de brun foncé.
Pattes. Doigts.	De couleur chair foncé.
Ongles.	Noirs.

7.8.9 Grive litorne (*Turdus pilaris*)

Phénotype ancestral



FIGURE 67 – Grive Litorne. Photo KBOF.

Remarques : Dimorphisme sexuel : La femelle a les mêmes caractéristiques que le mâle mais les parties grises du mâle sont plus brunes chez la femelle. Les dessins noirs de la tête sont plus petits. Les flancs sont plus brunâtres.

52

Taille du corps : 25 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Jaune orange avec l'extrémité et une partie de la mandibule supérieure noir brunâtre.
Yeux.	Brun foncé.
Tête	➤ <i>Front et vertex</i> : Bleu grisâtre avec un dessin en forme de pointe de flèche noirâtre. ➤ <i>Lorum</i> : Noir. Partie située en dessous de l'oeil : Noir. Sourcils : gris blanc. Voile gris clair sur les régions auriculaires. ➤ <i>Nuque et occiput</i> : Bleu grisâtre.
Dos.	Manteau et couvertures alaires brun foncé avec des liserés plus clairs.
Croupion.	Bleu grisâtre. Couvertures sus caudales : brunâtres.
Menton. Gorge.	Jaune roux avec un dessin en forme de pointe de flèche noirâtre.
Poitrine.	D'un brun chaud avec un dessin en forme de grand fer de lance noir.
Ventre.	Blanchâtre.
Flancs.	Brun chaud avec un dessin en forme de grand fer de lance noir.
Ailes.	Rémiges de couleur brun noir avec les liserés externes grisâtres. L'extrémité des rémiges secondaires blanchâtres.
Queue.	Rectrices de couleur brun noir avec des liserés externes plus clairs sur la paire de rectrices externes.
Pattes. Doigts.	De couleur brune.
Ongles.	Brun foncé.

8 6.Sylviidae

6.Sylviidae :

Petits passereaux insectivores. Sexes généralement semblables, juvéniles comme adultes.

8.1 Fauvettes

Fauvettes

8.1.1 Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*)

Phénotype ancestral



FIGURE 68 – Fauvette à tête noire.



FIGURE 69 – Fauvette à tête noire.

Taille du corps : 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête	Mâle : ➤ Calotte noire de la base du bec à l'arrière du crâne sans empiéter sur l'oeil. ➤ Zone loreale entre le bec et l'oeil et joues gris clair. ➤ Dessous du bec gris blanchâtre virant en gris sur le poitrail.
Cou. Nuque.	Gris légèrement voilé de beige.
Dos	Gris légèrement voilé de beige.
Poitrine. Gorge.	Gris clair.
Flancs	Gris clair.
Ventre, Région anale	Blanc sale.
Ailes	Couvertures et rémiges gris beige, plus foncées à l'extrémité et liseré plus clair.
Croupion	Gris.
Bec	Gris beige comme les rémiges.
Yeux	Noirs.
Pattes, Doigts	Gris noir.
Ongles	Gris noir.

Remarques : La femelle porte la même livrée que le mâle, mais de couleur plus terne et une calotte brun roux.

8.1.2 Fauvette des jardins (*Sylvia borin*)

Phénotype ancestral



FIGURE 70 – Fauvette des jardins.

Taille du corps : 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête	➤ Dessus de la tête est joues gris brun. ➤ Sourcils assez indistinct. ➤ Menton et haut de la gorge gris beige clair.
Cou. Nuque.	Gris brun.
Dos	Gris brun uniforme.
Poitrine. Gorge.	Gris beige uniforme plus foncé que le bec.
Flancs	Gris beige comme le haut du poitrail.
Ventre, Région anale	Blanc sale.
Ailes	➤ Zone de l'épaule gris brun uniforme. ➤ Rémiges gris brun, plus foncées au centre et à l'extrémité.
Croupion	Gris brun uni.
Queue.	Rectrices de couleur identique aux rémiges.
Bec	Fin. Assez long et pointu. Gris, plus foncé à la pointe.
Yeux	Noirs.
Pattes, Doigts	Gris brun.
Ongles	Gris brun.

Remarques : Pas de dimorphisme sexuel.

8.1.3 Fauvette grisette (*Sylvia communis*)

Phénotype ancestral



FIGURE 71 – Fauvette grisette.

Taille du corps : 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête	Mâle : ➤ Casque gris souris couvrant le crane jusqu'à la nuque et l'arrière de la joue. ➤ Menton et haut de la gorge blanc.
Cou. Nuque.	Gris souris jusqu'au bas de la nuque.
Dos	Gris beige uniforme.
Poitrine. Gorge.	➤ Menton et gorge de couleur blanche, bien délimité au poitrail. ➤ Poitrail beige rosé.
Flancs	Beige rosé comme le poitrail.
Ventre, Région anale	Blanc.
Ailes	➤ Épaules du même gris beige que le dos. ➤ Couvertures beige noirâtre, marquées de brun noir au centre. ➤ Grandes rémiges gris brun, plus foncé à l'extrémité. ➤ Rémiges secondaires beige roussâtre, comme les couvertures.
Croupion	Gris beige comme le dos.
Queue.	➤ Rectrices externe blanches. ➤ Rectrices centrales gris brun foncé.
Bec	Fin, pointu. Gris, foncé à la pointe.
Yeux	Noirs. Entourés d'un cercle oculaire gris blanchâtre.
Pattes, Doigts	Gris beige clair.
Ongles	Gris.

Remarques : Pas de dimorphisme sexuel.

9 7.Panurinae

7. Panurinae (Timaliidae) :

Ressemblent superficiellement aux « mésanges » à longue queue.

9.1 Panure à moustache

Panure à moustaches

9.1.1 Panure à moustache (*Panurus biarmicus*)

Phénotype ancestral



FIGURE 72 – Panure à moustache. Photo Rafael de Rojas.



FIGURE 73 – Panure à moustache.

Taille du corps : 16-17 cm. Tête ronde, massique, corps arrondi, longue queue effilée.

Zone du plumage	Couleur
Tête	Mâle : ➤ Tête encapuchonnée de gris lumineux. ➤ De chaque côté du bec, dessin vertical noir en forme de moustaches, englobant l'oeil et s'étirant en pointe jusqu'au bas de la gorge. ➤ Menton et gorge blanc.
Cou. Nuque.	Nuque et côté du cou gris comme la tête, nettement délimité de la couleur brun-roux du dos.
Dos	Brun-roux nettement délimité par une ligne blanche qui part de l'épaule en suivant le contour de l'aile.
Poitrine. Gorge.	Gorge, poitrail et ventre blanc jusqu'à la zone anale.
Flancs	Brun chamois, s'élargissant vers le ventre et en partie inférieure.
Ventre, Région anale	Blanc roussâtre.
Ailes	➤ Couvertures brun-roux, les plis proches de l'aile sont marqués de noir. ➤ Les quatre premières grandes rémiges sont blanches légèrement marquées de noir à la base et à la pointe. ➤ Les autres rémiges sont brun-roux, celles les plus proches du dos sont partiellement noires forment une ligne noire qui jouxte la ligne blanche du dos.
Croupion	Brun noir.
Queue.	Rectrices brun-roux, les rectrices externes sont frangées de noir.
Bec	Jaune assez courbé, fin et pointu.
Yeux	Cercle oculaire jaune. Centre noir.
Pattes, Doigts	Noir.
Ongles	Noir.

Remarques : La femelle présente un patron de tête sans dessin et crème beige, joues crème grisâtre, le reste du plumage est identique à celui du mâle avec des couleurs plus ternes et la possibilité de traces noirâtre sur la tête et le bas du dos.

10 8.Aegithalidae

8. Aegithalidae :

Petit oiseau au bec très court, longue queue étagée correspondant à plus de la moitié de la longueur totale.

10.1 Mésange à longue queue

Mésange à longue queue

10.1.1 Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus*)

Phénotype ancestral



FIGURE 74 – Mésange à longue queue. Photo Jules Fouarge. Oiseaux.net

Taille du corps : 14 cm. Tête ronde et massive. Corps assez trapu. Longue queue effilée.

Zone du plumage	Couleur
Tête	➤ Entièrement blanche chez la forme d'Europe continental. ➤ Certaines sous-espèces peuvent présenter un dessin temporal noir plus ou moins important.
Cou. Nuque.	Blanc ou teinté de noir selon la sous-espèce.
Dos	➤ Gris ardoise strié de blanc. ➤ Les ailes sont délimitées par une bande rose carmin pâle, en forme de V qui va de l'épaule à la poitrine.
Poitrine. Gorge.	Blanc.
Flancs	Blanc sur la partie inférieur, devenant grisâtre à la partie inférieure.
Ventre, Région anale	Partie supérieure du ventre blanc, se dégradant en gris teinté de rose sur la région anale.
Ailes	➤ Couverture gris ardoise. ➤ Grandes rémiges gris noir. ➤ Rémiges secondaires gris foncé avec un liseré blanc.
Croupion	Gris ardoise.
Queue.	➤ Queue étagée. ➤ Couvertures externes blanches. ➤ Rectrices centrales gris noir.
Bec	Noir, court et pointu.
Yeux	Noirs, cercle oculaire rose.
Pattes, Doigts	Gris noir.
Ongles	Noir.

Remarques : Pas de dimorphisme sexuel apparent.

11 9.Remiidae

9.Remiidae :

Allure de mésange, mais bec un peu plus long et fin. Oiseau actif et acrobate.

11.1 Mésange rémiz

Mésange rémiz penduline

11.1.1 Mésange rémiz penduline (*Remiz pendulinus*)

Phénotype ancestral



FIGURE 75 – Mésange rémiz penduline. Photo Dominique Cavey.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête	➤ Crane, nuque et côtés du cou gris. ➤ Masque noir formant une barre frontale qui couvre la zone loreale et s'étale sur la joue. ➤ Menton blanc nettement délimité du poitrail.
Cou. Nuque.	Gris uniforme.
Dos	Brun roux.
Poitrine.	Zone pectorale écaillée de roux, se prolongeant sur les flancs.
Flancs	Écaillage roux sur fond beige clair qui s'étend jusqu'à hauteur des cuisses.
Ventre, Région anale	Blanc crémeux.
Ailes	➤ Petites couvertures brun roux. ➤ Grandes couvertures rousses, brun noirâtre au centre et plus clair à l'extrémité, formant une fine barre alaire. ➤ Rémiges gris noirâtre à liseré clair.
Croupion	Gris.
Queue.	Gris noirâtre.
Bec	➤ Gris noir. ➤ Fin et pointu.
Yeux	Noirs.
Pattes, Doigts	Noirs.
Ongles	Noirs.

Remarques : La femelle porte la même livrée avec des teintes plus ternes. Il existe des sous-espèces dont le dessin de tête est différent.

12 10.Paridae

10.Paridae :

Petits oiseaux insectivores remuants, acrobates. Sexes semblables.

12.1 Mésanges

Mésanges

12.1.1 Mésange huppée (*Parus cristatus*)

Phénotype ancestral



FIGURE 76 – Mésange huppée. Photo Daniel Dekens.

Taille du corps : 11-12 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête	➤ Dessus de la tête marqué d'un très fin écaillage noir blanc et formant une huppe érectile dirigée vers l'arrière du crâne. ➤ Fin sourcil blanc partant de la zone loreale et s'étirant sur les côtés de la tête. ➤ Joues grises, délimitées par un dessin noir en forme de V couché. ➤ Zone blanche partant de la commissure et s'étirant vers le bas de la joue en demi collier. ➤ Menton noir qui se prolonge en fin collier qui délimite nettement la gorge et la nuque.
Cou. Nuque.	Nuque gris voilé de brun uniforme.
Dos	Gris voilé de brun uniforme.
Poitrine. Gorge	Poitrail blanc grisâtre.
Flancs	Légèrement lavés de gris beige.
Ventre, Région anale	Blanc sale.
Ailes	➤ Épaules gris voilé de brun. ➤ Rémiges gris noirâtre avec liseré clair.
Croupion	Gris.
Queue.	Gris noirâtre.
Bec	Noir. Fin, court et pointu.
Yeux	Noirs.
Pattes, Doigts	Noirs.
Ongles	Noirs.

Remarques : Pas de dimorphisme sexuel apparent.

12.1.2 Mésange nonnette (*Parus palustris*)
Phénotype ancestral



FIGURE 77 – Mésange nonnette. Photo Robert Balestra.

Taille du corps : 12 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête	➤ Calotte d'un noir brillant partant du front et couvrant la tête à hauteur de l'oeil jusqu'au bas de la nuque. ➤ Zone blanchâtre partant de la commissure et couvrant la joue, puis se dégradant en gris vers l'arrière. ➤ Courte bavette noire couvrant le menton.
Cou. Nuque.	Arrière du cou et nuque noires, prolongeant le casque.
Dos	Gris voilé de beige.
Poitrine. Gorge.	Bas de la gorge et haut du poitrail blanchâtre se dégradant en gris beige sur la zone pectorale et les flancs.
Flancs	Gris beige.
Ventre, Région anale	Blanc sale.
Ailes	➤ Couverture gris terne. ➤ Rémiges noirâtres de couleur uniforme.
Croupion	Gris.
Queue.	Rectrices noirâtres comme les rémiges.
Bec	Noir. Fin, court et pointu.
Yeux	Noirs.
Pattes, Doigts	Gris noirs.
Ongles	Noirs.

Remarques : Pas de dimorphisme sexuel visible.

12.1.3 Mésange boréale (*Parus montanus*)
Phénotype ancestral



FIGURE 78 – Mésange boréale. Photo Robert Balestra.

Taille du corps : 12 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête	➤ Calotte d'un noir mat partant du front et couvrant la tête à hauteur de l'oeil ainsi que la nuque. ➤ Commissure et joue blanche. ➤ Bavette noire couvrant le menton et la gorge (plus étendue que chez la mésange nonnette).
Cou. Nuque.	➤ Nuque noir mat. ➤ Côtés du cou blanc.
Dos	Manteau gris à gris voilé de beige selon les sous-espèces.
Poitrine. Gorge.	Blanc grisâtre.
Flancs	Gris à gris beige clair selon les sous-espèces.
Ventre, Région anale	Blanchâtre.
Ailes	➤ Épaule et couverture gris à gris beige. ➤ Rémiges gris foncé. Le vexille externe des rémiges secondaires et liseré de blanc, ce qui dessine une sorte de miroir alaire.
Croupion	Gris foncé.
Queue.	Gris noirâtre.
Bec	Noir. Fin, court et pointu.
Yeux	Noirs.
Pattes, Doigts	Gris noirs.
Ongles	Noirs.

Remarques : Pas de dimorphisme sexuel visible.

12.1.4 Mésange noire (*Parus ater*)

Phénotype ancestral



FIGURE 79 – Mésange noire.



FIGURE 80 – Mésange noire.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête	➤ Casque noir couvrant le front et le crane jusqu'à hauteur de l'oeil et s'étirant de chaque côté de la tête en forme de bande jusqu'à la nuque et délimitant une tache blanche couvrant l'arrière du crâne de l'occiput à la nuque. ➤ Joues et côtés du cou blanc.
Cou. Nuque.	➤ Importante bavette noire couvrant le menton et la gorge. ➤ Tache blanche couvrant l'arrière du crâne.
Dos	Gris souris.
Poitrine. Gorge.	Blanc grisâtre.
Flancs	Voilés de chamois clair.
Ventre, Région anale	Chamois beige très délavé.
Ailes	➤ Petites et grandes couvertures gris foncé bordées de blanc ce qui dessine une double barre claire. ➤ Rémiges grises, plus foncées à l'extrémité.
Croupion	Gris.
Queue.	Rectrices grises foncées.
Bec	Noir. Assez court fin et pointu.
Yeux	Noirs.
Pattes, Doigts	Gris noirs.
Ongles	Noirs.

Remarques : Pas de dimorphisme sexuel visible.

12.1.5 Mésange charbonnière (*Parus major*)

Phénotype ancestral



FIGURE 81 – Mésange charbonnière.

Taille du corps : 14 cm. Forme assez ronde mais élégante. Tête bien proportionnée au corps. Pattes moyennement longues.

Zone du plumage	Couleur
Tête	➤ Casque noir brillant, couvrant tout le crâne selon une ligne horizontale à hauteur de l'oeil, de la commissure à la nuque. ➤ Joues entièrement blanche depuis la commissure du bec. ➤ Menton et gorge noir se prolongeant en dessin linéaire qui contourne la joue pour rejoindre le casque.
Cou. Nuque.	➤ Nuque verdâtre éclairée de jaune. ➤ Coté du cou noir.
Dos	Verdâtre.
Poitrine. Gorge.	➤ Gorge noire dont le dessin se prolonge en une bande plus ou moins large (3-5mm) qui suit le poitrail et l'abdomen jusqu'à la zone anale. ➤ Poitrail jaune citron de part et d'autre de cette ligne.
Flancs	Jaune citron comme le poitrail avec reflet verdâtre en partie inférieure.
Ventre, Région anale	➤ Ventre jaune de part et d'autre de la bande noire. ➤ Région anale blanchâtre avec ligne médiane noire.
Ailes	➤ Petites couvertures grises verdâtres. ➤ Couvertures noire frangées de blanc formant une barre alaire. ➤ Rémiges grises noires avec liseré blanc étroit plus marqué près du dos.
Croupion	Gris foncé.
Queue.	Rectrices grises noires.
Bec	Noir, fin pointu et assez court.
Yeux	Noirs.
Pattes, Doigts	Gris noirs.
Ongles	Noirs.

Remarques : Chez le mâle le dessin pectoral est plus important.

12.1.6 Mésange azurée (*Parus cyanus*)

Phénotype ancestral



FIGURE 82 – Mésange azurée.

Taille du corps : 13 cm. Corps trapu et arrondi tête ronde.

Zone du plumage	Couleur
Tête	➤ Bien arrondies. ➤ Blanche du front à l'occiput, marqué la forme des brides du casque de couleur gris bleu, couvrant la zone occipitale et s'infléchissant en pointe vers l'épaule, une ligne horizontale bleu noir s'étire jusqu'à l'oeil. ➤ Zone loreale, joues et menton blanc, comme toute la face ventrale.
Cou. Nuque.	Partie dorsale de la nuque blanche.
Dos	Bleu azur légèrement voilé de gris.
Poitrine. Gorge.	Blanc avec une trace médiane noire à la partie inférieure.
Flancs	Blanc.
Ventre, Région anale	Blanc.
Ailes	➤ Petites couvertures bleues incrustées de noir. ➤ Des grandes couvertures blanches forment une barre clair. ➤ Grandes rémiges bleu noir, marquées en leur centre d'un miroir blanc. ➤ Rémiges secondaires bleu voilées de gris.
Croupion	Bleu incrusté de noir.
Queue.	➤ Rectrices assez longues. ➤ Bleu noir en face extérieure, blanchâtre en face intérieure ➤ Les rectrices externes sont blanches.
Bec	Gris foncé, fin pointu et assez court.
Yeux	Noirs.
Pattes, Doigts	Gris foncé.
Ongles	Noirs.

Remarques : Pas de dimorphisme sexuel apparent.

12.1.7 Mésange bleue (*Parus caeruleus*)

Phénotype ancestral



FIGURE 83 – Mésange bleue.

Taille du corps : 13 cm. Corps trapu et arrondi tête ronde.

Zone du plumage	Couleur
Tête	➤ Crâne plat en zone frontale, bombé au sommet. ➤ Calotte bleu azur, délimité par une couronne blanche formant une bande centrale et contournant entièrement la tête. ➤ Trait loreal noir partant de la commissure se prolongeant à hauteur de l'oeil pour entourer le crâne. ➤ Joues blanches. ➤ Menton et gorge noir, qui se prolonge en contournant la joue pour rejoindre la bande noire de tête derrière l'oeil.
Cou. Nuque.	Nuque gris vert surmontée d'une fine zone blanchâtre.
Dos	Gris vert.
Poitrine. Gorge.	Jaune vif.
Flancs	Jaune vif.
Ventre, Région anale	Jaune avec une bande médiane noire qui peut remonter plus ou moins vers le poitrail.
Ailes	➤ Petites couvertures gris vert. ➤ Grandes couvertures gris foncé voilées de bleu et bordées de blanc formant une barre alaire. ➤ Rémiges gris bleuté à liseré clair. ➤ Blanc aux rémiges secondaires.
Croupion	Verdâtre.
Queue.	➤ Rectrices noir bleuté.
Bec	Noir. Court et conique.
Yeux	Noir, dans l'axe du bec.
Pattes, Doigts	Gris noir.
Ongles	Noirs.

Remarques : Pas de dimorphisme sexuel apparent.

13 11.Sittidae

11. Sittidae :

Passereau trapu, queue courte, sexes généralement semblables. Très actives, les meilleurs oiseaux grimpeurs, se déplacent dans tous les sens sur les arbres. Se nourrissent d'invertébrés, graines, fruits secs et coincent les plus durs dans une fente pour les ouvrir à coup de bec.

13.1 Sittelle

Sittelle

13.1.1 Sittelle torchepot (*Sitta europea*)

Phénotype ancestral



FIGURE 84 – Sittelle torchepot.



FIGURE 85 – Sittelle torchepot.

Taille du corps : 14 cm. Corps rond et trapu. Tête massive et plate, sans encolure. Queue et pattes courtes.

Zone du plumage	Couleur
Tête	➤ Très plate, enchâssée directement dans les épaules. ➤ Crâne entièrement gris bleuté. ➤ Trait loreal noir partant de la commissure et s'étirant à hauteur de l'oeil jusqu'à l'encolure. ➤ Joues et menton blanchâtre.
Cou. Nuque.	➤ Cou très peu marqué. ➤ Nuque gris bleuté.
Dos	Gris bleuté.
Poitrine. Gorge.	Gorge blanchâtre se dégradant en chamois clair sur le poitrail.
Flancs	De couleur rousse plus vive en partie inférieure.
Ventre, Région anale	Chamois clair.
Ailes	➤ Couvertures gris bleuté uni. ➤ Rémiges de même couleur gris noir au centre. ➤ Grandes rémiges gris noirâtre.
Croupion	Gris bleu.
Queue.	➤ Très courte. Gris bleu.
Bec	➤ Noir à la pointe, plus clair aux commissures. ➤ Robuste, long et pointu.
Yeux	Noir, dans l'axe du bec.
Pattes, Doigts	Couleur chair.
Ongles	Gris noirs.

Remarques : Pas de dimorphisme sexuel apparent.

14 12. Corvidae

12. Corvidae :

Grands passereaux souvent grégaires. Comportement très évolué. Ne chantent pas. Bec souvent robuste. Sexes semblables.

14.1 Geai

Geai

14.1.1 Geai des chênes (*Garrulus glandarius*)

Phénotype ancestral



FIGURE 86 – Geai des chênes. Photo R. Driesmans.

Taille du corps : 34 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête	➤ Gris beige strié noir sur le crâne. Joues gris beige lavé de rose. ➤ Moustache noire. Menton blanchâtre.
Dos. Gorge. Poitrine.	Dos gris beige. Poitrail beige lavé de rose.
Flancs	Beige lavé de rose.
Ailes	Épaule bleu striée de noir. Aile noire avec miroir blanc.
Croupion	Blanc. Ventre blanc.
Queue.	Noire.
Yeux	Noirs. Cercle oculaire gris.
Bec.	Gris foncé.
Pattes, Doigts. Ongles.	Gris beige pâle.

Remarques : Pas de dimorphisme sexuel apparent.

14.1.2 Geai des chênes Opale (*Garrulus glandarius*)

Mutation Opale




FIGURE 87 – Geai des chênes Mutation Opale. Photo R. Driesmans.

Taille du corps : 34 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête	Gris argenté avec un voile clair de brun rose, strié de gris foncé et que l'oiseau peut relever en forme de huppe. Deux larges moustaches grises foncées..
Occiput.	Brun clair avec un voile rose.
Gorge.	Blanc sale.
Dos.	Manteau blanc argenté avec un voile gris clair.
Poitrine. Flancs	Gris argenté avec un voile gris clair.
Ailes	➤ Rémiges primaires gris clair avec les externes gris argenté. ➤ Rémiges secondaires gris clair avec les externes plus claires. ➤ Dessin caractéristique des ailes d'un bleu plus clair mais encore bien visible.
Croupion	Blanc.
Queue.	Sus-caudales gris clair et sous-caudales gris foncé.
Yeux	Bleu clair, avec cercle oculaire gris foncé.
Bec.	Gris foncé.
Pattes, Doigts.	Couleur chair foncé.
Ongles.	Couleur corne clair.

Remarques : Pas de dimorphisme sexuel apparent.

14.2 Pies

Pies

14.2.1 Pie bavarde (*Pica pica*)

Phénotype ancestral



FIGURE 88 – Pie bavarde. Photo Philippe Rocher.

Taille du corps : 48 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Noir avec des soies rictales noires.
Yeux.	Noirâtres.
Tête. Cou. Dos.	Noir de jais brillant.
Gorge. Jambes.	Noir de jais brillant.
Haut de la Poitrine.	Noir de jais brillant.
Sus et Sous-caudales.	Noir de jais brillant.
Tête. Scapulaires.	Noir avec un reflet pourpre verdâtre.
Bas de la Poitrine.	Blanc.
Ventre. Flancs.	Blanc.
Grandes Sus Alaires.	Blanc.
Ailes.	<i>Rémiges primaires et secondaires</i> : Noires avec un reflet métallique.
Queue.	<i>Rectrices</i> : Noires avec des reflets métalliques. Les rectrices sont longues.

Remarques : Les premières rémiges externes sont toujours graduellement plus courtes que les autres.

14.2.2 Pie bavarde Brune (*Pica pica*)

Mutation Brune



FIGURE 89 – Pie bavarde Brune.

Taille du corps : 48 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Brun avec des soies rectales brunes.
Yeux.	Bruns.
Tête. Cou. Dos.	Bruns.
Gorge. Jambes.	Bruns.
Haut de la Poitrine.	Bruns.
Sus et Sous-caudales.	Bruns.
Scapulaires.	Brunes.
Bas de la Poitrine.	Brun.
Ventre. Flancs.	Brun.
Grandes Sus Alaires.	Brunes.
Ailes.	<i>Rémiges primaires et secondaires</i> : Brunes.
Queue.	<i>Rectrices</i> : Brunes.

Remarques : Les premières rémiges externes sont toujours graduellement plus courtes que les autres.

14.2.3 Pie bleue (*Cyanopica cyanus*)

Phénotype ancestral



FIGURE 90 – Pie bleue. Photo E. Gomez.

Taille du corps : 34 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Longueur (3 cm). Noir, robuste avec la pointe du maxillaire supérieur légèrement courbée sur celle inférieure.
Yeux.	Brun foncé, avec la pupille noire. Ligne circulaire foncée.
Tête et Front.	Casquette qui inclut l'oeil de couleur noire.
Gorge.	Blanc sale.
Épaules.	Gris perlé.
Flancs.	De couleur gris bleu.
Poitrine. Ventre.	Gris clair avec une légère tonalité brunâtre.
Ailes.	Courtes, de couleur bleuté avec une légère tonalité gris brunâtre sur les rémiges.
Queue.	Très longue, de couleur bleuté avec l'extrémité blanchâtre. Les rectrices externes sont courtes et augmentent de longueur jusqu'à la moitié de la suivante.
Pattes. Doigts. Ongles.	Noirs.

Remarques : La femelle présente les mêmes couleurs que le mâle, mais en plus pâle et moins brillant.

Défauts classiques :

- Casquette mal délimitée.
- Queue en repousse, désordonnée ou cassée.
- Gorge couleur mal définie.
- Bec dénudé avec un manque de plumes tant sur la partie supérieure qu'inférieure.
- Rémiges en repousse.

14.3 Corbeaux

Corbeaux

14.3.1 Corbeau freux (*Corvus frugilegus*)

Phénotype ancestral



FIGURE 91 – Corbeau freux. Photo S. Chartier.

Taille du corps : 48 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	➤ Noir. ➤ Le bec est plus droit et plus effilé que chez la corneille noire. Il possède la base du bec décharnée (gris blanchâtre). ➤ La base du bec se dénude graduellement vers la deuxième année, donc, en plumage juvénile, le freux n'a pas la base du bec décharnée.
Yeux.	Noirs.
Plumage du corps.	Entièrement noir à reflets violacés.
Ailes.	Rémiges primaires et secondaires noires à reflets violacés.
Queue.	Les rectrices sont noires et la forme de la queue est arrondie.
Pattes. Doigts.	Noirs.
Ongles.	Noirs.

Pas de dimorphisme sexuel.

Remarques : Une caractéristique typique du freux est la culotte (plumage lâche aux cuisses. **N.B. ne pas punir.**)

Attention à la composition de l'aile des corvidés.

- 1. La première rémige mesure la moitié de la longueur de la seconde.
- 2. La deuxième rémige mesure les trois quart de la longueur de la première.
- 3. Les troisièmes et quatrièmes rémiges primaires sont les deux plus longues.

Lors du jugement des corvidés, il faut tenir compte de cette caractéristique et ne jamais écrire : « Rémige trop courte ou en repousse ».

14.3.2 Corneille noire (*Corvus corone corone*)

Phénotype ancestral



FIGURE 92 – Corneille noire. Photo E. Gomez.



FIGURE 93 – Corneille noire. Photo Heinzel 2010.

Taille du corps : 47 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	➤ Noir avec des soies rictales noires. ➤ Pointe de la mandibule supérieure plus ou moins courbée.
Yeux.	Noirs.
Plumage du corps.	Entièrement noir à reflets violacés.
Gorge.	Les plumes de la gorge et des côtés du cou sont un peu allongées et pointues.
Ailes.	Les rémiges primaires et secondaires sont noires à reflets verdâtres.
Queue.	Les rectrices sont noires et la forme de la queue est arrondie.
Pattes. Doigts.	Noirs.
Ongles.	Noirs.

Pas de dimorphisme sexuel.

Défauts classiques :

- Soies rictales abimées.
- Pas de lustre.

14.3.3 Corneille mantelée (*Corvus corone cornix*)

Phénotype ancestral



FIGURE 94 – Corneille mantelée. Photo wikipedia.

Taille du corps : 47 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Noir, recouvert des soies rictales noires.
Yeux.	Noirs.
Manteau.	➤ Tête, cou, gorge et haut de la poitrine sont noirs avec un reflet métallique. ➤ Les autres parties : dos, ventre, flancs et croupion sont gris bleu.
Gorge.	Les plumes de la gorge et du côté du cou sont effilées et pointues.
Ailes.	Rémiges primaires, secondaires et couvertures sont noires.
Queue.	➤ Rectrices : noir. ➤ La forme de l'extrémité de la queue est arrondie.
Pattes. Doigts.	Noirs.
Ongles.	Noirs.

Pas de dimorphisme sexuel.

Défauts classiques :

- Soies rictales abimées.
- Couvertures du manteau irrégulier.
- Dessin des parties gris bleu irrégulier.

14.3.4 Choucas des tours (*Coloeus monedula*)

Phénotype ancestral



FIGURE 95 – Choucas des tours. Photo Philippe Rocher.

Taille du corps : 33 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Noir avec des soies rictales noires.
Yeux.	Gris bleu avec la pupille noire.
Couronne. Front.	Noir à reflets bleutés.
Nuque. Joes.	Gris argenté.
Dos.	Noir avec des reflets bleutés.
Manteau. Croupion.	Noir avec des reflets métalliques.
. Couvertures.	Noir avec des reflets métalliques.
Sus-caudales.	Noir avec des reflets métalliques.
Gorge. Menton.	Noir.
Ventre. Flancs.	Noir.
Ailes.	Noir avec un reflet bleuté.
Queue.	Noire.
Pattes. Doigts.	Noirs.
Ongles.	Noirs.

Pas de dimorphisme sexuel.

Remarque : L'extrémité des ailes touche presque l'extrémité de la queue.
Les trois premières rémiges primaires sont graduellement plus courtes que les suivantes.

14.3.5 Grand corbeau (*Corvus corax*)

Phénotype ancestral



FIGURE 96 – Grand corbeau. Photo E. Gomez.



FIGURE 97 – Grand corbeau. Détail du bec.



FIGURE 98 – Grand corbeau.

Taille du corps : 64 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Noir, recouvert des soies rictales noires.
Yeux.	Noirs.
Tête. Cou. Gorge. Manteau. Haut de la poitrine.	Noirs avec un reflet métallique. Les autres parties : dos, ventre, flancs et croupion sont noirs.
Gorge.	Les plumes de la gorge et du côté du cou sont effilées et pointues.
Ailes.	Rémiges primaires, secondaires et couvertures sont noires.
Queue.	Rectrices : noir. La forme de l'extrémité de la queue est arrondie.
Pattes. Doigts.	Noirs.
Ongles.	Noirs.

Pas de dimorphisme sexuel.

Défauts classiques :

- Soies rictales abîmées.
- Couvertures du manteau irrégulier.

15 13.Sturnidae

13. Sturnidae :

Passereaux grégaires de taille moyenne. Plumage souvent noirâtre et irisé. Pattes plus ou moins courtes, bec robuste. Sexes semblables. Marchent à petits pas et courent.

15.1 Étourneaux

Étourneaux

15.1.1 Étourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*)

Phénotype ancestral



FIGURE 99 – Étourneau sansonnet.



FIGURE 100 – Étourneau sansonnet.



FIGURE 101 – Étourneau sansonnet. Photo 14. Mâle.




FIGURE 102 – Étourneau sansonnet. Photo 15. Femelle.

Taille du corps : 21,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête,	Noir irisé pointillé de blanc. Hiver : reflet brun.
Dos. Gorge. Poitrine. Flancs. Ventre.	Idem.
Ailes.	Été : Noir liseré de brun. Hiver : reflet brun.
Croupion.	Été : Noir pointillé de blanc. Hiver : reflet brun.
Queue.	Été : Noir liseré brun. Hiver : plus brun.
Bec.	Gris noirâtre. Assez long, fin et pointu.
Yeux.	Brun foncé. Proche du bec.
Bec.	Été : Jaune citron. Hiver : Gris foncé, base jaunâtre.
Pattes, Doigts	Été : Rouge brun. Hiver : Gris foncé.
Ongles.	Été : Rouge brun. Hiver : Gris foncé.

Remarques : La détermination du sexe peut dans la plupart des cas être basée sur la couleur de l'oeil qui présente toujours un centre brun foncé et un cercle extérieur brun chez le mâle (Photo 14) et jaune, blanchâtre ou brun jaunâtre chez la femelle (Photo 15).

Au printemps la base de la mandibule inférieure devient bleuâtre chez le mâle (Photo 14) et rosâtre chez la femelle. Cette coloration temporaire subsiste peu de temps après la nidification. Les mesures biométriques se montrent peu utiles, la longueur alaire chez le mâle s'étend de 126 à 135 mm et de 122 à 131 mm chez la femelle.

15.1.2 Étourneau sansonnet Brun (*Sturnus vulgaris*)

Mutation Brune



FIGURE 103 – Étourneau sansonnet Brun. Photo JL Berbudeau.

Taille du corps : 21,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête,	Été : brun noirâtre pointillé blanc. Hiver : Voile brun.
Dos. Gorge. Poitrine. Flancs.	Idem.
Ailes.	Été : Brun noirâtre liseré brun, plus visible en hiver.
Croupion.	Été : Brun noirâtre pointillé blanc. Hiver : Voile brun.
Queue.	Brun noirâtre liseré brun, plus visible en hiver.
Yeux.	Noirs.
Bec.	Été : Jaunâtre. Hiver : Gris brun.
Pattes, Doigts.	Gris brun.
Ongles.	Été : Gris brun.

15.1.3 Étourneau sansonnet Agate (*Sturnus vulgaris*)

Mutation Agate



FIGURE 104 – Étourneau sansonnet Agate.

Taille du corps : 21,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête,	Gris foncé (bleuté) avec pointillés de beiges.
Dos.	Gris brun avec pointillés beiges.
Gorge.	Blanc crème.
Flancs. Poitrine.	Gris foncé avec des dessins pointillés blancs.
Ailes.	Brun grisâtre. Les extrémités des rémiges primaires sont plus foncées. Rémiges secondaires plus claires, avec le liseré brun clair.
Croupion.	Gris foncé, liseré de gris beige.
Queue.	Gris foncé, plumes bordées de gris beige.
Yeux.	Brun foncé avec pupille jaune brun.
Bec.	Gris clair à base jaune.
Pattes, Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur corne.

15.1.4 Étourneau sansonnet Phéo (*Sturnus vulgaris*)

Mutation Phéo



FIGURE 105 – Étourneau sansonnet Phéo. Photo R. Driesmans.

Taille du corps : 21,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête,	Couleur de fond blanc crème avec un dessin d'écailles blanches, avec un liseré brun qui donne un aspect pointillé blanc et brun.
Dos. Gorge. Poitrine.	Gris brun avec pointillés beiges.
Flancs.	Couleur de fond blanc crème avec un dessin d'écailles blanches, avec un liseré brun qui donne un aspect pointillé blanc et brun.
Ailes.	Rémiges primaires blanches avec un léger liseré brun. Rémiges secondaires blanches avec un liseré brun plus large. Couvertures beige clair avec un large liseré brun.
Croupion.	Beige clair avec des écailles brunes.
Queue.	Brun clair.
Yeux.	Rouges.
Bec.	Été : Jaunâtre. Hiver : Gris clair.
Pattes, Doigts	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.



FIGURE 106 – Étourneau sansonnet Phéo. Photo JL. Berbudeau.

15.1.5 Étourneau sansonnet Blanc (*Sturnus vulgaris*)

Mutation Blanche




FIGURE 107 – Étourneau sansonnet Blanc. Photo R. Driesmans.

Taille du corps : 21,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête,	Blanc terne avec apparence de pointillés.
Dos. Gorge. Poitrine.	Idem.
Flancs.	Idem.
Ailes.	Idem.
Croupion.	Idem.
Queue.	Blanc.
Yeux.	Noirs.
Bec.	Gris rosé.
Pattes, Doigts	Rose chair.
Ongles.	Rose chair.

15.1.6 Étourneau sansonnet Pastel (*Sturnus vulgaris*)

Mutation Pastel



FIGURE 108 – Étourneau sansonnet Pastel.

Taille du corps : 21,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête,	Été : Gris argenté pointillé blanc. Hiver : Voile beige.
Dos. Gorge.	Idem.
Poitrine.	
Flancs.	Idem.
Ailes.	Gris argenté léger liseré beige, plus visible l'hiver.
Croupion.	Été : Gris pointillé blanc. Hiver : Voile beige.
Queue.	Gris argenté liseré beige, plus visible en hiver.
Yeux.	Noirs.
Bec.	Été : Jaune clair. Hiver : Gris rosé.
Pattes, Doigts	Gris clair.
Ongles.	Gris clair.



FIGURE 109 – Étourneau sansonnet Pastel et Ancestraux.

15.1.7 Étourneau rose (*Sturnus roseus*)

Phénotype ancestral



FIGURE 110 – Étourneau rose. Photo Wikipedia.

Remarques : La femelle ne diffère du mâle que par des couleurs moins brillantes et moins vive, une taille moins forte et une huppe plus courte.

82

Taille du corps : 21 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête,	Noir avec des reflets vert et pourpre. Les plumes du sommet de la tête sont longues et étroites et peuvent se relever en huppe.
Dos.	De couleur rose plus pâle ou plus vive selon l'âge et la saison. Cette couleur se perd en captivité.
Poitrine. Gorge.	➤ Poitrine : De couleur rose plus pâle ou plus vive selon l'âge et la saison. Cette couleur se perd en captivité. ➤ Gorge : Noir avec des reflets vert et pourpre.
Flancs.	De couleur rose plus pâle ou plus vive selon l'âge et la saison. Cette couleur se perd en captivité.
Ailes.	➤ Rémiges primaires : Brunes, bordées à l'extérieur de noir violet. ➤ Rémiges secondaires : Sont noir vert du côté externe et brune du côté interne avec les trois dernières rémiges près du corps noir, vert sur les deux côtés. ➤ Les couvertures : Noires avec des reflets verts et pourpres.
Croupion.	De couleur rose plus pâle ou plus vive selon l'âge et la saison.
Queue.	De couleur noire avec des reflets verts et violets.
Bec.	Noir et plombé de la base au milieu et de couleur chair ou rose du milieu à la pointe.
Yeux.	Brun foncé.
Pattes, Doigts	De couleur chair plus ou moins foncée.
Ongles.	De couleur noirâtre.

16 14. Passeridae

14. Passeridae :

Plumage dépourvu de couleurs vives. Bec court et épais, queue peu ou pas échancrée.

16.1 Niverolle

Niverolle

16.1.1 Niverolle (*Montifringilla nivallis*)

Phénotype ancestral



FIGURE 111 – Niverolle. Photo E. Gomez.

Taille du corps : 17 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Conique, assez robuste et pointu. Jaune à la base et noirâtre à la pointe. Le bec devient entièrement noir en été.
Yeux.	Noirs.
Tête.	➤ Calotte : Crânienne. Nuque et joues : Gris-ardoise. Lorums : Gris-noirâtre. ➤ Bavette : Noirâtre, plus distincte en été qu'en hiver. Couvrant le menton et arrondie à son contour inférieur. La bavette est séparée du gris de la tête par une ligne moustachale oblique de couleur gris clair, qui joint le dessin de la joue et se fond dans la couleur de la poitrine.
Dos.	Brun foncé, tranchant nettement sur le gris foncé de la nuque. Le pourtour de chaque plume dorsale est plus clair que le centre, ce qui dessine un écaillage très régulier de la totalité du manteau.
Poitrine.	Du même gris clair uni que la base des joues, allant en s'éclaircissant vers le ventre.
Flancs.	Gris uniforme comme la poitrine, plus clair au voisinage de la queue.
Ventre.	Blanc sale jusqu'à la partie anale.
Ailes.	➤ Couvertures et rémiges secondaires : Blanc sale, déterminant une large plage blanche sur l'aile. ➤ Les rémiges secondaires internes portent une marque brun foncé avec liseré plus clair. ➤ Rémiges primaires : Noires sur les deux tiers de leur longueur terminale et blanches à leur base. ➤ Rémiges bâtardes : Noires, ce qui dessine un très court miroir blanc. ➤ Les ailes sont assez longues et recouvrent la queue jusqu'au deux tiers.
Croupion.	Noirâtre.
Queue.	➤ Les deux rectrices centrales sont brunâtres chez les jeunes et noires chez les adultes. Toutes les autres sont blanches avec l'extrémité noire sur environ 1 cm. ➤ La queue est de longueur moyenne et légèrement échancrée.
Pattes, Doigts	Noirs.
Ongles.	Noirs.
Forme Générale.	Oiseau d'aspect robuste sans être lourd.

Dimorphisme sexuel : Il n'y a pas de dimorphisme marqué entre les sexes. La bavette de la femelle n'est cependant que très légèrement marquée.

Défauts classiques des niverolles mâles et femelles.

- 1) Manque de netteté dans l'écaillage dorsal.
- 2) Bavette totalement absente (sujet en plumage juvénile avant la 1ère mue).
- 2) Dessin mal délimité.
- 3) Ailes croisées ou pendantes.

83

16.2 Moineaux

Moineaux

16.2.1 Moineau souldie (*Petronia petronia*)

Phénotype ancestral



FIGURE 112 – Moineau souldie.



FIGURE 113 – Moineau souldie. Photo E. Gomez.

Taille du corps : 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Conique et robuste. Corne foncé à la mandibule supérieure, ocre jaune à la mandibule inférieure. La pointe de la mandibule supérieure est plus foncée.
Yeux.	Brun foncé.
Tête.	Plate, encolure large. Sommet du crâne gris beige clair, délimité de chaque côté par une bande longitudinale gris brun foncé qui s'étire vers la nuque. Les deux barres se rejoignent sur le front. Sourcils et moustaches : Gris beige, très clair. Dessin des joues gris brun.
Dos.	Couleur de fond gris beige, marqué d'un écaillage très net gris brun foncé.
Gorge.	Gris beige clair, soulignée à la base par une tache oblongue jaune plus ou moins nette.
Poitrine.	Gris beige, légèrement écaillé.
Flancs.	Gris beige, marqués d'un écaillage plus foncé.
Ventre.	Beige clair, zone anale marquée de brun.
Ailes.	➤ Rémiges et couvertures primaires : Brun noirâtre, liseré de beige. ➤ Rémiges secondaires externes sont marquées de beige très clair à leur extrémité. ➤ Couvertures secondaires : Sont largement liserées de beige très clair.
Croupion.	Beige clair, strié de brun.
Queue.	Assez courte. Rectrices brun noirâtre, liserées de gris beige et bordées de blanchâtre à leur extrémité.
Pattes, Doigts	Brun foncé.
Ongles.	Gris noir.
Forme Générale.	Robuste et trapu.

Défauts :

- 1) Manque de netteté dans le dessin.
- 2) Tache jaune de la gorge absente.

16.2.2 Moineau Espagnol (*Passer hispaniolensis*)

Phénotype ancestral



FIGURE 114 – Moineau espagnol. Photo ebird.

Taille du corps : 14,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	En hiver : Brun grisâtre avec la racine jaunâtre. En Été : Noir. Forme : Conique et robuste.
Yeux.	Brun foncé.
Tête.	Assez puissante et plate, encolure large. Large trait loreal noir, s'affinant en arrière de l'oeil. Fin sourcil blanc. Front, sommet du crâne et nuque : entièrement brun roux. Le dessin de la nuque s'élargit à l'arrière de la joue. Joues : blanc lumineux, légèrement ombrée de gris.
Dos.	Entièrement écaillé de noir sur fond gris beige clair.
Gorge.	Entièrement noir uniforme.
Poitrine.	Noir uni, se dégradant en écaillage noir à la base L'étendue du noir de la poitrine est variable.
Flancs.	Entièrement marqués de larges écailles noires sur fond gris blanc.
Ventre.	Blanchâtre.
Ailes.	Rémiges primaires : Gris noir, liserées de brun Le liseré des rémiges secondaires est plus large. Les couvertures sont roussâtres, liserées de blanc Le liseré des couvertures primaires <i>est plus large</i> et forme une bande alaire.
Croupion.	Gris foncé.
Queue.	Rectrices gris noir, bordées de noir.
Pattes, Doigts	Gris brun foncé.
Ongles.	Gris noir.
Forme Générale.	Un peu plus élancé que le moineau domestique. Robuste et élégant.

Dimorphisme sexuel : La femelle ressemble à celle du moineau domestique avec un écaillage plus net et plus foncé sur le dos. Les stries des flancs et le trait loreal sont plus marqués.

16.2.3 Moineau Cisalpin (*Passer italiae*)

Phénotype ancestral



FIGURE 115 – Moineau cisalpin. Photo ebird.

Remarques : La femelle est semblable à celle du moineau domestique.

Taille du corps : 14,5 cm. Robuste et élégante.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	➤ Robuste, crâne assez plat. ➤ Zone lorale noire, surmontée d'un fin sourcil blanc. ➤ Front, calotte crânienne et nuque : Entièrement brun roux. ➤ Joues : blanchâtres.
Cou. Nuque.	
Dos.	Brun, fortement strié de noir.
Poitrine. Gorge.	➤ Poitrine : Partie supérieure noire s'estompant vers le bas, la base de la poitrine est gris blanchâtre. ➤ Gorge : Large bavette noire couvrant toute la gorge, la bavette est moins intense en hiver.
Flancs.	Gris blanchâtre.
Ventre. Région anale	Gris blanchâtre.
Ailes.	➤ <u>Rémiges primaires</u> : Brun noir, liserées de roussâtre sur le vexille externe. ➤ <u>Rémiges secondaires</u> : Plus rousses. ➤ <u>Couvertures primaires</u> : Brun noir avec large liseré roussâtre. ➤ <u>Couvertures secondaires</u> : Noirâtres, très largement bordées de blanc qui forme une nette bande alaire. ➤ <u>Épaules</u> : Roussâtre.
Croupion.	Gris beige.
Queue.	Rectrices brun noir, liserées de brun grisâtre.
Bec.	Brun noirâtre, plus foncé en été. Conique et robuste.
Yeux.	Noirs.
Pattes. Doigts.	Gris brun.
Ongles.	De couleur foncée.

Défauts :

- 1) Ligne oculaire pas assez nette.
- 2) Stries dorsales irrégulières.
- 3) Barre alaire irrégulières.
- 4) Bavette irrégulière ou trop flou chez le mâle.

16.2.4 Moineau Domestique Mâle (*Passer domesticus*)

Phénotype ancestral



FIGURE 116 – Moineau domestique Mâle. Photo de François Desbordes.




FIGURE 117 – Moineau domestique Mâle. Plumage Hivernal et Nuptial.

Taille du corps : 14,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Lorum. Région sous l'oeil.	Noirs. A partir de l'oeil, existence d'une raie brun marron qui va en s'élargissant vers la nuque. Petit point blanc derrière l'oeil.
Front. Couronne. Nuque.	Gris.
Joues. Régions parotiques.	Gris blanchâtre.
Gorge. Menton. Milieu du haut de la poitrine.	Été : Noirs. Hiver : Noir grisâtre avec un dessin pas aussi net qu'en été. Reste de la poitrine blanchâtre.
Épaules.	Scapulaires brunes rayées de noir avec le bord blanc grisâtre formant un dessin sur les épaules.
Dos.	Manteau brun marron strié de noir. Bas du dos blanc grisâtre.
Flancs.	Blanc grisâtre nuancés d'une teinte isabelle.
Rémiges.	Primaires brun noir avec liseré roussâtre le long du vexille externe.
Couvertures.	Petites marron vif. Moyennes brun noir terminées par un bord blanchâtre formant une bande alaire. Grandes brun noir avec un large bord externe roux et terminées par un bord blanchâtre.
Croupion.	Gris brunâtre.
Queue.	Rectrices brun noir avec liseré externe grisâtre. Sous-caudales roussâtres.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Brun grisâtre avec la racine jaunâtre en hiver, noire en été.
Pattes. Doigts.	Brun clair.
Ongles.	Noirs.

Défauts :

- 1) Lignes oculaires pas assez nettes surtout chez les femelles,
- 2) Bavette et dessin de la poitrine irréguliers,
- 3) Flancs trop clairs par rapport à la poitrine,
- 4) Barres alaires irrégulières,
- 5) Dessin du dos irrégulier.

16.2.5 Moineau Domestique Femelle (*Passer domesticus*)

Phénotype ancestral



FIGURE 118 – Moineau domestique Femelle. Photo de François Desbordes.



FIGURE 119 – Moineau domestique Femelle.

Taille du corps : 14,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Brune avec des traits sourciliers brun jaune de la base du bec à la région parotique.
Gorge. Poitrine.	Gris brun. Pas de bavette ni de plastron noirs.
Épaules. Ventre.	Gris brun.
Dos.	Brun dominant avec des stries noir brun.
Flancs.	Gris brun, un peu plus foncé que la poitrine.
Ailes.	Comme le mâle mais les bords des rémiges sont d'un brun plus pâle. Bande alaire typique.
Croupion.	Brun.
Queue.	Comme le mâle mais les bords des rectrices sont d'un brun plus pâle.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Couleur corne.
Pattes. Doigts.	Brun clair.
Ongles.	Noirs.

Défauts :

- 1) Lignes oculaires pas assez nettes surtout chez les femelles,
- 2) Bavette et dessin de la poitrine irréguliers,
- 3) Flancs trop clairs par rapport à la poitrine,
- 4) Barres alaires irrégulières,
- 5) Dessin du dos irrégulier.

16.2.6 Moineau Domestique Mâle Brun (*Passer domesticus*)

Phénotype ancestral



FIGURE 120 – Moineau domestique Mâle Brun.



FIGURE 121 – Moineau domestique Mâle Brun. Photo E. Gomez.

Taille du corps : 14,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Lorums.	Brun foncé. Trait brun rougeâtre de derrière les yeux vers la nuque en s'élargissant. Petit point blanc derrière les yeux.
Front. Couronne. Nuque, Croupion.	Brun beige.
Joues. Régions parotiques.	Crème.
Gorge. Menton. Milieu du haut de la poitrine.	Été : Bavette brun foncé. Hiver : Brun foncé avec un dessin pas aussi net qu'en été. Reste de la poitrine crème foncé.
Épaules.	Scapulaires brun rouge rayées de brun rouge foncé avec le bord brun clair.
Dos.	Manteau brun chaud avec des reflets bruns rougeâtre strié de brun très foncé.
Flancs.	Crème foncé.
Rémiges.	Primaires brun foncé avec liseré brun clair le long du vexille externe.
Couvertures.	Petites brun rougeâtre. Moyennes brun foncé avec un liseré brun clair. Grandes brun foncé avec bord brun rougeâtre et terminées par un bord brun clair. Une autre bande alaire blanchâtre existe entre les moyennes et les grandes couvertures.
Queue.	Rectrices brun chaud avec liseré externe brun clair.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Couleur chair teinté de jaune à la base du bec en hiver, brunâtre en été.
Pattes. Doigts.	Couleur chair teinté de jaunâtre.
Ongles.	Couleur chair.

16.2.7 Moineau Domestique Femelle Brune (*Passer domesticus*)

Phénotype ancestral



FIGURE 122 – Moineau domestique Femelle Brune. Photo JL. Berbudeau



FIGURE 123 – Moineau domestique Femelle Brune. Photo R. Driesmans

Taille du corps : 14,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Front. Couronne. Nuque,	Brun chaud.
Traits sourciliers. Lorums.	Couleur crème.
Joues.	Brun clair.
Gorge. Poitrine. Ventre. Flancs.	Brun jaunâtre chaud. Couleur bien régulière.
Dos.	Brun chaud strié de brun foncé.
Rémiges.	Brun foncé avec les liserés plus clairs.
Couvertures.	La barre alaire entre les couvertures moyennes et les grandes couvertures est crème clair. l'extrémité des grandes couvertures forme une barre alaire brun clair.
Croupion.	Brun chaud.
Queue.	Brun chaud.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Couleur chair teinté de jaune à la base.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair foncé.

16.2.8 Moineau Domestique Mâle Phéo Récessif (*Passer domesticus*)

Mutation Phéo Récessif

Standard en attente de validation par la COM/OMJ



FIGURE 124 – Moineau domestique Mâle Phéo Récessif. Photo R. Driesmans.

Taille du corps : 14,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Lorums.	Brun clair.
Front. Couronne. Nuque,	Beige clair.
Traits oculaires.	Brun marron à partir de l'oeil en s'élargissant vers la nuque.
Joues. Régions parotiques.	Blanc sale avec léger voile brun.
Gorge.	Dessin typique brun clair.
Poitrine. Ventre.	Blanc sale.
Dos.	Blanc sale avec dessin phéo (liseré brun) sur tout le dos.
Flancs.	Blanc sale avec voile brun clair.
Rémiges. Rectrices.	Blanc sale avec liseré brun marron.
Couvertures.	<u>Petites couvertures</u> : Brun marron. <u>Grandes et moyennes couvertures</u> : Blanc sale avec liseré brun marron. <u>Bande alaire</u> : Blanc sale entre les moyennes et les grandes couvertures.
Croupion.	Beige clair avec un liseré brun marron.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Couleur chair. Parfois une flamme foncée à la base du bec.
Pattes. Doigts. Ongles.	Couleur chair.
Hérédité.	Récessive. Naissent avec les yeux rouges.

Remarque : La mutation « PHEO » se présente sous deux types différents, à savoir un type avec les yeux rouges (donc Récessif) et un autre type avec les yeux noirs (donc Dominant). Le type avec les yeux noirs présentera un phéo marquage moins prononcé, mais beaucoup plus sombre dans l'ensemble. Évidemment, ce sont deux types qui doivent être jugés différemment. Des recherches en cours devraient clarifier la dénomination.

Attention aux formes mixtes, à savoir les oiseaux avec les deux facteurs. La norme est fixée pour les yeux rouges qui mettent le mieux en valeur le joli facteur phéo.

16.2.9 Moineau Domestique Femelle Phéo Récessif (*Passer domesticus*)

Mutation Phéo Récessif

Standard en attente de validation par la COM/OMJ



FIGURE 125 – Moineau domestique Femelle Phéo Récessif. Photo R. Driesmans.

Taille du corps : 14,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Front. Vertex. Occiput.	Blanc sale avec voile brun.
Traits sourciliers. Nuque. Lorums. Joues. Régions parotiques.	Brun chaud.
Gorge. Poitrine. Flancs.	Brun clair.
Ventre.	Brun clair mais plus clair que la poitrine.
Dos.	Blanc sale avec dessin phéo brun très prononcé.
Ailes.	Même description que le mâle, mais les liserés sont brun chaud.
Croupion.	Brun chaud avec liseré plus foncé.
Queue.	Blanc sale avec liseré brun chaud sur toutes les rectrices.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Couleur chair. Peut montrer une flamme foncée à la base du bec.
Pattes. Doigts. Ongles.	Couleur chair.
Hérédité.	Récessive. Naissent avec les yeux rouges.

Remarque : La mutation « PHEO » se présente sous deux types différents, à savoir un type avec les yeux rouges (donc Récessif) et un autre type avec les yeux noirs (donc Dominant). Le type avec les yeux noirs présentera un phéo marquage moins prononcé, mais beaucoup plus sombre dans l'ensemble. Évidemment, ce sont deux types qui doivent être jugés différemment. Des recherches en cours devraient clarifier la dénomination.

Attention aux formes mixtes, à savoir les oiseaux avec les deux facteurs. La norme est fixée pour les yeux rouges qui mettent le mieux en valeur le joli facteur phéo.

16.2.10 Moineau Domestique Mâle Phéo Dominant (*Passer domesticus*)

Mutation Phéo Dominant

Travail en cours d'étude pour la détermination de la mutation.



FIGURE 126 – Moineau domestique Mâle Phéo Dominant.



FIGURE 127 – Moineau domestique Mâle Phéo Dominant.

Taille du corps : 14,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Lorums.	Blanc gris.
Front. Couronne. Nuque,	Blanc gris.
Traits oculaires.	Brun marron à partir de l'oeil en s'élargissant vers la nuque.
Joues. Régions parotiques.	Blanc gris.
Gorge.	Dessin typique blanc gris.
Poitrine. Ventre.	Blanc sale.
Dos.	Blanc gris avec dessin phéo (liseré brun) sur tout le dos.
Flancs.	Blanc gris.
Rémiges.	Blanches.
Rectrices.	Blanches grises.
Couvertures.	<u>Petites couvertures</u> : Brun marron. <u>Grandes et moyennes couvertures</u> : Blanc gris avec liseré brun marron. <u>Bande alaire</u> : Blanc gris entre les moyennes et les grandes couvertures.
Croupion.	blanc gris.
Yeux.	Brun foncé (Naissent avec les yeux noirs).
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts. Ongles.	Couleur chair.
Hérédité.	Dominant. Naissent avec les yeux noirs.

Remarque : La mutation « PHEO » se présente sous deux types différents, à savoir un type avec les yeux rouges (donc Récessif) et un autre type avec les yeux noirs (donc Dominant). Le type avec les yeux noirs présentera un phéo marquage moins prononcé, mais beaucoup plus sombre dans l'ensemble. Évidemment, ce sont deux types qui doivent être jugés différemment. Des recherches en cours devraient clarifier la dénomination.

Attention aux formes mixtes, à savoir les oiseaux avec les deux facteurs. La norme est fixée pour les yeux rouges qui mettent le mieux en valeur le joli facteur phéo.

16.2.11 Moineau Domestique Femelle Phéo Dominant (*Passer domesticus*)

Mutation Phéo Dominant

Travail en cours d'étude pour la détermination de la mutation.



FIGURE 128 – Moineau domestique Femelle Phéo Dominant.

Remarque : La mutation « PHEO » se présente sous deux types différents, à savoir un type avec les yeux rouges (donc Récessif) et un autre type avec les yeux noirs (donc Dominant). Le type avec les yeux noirs présentera un phéo marquage moins prononcé, mais beaucoup plus sombre dans l'ensemble. Évidemment, ce sont deux types qui doivent être jugés différemment. Des recherches en cours devraient clarifier la dénomination.

Attention aux formes mixtes, à savoir les oiseaux avec les deux facteurs. La norme est fixée pour les yeux rouges qui mettent le mieux en valeur le joli facteur phéo.

Taille du corps : 14,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Front. Vertex. Occiput.	Blanc gris.
Traits sourciliers. Nuque. Lorums. Joues. Régions parotiques.	Bruns mais moins marqués que che le mâle.
Gorge. Poitrine. Flancs.	Blanc gris.
Ventre.	Blanc gris.
Dos.	Blanc gris.
Ailes.	Même description que le mâle, mais les liserés sont moins marqués.
Croupion.	Blanc gris.
Queue.	Blanc gris.
Yeux.	Brun foncés (Naissent avec les yeux noirs).
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts. Ongles.	Couleur chair.
Hérédité.	Dominant. Naissent avec les yeux noirs.

16.2.12 Moineau Domestique Mâle Agate (*Passer domesticus*)

Mutation Agate

Travail en cours d'étude pour la détermination de la mutation.



FIGURE 129 – Moineau domestique Mâle Agate. Photo Standard KBOF.

Taille du corps : 14,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Lorums.	Noirs.
Front. Couronne. Nuque,	Gris brun léger.
Traits oculaires.	Brun rouge. Petits points blancs derrière les yeux.
Joues.	Gris beige.
Gorge.	Bavette typique noire.
Poitrine. Ventre. Flancs.	Blanc sale.
Dos.	Brun beige strié de brun noir.
Rémiges.	Beiges avec un léger liseré brun noisette.
Couvertures.	<u>Petites couvertures</u> : Brun noisette. <u>Moyennes couvertures</u> : Beiges avec les extrémités blanchâtres formant une bande alaire. <u>Grandes couvertures</u> : Brun beige avec un liseré beige clair.
Queue.	Beiges avec liseré brun beige clair.
Croupion.	Beige.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Noir en été et chair foncé à base jaunâtre en hiver.
Pattes. Doigts. Ongles.	Couleur chair.
Hérédité.	Récéssive liée au sexe.

Défauts :

A remplir.

Remarques :

Un travail de recherche en élevage est en cours afin de confirmer si cette mutation est de l'agate ou du pastel.

16.2.13 Moineau Domestique Femelle Agate (*Passer domesticus*)

Mutation Agate

Travail en cours d'étude pour la détermination de la mutation.

Photo en

Attente

Taille du corps : 14,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Gris brun foncé avec les traits sourciliers brun beige clair.
Gorge. Poitrine.	Beige clair avec une teinte ivoire.
Ventre. Flancs.	Beige clair avec une teinte ivoire.
Dos.	Brun beige strié de noir.
Rémiges.	Beiges.
Couvertures.	<u>Petites couvertures</u> : Brun clair. <u>Moyennes couvertures</u> : Brun foncé terminées par un bord blanc sale formant une bande alaire. <u>Grandes couvertures</u> : Brun foncé avec un liseré beige clair.
Croupion.	Beige.
Queue.	Rectrices beiges avec liseré beige clair.
Yeux.	Brun noir.
Bec.	Couleur chair à base jaune.
Pattes. Doigts. Ongles.	Couleur chair.
Hérédité.	Récessive liée au sexe.

Défauts :

A remplir.

Remarques :

Un travail de recherche en élevage est en cours afin de confirmer si cette mutation est de l'agate ou du pastel.

16.2.14 Moineau Domestique Pastel (*Passer domesticus*)

Mutation Pastel

Travail en cours d'étude pour la détermination de la mutation.
Standard en attente de validation par la COM/OMJ



FIGURE 130 – Moineau domestique Pastel.



FIGURE 131 – Moineau domestique Pastel.

Taille du corps : 14,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Gris brun foncé avec les traits sourciliers brun beige clair.
Gorge. Poitrine.	Beige clair avec une teinte ivoire.
Ventre. Flancs.	Beige clair avec une teinte ivoire.
Dos.	Brun beige strié de noir.
Rémiges.	Beiges.
Couvertures.	<u>Petites couvertures</u> : Brun clair. <u>Moyennes couvertures</u> : Brun foncé terminées par un bord blanc sale formant une bande alaire. <u>Grandes couvertures</u> : Brun foncé avec un liseré beige clair.
Croupion.	Beige.
Queue.	Rectrices beiges avec liseré beige clair.
Yeux.	Brun noir.
Bec.	Couleur chair à base jaune.
Pattes. Doigts. Ongles.	Couleur chair.
Hérédité.	Récessive liée au sexe.

Défauts :

A remplir.

Remarques :

Un travail de recherche en élevage est en cours afin de confirmer si cette mutation est de l'agate ou du pastel.

16.2.15 Moineau Domestique Silice SF (*Passer domesticus*)

Mutation Silice SF

Travail en cours d'étude pour la détermination de la mutation.
Anciennement Poitrine Noire SF Standard en attente de validation
par la COM/OMJ



FIGURE 132 – Moineau domestique Femelle Silice.



FIGURE 133 – Moineau domestique Mâle Silice.

Taille du corps : 14,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Un demi masque de couleur gris noir est formé, il commence à la base supérieure du bec et autour de l'oeil, se poursuit jusqu'à la base du coup puis entoure la gorge.
Gorge.	Courte bavette noire puis de couleur grise jusqu'à la moitié du ventre.
Ventre.	Moitié supérieure grise. Moitié inférieure blanchâtre.
Dos.	Gris blanchâtre.
Rémiges.	Beiges.
Couvertures.	Petites couvertures : Blanchâtres, la pointe est brune. Moyennes et Grandes couvertures : Brun gris.
Croupion.	Blanchâtre.
Queue.	Rectrices Blanchâtre avec la pointe grise.
Yeux.	Brun noir.
Bec.	Noir chez le Mâle. Orange foncé à la base avec la pointe gris noir chez la femelle
Pattes.	
Doigts.	Orange noir.
Ongles.	Noirs.
Hérédité.	Dominante.

16.2.16 Moineau Domestique Mâle Opale (*Passer domesticus*)
Mutation Opale



FIGURE 134 – Moineau domestique Mâle Opale.

Taille du corps : 14,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Lorums.	Gris bleu.
Front. Couronne. Nuque.	Gris argenté.
Traits oculaires.	Gris bleu montrant encore un rien de brun noisette.
Joues.	
Gorge.	Gris argenté avec le dessin gris bleu typique de l'opale.
Poitrine. Ventre.	Gris argenté.
Dos.	Gris argenté strié de gris bleu.
Ailes.	Gris argenté strié de gris bleu. Un léger voile brun noisette est encore visible dans les liserés.
Queue.	Gris argenté avec liserés gris bleu.
Croupion.	Gris argenté.
Yeux.	Noirs.
Bec.	Chair foncé en hiver et noir bleuté en été.
Pattes. Doigts. Ongles.	Couleur chair foncé.
Hérédité.	Récessive.

Défauts :

Couleur d'ensemble trop claire et pas assez grise.

16.2.17 Moineau Domestique Femelle Opale (*Passer domesticus*)
Mutation Opale



FIGURE 135 – Moineau domestique Femelle Opale. Photo KBOF.

Taille du corps : 14,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Gris bleu.
Traits sourciliers.	Gris clair avec une teinte beige.
Lorums.	Gris bleu foncé.
Gorge. Poitrine. Ventre.	Gris argenté.
Dos.	Gris argenté strié de gris bleu.
Rémiges.	Gris bleu clair avec un liseré beige clair sur les couvertures laissant encore voir les caractéristiques typiques des dessins de l'aile.
Croupion.	Gris argenté.
Queue.	Gris argenté.
Yeux.	Noirs.
Bec.	Chair foncé en hiver et noir grisâtre en été.
Pattes. Doigts. Ongles.	Couleur chair foncé.
Hérédité.	Récessive.

Défauts :

Couleur d'ensemble trop claire et pas assez grise.

16.2.18 Moineau Domestique Mâle brun pastel (*Passer domesticus*)

Mutation brun pastel

Travail en cours d'étude pour la détermination de la mutation.



FIGURE 136 – Moineau domestique Mâle brun pastel. Photo UOF P. Malburet.



FIGURE 137 – Moineau domestique Mâle brun pastel.
Photo Berbudeau Jean-Luc.

Taille du corps : 14,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Couronne.	Beige foncé.
Traits oculaires.	Bruns.
Joues.	Couleur crème.
Gorge.	Bavette brun beige.
Poitrine. Ventre. Flancs.	Beiges.
Dos.	Brun clair.
Rémiges.	Primaires beiges et secondaires claires avec un liseré beige long du vexille externe.
Couvertures.	<u>Petites</u> : Brun clair. Moyennes : Brun clair avec une bande alaire beige clair. <u>Grandes</u> : Brun clair. Scapulaires brun clair.
Queue.	Rectrices beiges avec un liseré clair le long du vexille externe.
Croupion.	Couleur crème.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Couleur chair avec la racine jaunâtre.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur corne.
Hérédité.	Liée au sexe et Récessive.

Remarque : Les oiseaux naissent avec les yeux rouges vifs.

Défauts : Couleur d'ensemble trop claire et marquages bruns mal délimités.

16.2.19 Moineau Domestique Femelle brun pastel (*Passer domesticus*)

Mutation brun pastel

Travail en cours d'étude pour la détermination de la mutation.



FIGURE 138 – Moineau domestique Femelle brun pastel.
Photo Berbudeau Jean-Luc.



FIGURE 139 – Moineau domestique Femelle brun pastel.
Photo Berbudeau Jean-Luc.

Taille du corps : 14,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Couleur crème avec les traits sourciliers visibles.
Joues.	Crème beige.
Gorge. Poitrine.	Crème dans l'ensemble.
Ventre. Flancs.	Crème dans l'ensemble.
Dos.	Crème beige.
Rémiges.	Couleur crème beige avec un liseré clair le long du vexille externe.
Couvertures. Scapulaires.	Crème beige.
Croupion.	Crème.
Queue.	Crème beige avec un liseré clair le long du vexille externe.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Couleur chair avec la racine jaunâtre.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur corne.
Hérédité.	Liée au sexe et Récéssive.

Remarque : Les oiseaux naissent avec les yeux rouges vifs.

Défauts : Couleur d'ensemble trop claire et marquages bruns mal délimités.

16.2.20 Moineau Domestique Ino (ex-albino) (*Passer domesticus*)
Mutation Ino (ex-albino)




FIGURE 140 – Moineau domestique Ino (ex-albino). Photo R. Driesmans.



FIGURE 141 – Moineau domestique Ino (ex-albino). Photo Berbudeau Jean-Luc.

Taille du corps : 14,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Blanche légèrement teintée de jaune.
Gorge. Poitrine.	Blanche légèrement teintée de jaune.
Ventre. Flancs.	Blanc légèrement teintée de jaune.
Dos.	Blanc légèrement teintée de jaune.
Ailes.	Blanche légèrement teintée de jaune.
Croupion.	Blanc légèrement teintée de jaune.
Queue.	Blanche légèrement teintée de jaune.
Yeux.	Rouges.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur corne.
Hérédité.	Récessive.

16.2.21 Moineau Domestique Blanc (*Passer domesticus*)

Mutation Blanche

Photo en

Attente

104

104. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 14,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Blanche.
Gorge. Poitrine.	Blanche.
Ventre. Flancs.	Blanc.
Dos.	Blanc.
Ailes.	Blanche.
Croupion.	Blanc.
Queue.	Blanche.
Yeux.	Noirs.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur corne.
Hérédité.	Récessive.

16.2.22 Moineau Domestique Mâle Satiné (*Passer domesticus*)

Mutation Satiné

Photo en

Attente

Taille du corps : 14,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Couronne.	Blanc sale.
Traits oculaires.	Brun rouge clair.
Joues.	Couleur ivoire.
Gorge.	Bavette brun clair.
Poitine. Ventre. Flancs.	Couleur chair.
Dos.	Couleur de fond ivoire avec un dessin dorsal brun beige clair bien visible.
Rémiges.	Couleur ivoire.
Couvertures.	<u>Petites</u> : Brun beige clair. <u>Moyennes</u> : Blanches, formant une bande alaire. <u>Grandes</u> : Couleur ivoire.
Queue.	Couleur ivoire.
Croupion.	Couleur ivoire.
Yeux.	Rouges.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur corne.
Hérédité.	Lié au sexe et Récéssive.

16.2.23 Moineau Domestique Femelle Satiné (*Passer domesticus*)

Mutation Satiné

Photo en

Attente

Taille du corps : 14,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Couronne.	Couleur ivoire légèrement striée.
Traits oculaires.	Couleur ivoire.
Joues.	Couleur ivoire.
Gorge.	Couleur chair.
Poitine. Ventre. Flancs.	Couleur chair.
Dos.	Couleur de fond ivoire avec un dessin dorsal beige clair bien visible.
Rémiges.	Couleur ivoire.
Couvertures.	<u>Petites</u> : Brun beige clair. <u>Moyennes</u> : Blanches, formant une bande alaire. <u>Grandes</u> : Couleur ivoire.
Queue.	Couleur ivoire.
Croupion.	Couleur ivoire.
Yeux.	Rouges.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur corne.
Hérédité.	Lié au sexe et Récéssive.

16.2.24 Moineau Friquet (*Passer montanus*)

Phénotype ancestral




FIGURE 142 – Moineau Friquet. Photo E. Gomez.

Remarque : Pas de dimorphisme sexuel.

Défauts des moineaux friquets :

- 1) Taches des joues irrégulières,
- 2) Barres alaires irrégulières,
- 3) Dessin de la calotte pas net dans la nuque,
- 4) Menton et bavette irréguliers,
- 5) Dessin dorsal irrégulier,
- 6) Couleur des flancs pas identique à celle de la poitrine.

107

107. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 13,5 - 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Dessus de la tête. Nuque.	Brun chocolat.
Côtés de la tête et du cou.	Blancs avec tache noire sur les joues.
Lorums. Trait sous l'oeil. Menton.	Noirs.
Épaules.	Brunes.
Poitrine.	Haut grisâtre et bas blanchâtre.
Flancs. Sous-caudales.	Bruns.
Dos.	Haut du dos brun rayé de noir. Bas du dos gris brun.
Rémiges.	Primaires et secondaires brun noir liserées de roux.
Couvertures.	<u>Grandes</u> : Noires avec bord brun jaunâtre le long du vexille externe et le bout blanchâtre. <u>Moyennes</u> : Noires avec la pointe blanchâtre. <u>Petites</u> : Roux marron.
Queue.	Rectrices brun foncé liserées de brun jaunâtre.
Croupion.	Brun gris.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Noir en été et brun foncé avec la base de la mandibule inférieure jaunâtre en hiver.
Pattes. Doigts.	Couleur corne.
Ongles.	Noirs.

16.2.25 Moineau Friquet Opale (*Passer montanus*)

Mutation Opale



FIGURE 143 – Moineau Friquet Mutation Opale. Photo R. Driesmans.

Remarque : Pas de dimorphisme sexuel.

Défauts des moineaux friquets :

- 1) Taches des joues irrégulières,
- 2) Barres alaires irrégulières,
- 3) Dessin de la calotte pas net dans la nuque,
- 4) Menton et bavette irréguliers,
- 5) Dessin dorsal irrégulier,
- 6) Couleur des flancs pas identique à celle de la poitrine.

108

108. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 13,5 - 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Front. Couronne. Nuque.	Gris bleu.
Joues.	Gris argenté avec une tache gris bleu.
Gorge.	Gris argenté avec bavette gris bleu.
Poitrine.	Gris argenté.
Ventre.	Blanc sale.
Flancs.	Gris argenté.
Dos.	Gris argenté strié de gris bleu.
Rémiges.	Gris argenté.
Couvertures.	<u>Petites</u> : Gris bleu. <u>Moyennes</u> : Gris argenté avec extrémité blanche formant une bande alaire. <u>Grandes</u> : Gris argenté.
Queue.	Gris argenté.
Croupion.	Gris argenté.
Yeux.	Brun noir.
Bec.	Gris bleu avec du jaune à la base.
Pattes. Doigts.	Couleur chair foncé.
Ongles.	Couleur chair foncé.

16.2.26 Moineau Friquet Brun (*Passer montanus*)

Mutation Brun



FIGURE 144 – Moineau Friquet Mutation Brun.

Remarque : Pas de dimorphisme sexuel.

Défauts des moineaux friquets :

- 1) Taches des joues irrégulières,
- 2) Barres alaires irrégulières,
- 3) Dessin de la calotte pas net dans la nuque,
- 4) Menton et bavette irréguliers,
- 5) Dessin dorsal irrégulier,
- 6) Couleur des flancs pas identique à celle de la poitrine.

109

109. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 13,5 - 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Front. Couronne. Nuque.	Brun noisette clair.
Joues.	Blanches avec une tache brun foncé au milieu.
Lorums.	Brun foncé.
Gorge.	Blanche avec bavette brun foncé.
Poitrine.	Couleur isabelle.
Ventre.	Blanc.
Flancs. Croupion.	Brun jaune chaud.
Dos.	Brun jaune chaud, strié de brun foncé.
Rémiges.	Brun jaune.
Couvertures.	<u>Petites</u> : Brun noisette clair. <u>Moyennes</u> : Brun jaune chaud avec bord blanc à l'extrémité (ceci formant une bande alaire). <u>Grandes</u> : Brun jaune avec un liseré isabelle.
Queue.	Brun jaune chaud.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Brun et jaune à la base.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

16.2.27 Moineau Friquet Brun Opale (*Passer montanus*)

Mutation Brun Opale



FIGURE 145 – Moineau Friquet Mutation Brun Opale.

Remarque : Pas de dimorphisme sexuel.

Défauts des moineaux friquets :

- 1) Taches des joues irrégulières,
- 2) Barres alaires irrégulières,
- 3) Dessin de la calotte pas net dans la nuque,
- 4) Menton et bavette irréguliers,
- 5) Dessin dorsal irrégulier,
- 6) Couleur des flancs pas identique à celle de la poitrine.

110

110. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 13,5 - 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Front. Vertex. Occiput.	Brun beige.
Joues.	Gris blanc avec tache brun beige au milieu.
Gorge.	Gris blanc avec bavette brun beige.
Poitrine.	Gris blanc avec un léger voile beige clair.
Ventre.	Gris blanc avec un léger voile beige clair.
Flancs.	Gris blanc avec un léger voile beige clair.
Dos.	Manteau gris, strié de brun beige.
Rémiges.	<u>Grandes</u> : Gris blanc avec un liseré beige. <u>Secondaires</u> : Gris blanc avec un liseré brun beige.
Couvertures.	<u>Petites</u> : Brun beige. <u>Moyennes et Grandes</u> : Gris blanc avec un liseré brun beige.
Croupion.	Brun beige.
Queue.	Rectrices gris blanc légèrement voilé de beige.
Yeux.	Brun noir.
Bec.	Brun foncé.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

17 15.Fringillidae

15. Fringillidae :

Petits passereaux plus ou moins grégaires après la reproduction. Bec robuste de granivore. Chant souvent plus mélodieux que celui des bruants.

17.1 Pinsons

Pinsons

17.1.1 Pinson des arbres Mâle (*Fringilla coelebs*)

Phénotype ancestral



FIGURE 146 – Pinson des arbres. Photo H. Heinzl.

Défauts :

- 1) Dessin des joues irrégulier,
- 2) Barres alaires irrégulières ou incomplètes,
- 3) Miroir pas visible ou pas symétrique,
- 4) Flancs trop clair,
- 5) Couleur de la poitrine irrégulière.



FIGURE 147 – Pinson des arbres Mâle. Photo KBOF.

111

111. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Front.	Noir.
Couronne. Occiput. Nuque.	Gris bleuté.
Joues. Lorums. Menton. Sourcils. Régions auriculaires. Gorge. Poitrine. Flancs.	Passant du rose brun ou rouge brun.
Dos.	Brun marron.
Épaules.	Gris bleuté.
Ventre.	Région anale blanche.
Rémiges.	<u>Primaires</u> : Brun noir. <u>Secondaires</u> : Brun noir avec un liseré jaunâtre à la partie inférieure des rémiges. Sus-alaires et barre alaire blanches avec petit miroir blanc.
Croupion.	Vert olive teinté de jaune.
Queue.	<u>Rectrices</u> : Brun noirâtre étroitement liserées de vert le long du vexille externe. <u>Rectrices externes</u> : Avec grande tache blanche à leur partie inférieure.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Bleu acier en été, brun gris avec l'extrémité plus foncée en hiver.
Pattes. Doigts.	Brun clair.
Ongles.	Noirâtres.

17.1.2 Pinson des arbres Femelle (*Fringilla coelebs*)

Phénotype ancestral



FIGURE 148 – Pinson des arbres Femelle. Photo KBOF.

Défauts :

- 1) Dessin des joues irrégulier,
- 2) Barres alaires irrégulières ou incomplètes,
- 3) Miroir pas visible ou pas symétrique,
- 4) Flancs trop clair,
- 5) Couleur de la poitrine irrégulière.

Taille du corps : 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Front.	Noir.
Tête. Dos. Poitrine.	Gris brun.
Gorge.	Gris brun sans taches plus claires.
Épaules.	Brun beige.
Flancs.	Gris brun sans être délavés.
Ventre.	Région anale blanc sale.
Rémiges.	Comme le mâle mais plus brunes. La barre alaire est aussi moins blanche.
Croupion.	Vert lavé de jaunâtre.
Queue.	Comme le mâle mais plus brune.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Gris brun.
Pattes. Doigts.	Brun clair.
Ongles.	Noirâtres.

17.1.3 Pinson des arbres Mâle Brun (*Fringilla coelebs*)

Mutation Brune



FIGURE 149 – Pinson des arbres Mâle Brun.
Photo Alois Van Migeroot. Photo KBOF.

113

Taille du corps : 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Front.	Noir.
Tête.	Brune avec la bande frontale plus foncée.
Gorge. Poitrine.	Brune avec un voile lie de vin.
Dos.	Brun.
Flancs.	Bruns avec un voile lie de vin.
Ventre.	Brun clair.
Rémiges.	<u>Primaires</u> : Brunes avec un miroir blanc. <u>Secondaires</u> : Brunes.
Couvertures.	<u>Grandes couvertures</u> : Brunes avec une barre alaire crème. <u>Couvertures moyennes</u> : Brunes avec barre scapulaire blanche. <u>Petites couvertures</u> : Brunes.
Croupion.	Brun.
Queue.	Brune avec dessin blanc sous la queue.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Brun clair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

17.1.4 Pinson des arbres Femelle Brun (*Fringilla coelebs*)

Mutation Brune



FIGURE 150 – Pinson des arbres Femelle Brune.
Photo Alois Van Migeroot. Photo KBOF.

Taille du corps : 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête. Dos. Poitrine.	Brun chaud.
Gorge.	Brun chaud.
Flancs.	Brun chaud.
Ventre.	Région anale blanc crème.
Rémiges.	Rémiges primaires : Brun chaud avec un miroir blanc. Rémiges secondaires : Brun chaud.
Couvertures.	Grandes couvertures : Brun chaud avec un miroir blanc. Couvertures moyennes : Brun chaud avec barre scapulaire blanche. Petites couvertures : Brun chaud.
Croupion.	Brun chaud.
Queue.	Brun chaud avec dessin blanc sous la queue.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Brun clair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

17.1.5 Pinson des arbres Mâle Agate (*Fringilla coelebs*)

Mutation Agate



FIGURE 151 – Pinson des arbres Mâle Agate.



FIGURE 152 – Pinson des arbres Mâle Agate.
Photo Alois Van Migeroot. Photo KBOF.

Taille du corps : 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Front.	Noir.
Couronne. Occiput. Nuque.	Gris bleuté.
Joues. Lorums. Menton. Sourcils. Région auriculaires. Gorge. Poitrine. Flancs.	Rose brun.
Dos.	Gris brunâtre.
Ventre.	Région anale blanche.
Ailes.	Rémiges primaires : Noires. Rémiges secondaires : Noires avec un liseré jaunâtre à leur partie inférieure. Sus-alaires : (épaules) Blanches. Barre alaire blanche et petit miroir blanc.
Croupion.	Vert olive teinté de jaune.
Queue.	Rectrices noires étroitement liserées de vert le long du vexille externe. Les rectrices externes portent une grande tache blanche à leur partie inférieure.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Bleu acier en été, gris avec l'extrémité plus foncée en hiver.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Foncés.

17.1.6 Pinson des arbres Femelle Agate (*Fringilla coelebs*)
Mutation Agate



FIGURE 153 – Pinson des arbres Femelle Agate.



FIGURE 154 – Pinson des arbres Femelle Agate.
Photo Alois Van Migeroot. Photo KBOF.

Taille du corps : 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête. Dos.	Gris brun clair, avec deux raies gris foncé sur le vertex et descendant dans la nuque.
Gorge. Poitrine.	Gris clair.
Dos. Épaules.	Gris brun clair.
Flancs.	Gris brun clair.
Ventre.	Région anale gris blanc sale.
Ailes.	<u>Rémiges primaires</u> : Noires. <u>Rémiges secondaires</u> : Noires avec un liseré jaunâtre à leur partie inférieure. <u>Sus-alaires</u> : (épaules) Blanches. Barre alaire moins blanche que chez le mâle et petit miroir blanc.
Croupion.	Vert lavé de jaunâtre.
Queue.	Rectrices noires étroitement liserées de vert le long du vexille externe. Les rectrices externes portent une grande tache blanche à leur partie inférieure.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Brun clair légèrement flammé de gris.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Foncés.

17.1.7 Pinson des arbres Mâle Opale (*Fringilla coelebs*)

Mutation Opale



FIGURE 155 – Pinson des arbres Mâle Opale.
Photo Alois Van Mingeroot. Photo KBOF.

117

117. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Front.	Noir.
Couronne. Occiput. Nuque.	Gris foncé bleuté.
Joues. Lorums. Menton. Sourcils. Région auriculaires.	Couleur jaunâtre, voilée de chamois.
Épaules.	Gris foncé bleuté.
Gorge. Poitrine. Flancs.	Couleur lie de vin très clair avec un voile gris clair bleuté.
Dos. Croupion.	Jaune verdâtre. Dos avec des reflets bleutés.
Ventre.	Région anale sale blanc.
Ailes.	<u>Rémiges primaires</u> : Gris bleu. <u>Rémiges secondaires</u> : Gris bleu avec un liseré jaunâtre à leur partie inférieure. Sus-alaires (épaules) blanches. Barre alaire jaune verdâtre et petit miroir blanc.
Queue.	Rectrices gris bleuté étroitement liserées de jaune verdâtre le long du vexille externe. Les rectrices externes portent une grande tache blanche à leur partie inférieure.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Gris foncé bleuté en été, gris foncé en hiver.
Pattes. Doigts.	Couleur chair foncé.
Ongles.	Foncés.

17.1.8 Pinson des arbres Femelle Opale (*Fringilla coelebs*)

Mutation Opale



FIGURE 156 – Pinson des arbres Femelle Opale.
Photo Alois Van Mingeroot. Photo KBOF.

118

Taille du corps : 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Gris clair bleuté avec deux raies plus foncées sur le vertex et descendant dans la nuque.
Dos.	Jaune verdâtre avec un voile bleuté.
Épaules.	Gris clair bleuté.
Gorge. Poitrine. Flancs.	Gris clair lavé de jaunâtre.
Ventre.	Région anale gris blanc sale.
Ailes.	Comme la mâle mais d'un gris bleuté plus clair.
Croupion.	Jaune verdâtre.
Queue.	Comme la mâle mais d'un gris bleuté plus clair.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Couleur chair foncé légèrement flammé de gris.
Pattes. Doigts.	Couleur chair foncé.
Ongles.	Foncés.

17.1.9 Pinson des arbres Mâle et Femelle Brun-Opale (*Fringilla coelebs*)

Mutation Brun-Opale



FIGURE 157 – Pinson des arbres Mâle Brun-Opale. Photo Alois Van Mingeroet. Photo KBOF.



FIGURE 158 – Pinson des arbres Femelle Brun-Opale. Photo Alois Van Mingeroet. Photo KBOF.

Taille du corps : 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête. Dos. Épaules.	Le plumage est presque totalement dépourvu de pigmentation en eumélanine.
Gorge. Poitrine. Flancs.	Il subsiste un léger voile de phaéomélanine sur le dos, les rémiges et les rectrices.
Ventre. Ailes. Croupion.	Le dos et le poitrail et le croupion sont jaune crème chez le mâle, beige très clair chez la femelle.
Queue. Yeux.	Brun.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

17.1.10 Pinson du Nord (*Fringilla montifringilla*)

Phénotype ancestral



FIGURE 159 – Pinson du Nord Mâle en plumage Hivernal. Photo H. Heinzel.



FIGURE 160 – Pinson du Nord Femelle en plumage Hivernal. Photo H. Heinzel.



FIGURE 161 – Pinson du Nord Mâle en plumage Nuptial. Photo H. Heinzel.

17.1.11 Pinson du Nord Mâle (*Fringilla montifringilla*)

Phénotype ancestral



FIGURE 162 – Pinson du Nord Mâle en plumage Nuptial. Photo P. Rocher.

Défauts :

- 1) Cercle oculaire irrégulier,
- 2) Taches claires entre le bec et les yeux (lorum),
- 3) Couleur de la poitrine délavée,
- 4) Pattes bicolores,
- 5) Taches blanches ou noires sur le menton,
- 6) Spots trop groupés sur les flancs,
- 7) Ligne de séparation de la poitrine irrégulière,
- 8) Miroirs des ailes absents ou trop peu visibles,
- 9) Stries brunâtre de la tête de la femelle irrégulières.

Taille du corps : 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Jaunâtre avec pointe noire.
Yeux.	Brun foncé.
Tête. Front. Vertex. Nuque. Joues. Région auriculaire.	De couleur noirâtre, liserée de brun-gris. Cette couleur est uniformément répartie. En été, la tête est complètement noire.
Dos.	Noir écaillé de gris-brun (noir en été).
Croupion.	Blanc.
Gorge.	Brun noisette.
Poitrine.	De couleur brun noisette, sans voile, et uniformément répartie sur l'ensemble de la poitrine. La ligne qui sépare le brun de la poitrine et le blanc du ventre doit être régulière et légèrement arrondie.
Flancs.	La couleur des flancs est d'un brun clair avec de préférence deux rangées de spots noirs, le plus uniformément répartis. La première rangée sera souvent cachée par l'aile. Les spots des mâles sont plus larges et ont tendance à se grouper plus fort que chez la femelle.
Ventre.	Blanc pur.
Ailes.	Les scapulaires sont d'un brun noisette et sont bordées d'un étroit liseré clair. La barre alaire a la même couleur que la poitrine (brun noisette). Un petit miroir blanc est obligatoire. Les rémiges primaires sont d'un noir brunâtre foncé. Les rémiges secondaires sont noir brunâtre avec le vexille externe brun clair.
Queue.	Les rectrices sont noires. Les deux rectrices externes ont une grande tache blanche longitudinale sur le côté inférieur. Les sus-caudales médianes sont noirâtres avec un liseré brun à l'extrémité. L'extrémité de la queue est fourchue.
Pattes. Doigts.	Chair foncé.
Ongles.	Noirs.



FIGURE 163 – Pinson du Nord Mâle en plumage Hivernal. Photo P. Rocher.

17.1.12 Pinson du Nord Femelle (*Fringilla montifringilla*)

Phénotype ancestral



FIGURE 164 – Pinson du Nord Femelle en plumage Nuptial. Photo E. Gomez.

120

120. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Comme chez le mâle, mais les teintes sont brun gris dans l'ensemble. Les deux raies brunâtres partent du haut de la tête et descendent vers la nuque.
Dos.	Dessin écaillé typique de couleur gris brun.
Ailes.	Comme le mâle, mais d'une couleur plus terne.
Flancs.	Les spots doivent être bien répartis et réguliers sur deux rangées et sur un fond brun clair.
Poitrine. Ventre.	La couleur ne peut pas être délavée, mais d'un brun noisette, qui sera Blanc grisâtre.
Queue.	Brun foncé et fourchue.
Dos.	Dessin écaillé typique de couleur gris brun.
Pattes. Doigts.	Chair foncé.
Ongles.	Noirs.

17.2 Venturons

Venturons

17.2.1 Venturon montagnard (*Carduelis cintrina*)

Phénotype ancestral



FIGURE 165 – Venturon montagnard Mâle et Femelle. Photo H. Heinzel.

Défauts :

- 1) Manque de luminosité dans la couleur,
- 2) Dessins flous et mal délimités,
- 3) Barres alaires irrégulières,
- 4) Manque d'élégance dans la forme.

17.2.2 Venturon montagnard Mâle (*Carduelis cintrina*)

Phénotype ancestral



FIGURE 166 – Venturon montagnard Mâle.

121

Taille du corps : 12 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Pointu, fin, gris-noirâtre.
Yeux.	Brun-noir.
Tête.	Fine, dessus et côtés de la tête, nuque et côtés du cou gris-bleuté uni. Masque circulaire : jaune-vert lumineux couvrant le front, la région oculaire, le bas des joues et le menton.
Dos.	Vert-olive, marqué de stries gris-brun légères et assez floues.
Gorge. Poitrine.	Jaune-vert, lumineux comme le masque.
Flancs.	Verts, lavés de gris.
Ventre.	Zone anale et sous-caudales : jaunes.
Ailes.	Rémiges : Noir-verdâtre avec liseré externe gris-vert. Couvertures : Noirâtres avec large liseré verdâtre, dessinant une double barre alaire.
Croupion.	Jaune-vert uni.
Queue.	Rectrices : Noir-verdâtre, liserées de gris-vert.
Pattes. Doigts.	Gris-brun.
Ongles.	Brun-noir.
Forme Générale.	Fine et élégante.

17.2.3 Venturon montagnard Femelle (*Carduelis cintrina*)

Phénotype ancestral



FIGURE 167 – Venturon montagnard Femelle. Photo E. Gomez.

Taille du corps : 12 cm.

La femelle a la même livrée que le mâle avec des teintes un peu plus ternes, un masque moins étendu et des stries un peu plus marquées. Le gris-bleuté n'est pas interrompu à la gorge.

122

122. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

17.2.4 Venturon Corse Mâle (*Carduelis corsicana*)

Phénotype ancestral



FIGURE 168 – Venturon Corse Mâle. Photo R. Rojas.

Taille du corps : 12 cm.

Chez l'espèce *Carduelis corsicana* :

- 1) le manteau est brun-chaud et la poitrine vert-jaune plus vif.
- 2) La femelle est plus terne.

123

17.2.5 Serin des canaris Mâle (*Serinus canaria*)

Phénotype ancestral



FIGURE 169 – Serin des canaris Mâle. Photo : P. Rocher.

Taille du corps : 12-13,5 cm. Masse : 15-20 g.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Couleur corne grisâtre, mandibule supérieure souvent plus foncée.
Yeux.	Iris brun foncé ou noirâtre, cercle oculaire brun souligné de jaune sous l'oeil.
Couronne. Nuque.	Jaune verdâtre ou gris verdâtre finement strié de noirâtre.
Front.	Jaune prolongé par-dessus l'oeil et vers la nuque par un large « sourcil » jaune doré qui se poursuit en entourant toute la joue sur les côtés du cou.
Lores. Joues.	Les lores sont gris clair. Dans leur prolongement, derrière l'oeil part une petite ligne brune. Sous l'oeil, il y a 2 petites bandes courbes : la première est jaune et l'autre brun clair. La « moustache » olive foncé qui descend vers le cou est encadrée de 2 bandes jaunes. Le centre de la joue est gris clair mêlé de jaune olive.
Manteau. Dos. Scapulaires.	Gris cendré avec centre des plumes noirâtre et bords jaune verdâtre.
Couvertures alaires.	<u>Petites couvertures</u> : Jaune olive. <u>Moyennes et grandes couvertures</u> : Noires bordées de jaune verdâtre et terminées de jaune pour les premières et de chamois pâle pour les secondes (ce qui forme 2 barres alaires). Tectrices primaires noires.
Rémiges.	Brun-noir finement bordées de jaune pâle. Les tertiaires ont des extrémités internes plus larges blanchâtres ou chamois clair.
Croupion. Sus-caudales.	Le croupion est jaune verdâtre et les sus-caudales brun sombre avec extrémités grises.
Queue.	Les rectrices sont brun sombre largement bordées de vert pâle.
Menton. Gorge. Poitrine. Flancs. Haut du ventre.	Jaune doré terne délavé de vert olive avec un peu de gris verdâtre sur les côtés de la poitrine et les flancs (striés de vert foncé ou de noir).
Bas du ventre. Cuisses. Sous-caudales.	Blanchâtres.
Pattes. Doigts.	Brun-noir violacé.
Ongles.	Noirs.



FIGURE 170 – Serin des canaris Mâle. Photo : P. Rocher.

17.2.6 Serin des canaris Femelle (*Serinus canaria*)

Phénotype ancestral



FIGURE 171 – Serin des canaris Femelle. Photo : S. Chartier. Élevage M. Brau.

125

125. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 12-13,5 cm. Masse : 15-20 g.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Couleur corne grisâtre, mandibule supérieure souvent plus foncée.
Yeux.	Iris brun foncé, cercle oculaire gris clair plus blanc sous l'oeil.
Front. Couronne. Nuque.	Gris fortement strié de noir.
Lores. Sourcils. Tour de l'oeil.	Les lores sont gris clair. Partant de la base de la mandibule supérieure part un sourcil jaune mêlé de gris qui s'arrête peu après le dessus de l'oeil. Ce dernier est entouré de jaune blanchâtre.
Joues.	Grises avec quelques traces de jaune et une « moustache » brun verdâtre à peine marquée.
Manteau. Dos. Scapulaires.	Gris clair ou cendré avec centre des plumes noirâtre et bords beige brunâtre.
Couvertures.	<u>Petites couvertures</u> : Grises. <u>Moyennes et Grandes couvertures</u> : Noires bordées de jaune verdâtre et terminées de jaune pâle pour les premières et de chamois pâle pour les secondes (ce qui forme 2 barres alaires). <u>Tectrices primaires</u> : Noires.
Rémiges.	Brun-noir finement bordées de jaune pâle. Les tertiaires ont des extrémités internes plus larges blanchâtres ou chamois clair.
Queue.	Les rectrices sont brun sombre largement bordées de vert pâle.
Poitrine.	Gris clair mêlé de jaune clair et de quelques stries sur les côtés.
Région anale. Cuisses. Sous-caudales.	Blanches ou blanchâtres.
Pattes. Doigts.	Brun-noir violacé.
Ongles.	Noirs.



FIGURE 172 – Serin des canaris Femelle. Photo : JM. Fenerole.

17.3 Serins

Serins

17.3.1 Serin cini (*Serinus serinus*)



FIGURE 173 – Serin cini Mâle et Femelle. Photo : H. Heinzl.

Défauts :

- 1) Couleur terne et délavée chez le mâle,
- 2) Stries des flancs irrégulières,
- 3) Dessin de la tête irrégulier,
- 4) Barres alaires irrégulières.

126

126. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

17.3.2 Serin cini Mâle (*Serinus serinus*)

Phénotype ancestral



FIGURE 174 – Serin cini Mâle. Photo E. Gomez.

Taille du corps : 11 cm

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Petit, court, conique et gris foncé.
Yeux.	Brun foncé,
Tête.	Jaune vif partant de la base du bec jusqu'aux yeux passant par du gris vert, strié de brun gris sur la nuque et les joues. Certains vieux mâles ont une tache jaune sur les joues.
Cou.	Demi-collier jaunâtre.
Dos.	Gris brunâtre strié de noir.
Épaules.	Gris brunâtre.
Poitrine.	Jaune vif.
Gorge.	Jaune vif.
Flancs. Ventre.	Passant du jaune clair dans la région des épaules au gris clair près du gris clair.
Ailes.	Brun noir avec un liseré jaune verdâtre au bord extérieur des rémiges.
Croupion.	Jaune vif.
Queue.	Brun noir.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Brun foncé.

17.3.3 Serin cini Femelle (*Serinus serinus*)

Phénotype ancestral



FIGURE 175 – Serin cini Femelle. Photo A. Cazadilla.

Taille du corps : 11 cm

La femelle a les mêmes caractéristiques que le mâle, mais la couleur jaune vif du mâle est plus atténuée chez la femelle. La femelle est plus striée que le mâle, sur la gorge, la poitrine et les flancs. Les stries sont plus larges et plus distinctes.

128

128. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

17.4 Sizerins

Sizerins

17.4.1 Sizerin flammé (*Acanthis flammea flammea*)



FIGURE 176 – Sizerin cabaret 1^{ère} année et Adulte. Photo : H. Heinzl.

Défauts concernant les sizerins cabaret et flammé en mâles et femelles :

- 1) Trop culotté (peut être légèrement culotté),
- 2) Traits sourciliers irréguliers,
- 3) Tache de menton (bavette) trop grande ou dentelée,
- 4) Stries des flancs irrégulières,
- 5) Couleur de bec rougeâtre (cette couleur est anormale),
- 6) Bande alaire irrégulière ou incomplète.

17.4.2 Sizerin cabaret (*Acanthis flammea cabaret*)

Phénotype ancestral



FIGURE 177 – Sizerin cabaret.

Remarques : Sexes identiques.

129

129. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 11,5 cm

Zone du plumage	Couleur
Front.	Brunâtre. La moitié du vertex est rouge carmin ou jaune brun selon les spécimens.
Joues. Région auriculaire.	Brun foncé. Dessin en forme de demi-lune.
Traits sourciliers.	Couleur légèrement brunâtre. Étroits et réguliers. Du dessus des yeux à la nuque.
Cou. Dos. Épaules.	Bruns avec des stries étroites et régulières brun foncé.
Gorge.	Brun chaud. Petite bavette brun foncé.
Poitrine.	Haut et côtés rose carmin, parfois brun chaud.
Flancs. Ventre.	Blanc sale. Flancs régulièrement striés de fines raies brun foncé qui partent à la hauteur des épaules et qui descendent tout le long des flancs.
Ailes. Queue.	Grandes rémiges et rectrices brun très foncé, liserées de brun très pâle aux extrémités. Deux barres alaires beige léger.
Croupion.	Lavé de rose carmin ou brun chaud, strié de brun foncé.
Bec.	Fin et pointu. Mandibule supérieure brunâtre et inférieure jaunâtre.
Yeux.	Brun foncé.
Pattes. Doigts.	Brun foncé.
Ongles.	Noirs.

17.4.3 Sizerin flammé (*Acanthis flammea flammea*)

Phénotype ancestral



FIGURE 178 – Sizerin flammé 1 ière année. Photo H. Heinzel.

Remarques : Sexes identiques.



FIGURE 179 – Sizerin flammé. Photo UOF Pierre Malburet.

Défauts : Différence avec le sizerin cabaret :

- 1) Plus grand en taille (13 - 15 cm),
- 2) Couleur de fond plus pale, brun beige,
- 3) Stries brunes légèrement plus claires,
- 4) Barres alaires plus claires et plus visibles,
- 5) Bec rouge,
- 6) Tache plus claire dans le dos (caractéristique de l'espèce).

17.4.4 Sizerin flammé Brun (*Acanthis flammea flammea*)

Mutation Brune.



FIGURE 180 – Sizerin flammé Brun. Photo 1 FOI. Photo 2 UOF. S. Chartier.

Remarques : Chez le brun facteur foncé il n'y a pas de blanc sous la poitrine. Et le brun est plus chaud en couleur.

Dimorphisme sexuel : Teintes et marques identiques chez les femelles mise à part la poitrine et les flancs légèrement plus clairs. Pas de rose sur la poitrine et le croupion..

Taille du corps : 11,5 cm pour le Cabaret. Entre 13 et 15 cm pour le Flammé.

130

Zone du plumage	Couleur
Front.	Brun beige. Vertex rouge rosé.
Joues. Région auriculaire.	Brunes.
Traits sourciliers.	Beiges.
Dos.	Brun chaud avec des stries brun foncé étroites et régulières.
Gorge.	Brune avec bavette d'un brun plus foncé.
Poitrine. Flancs.	Brun clair. Stries brun chaud sur le haut de la poitrine et des épaules vers l'arrière pour les flancs. Chez le mâle adulte, la poitrine peut être brun lavé de rose.
Ventre.	Blanc sale.
Ailes. Queue.	Grandes rémiges et rectrices brunes avec liseré beige au bout des pennes. Barres alaires légèrement plus claires.
Croupion.	Brun strié de brun chaud et lavé de rose.
Bec.	Fin et pointu. Mandibule supérieure brunâtre et inférieure jaunâtre.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Yeux. Ongles.	Brun foncé.

Défauts :

- 1) Brun pas assez chaud,
- 2) Dépigmentation dans les ailes et la queue,
- 3) Rémiges trop claires,
- 4) Rectrices trop claires,
- 5) Coloration de la poitrine la première année pour les mâles.

17.4.5 Sizerin flammé Pastel (*Acanthis flammea flammea*)

Mutation Pastel. (~~ex. Agate~~)




FIGURE 181 – Sizerin flammé Pastel. Photo 1 B. Cormelieu. Photo 2 FOI.

Taille du corps : 11,5 cm pour le Cabaret. Entre 13 et 15 cm pour le Flammé.

131

131. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

17.4.6 Sizerin flammé Brun-Pastel (*Acanthis flammea flammea*)

Mutation Brun-Pastel. (ex. Isabelle)



FIGURE 182 – Sizerin flammé Brun-Pastel. Photo 1 P. Rocher.
Photo 2 Y. Cornillon.

Taille du corps : 11,5 cm pour le Cabaret. Entre 13 et 15 cm pour le Flammé.

¹³²

132. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

17.4.7 Sizerin flammé Écaillé (*Acanthis flammea flammea*)

Mutation Écaillé. (ex. Pastel)



FIGURE 183 – Sizerin flammé Écaillé. Photo R. Driesmans.

Taille du corps : 11,5 cm pour le Cabaret. Entre 13 et 15 cm pour le Flammé.
133

133. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

17.4.8 Sizerin flammé Brun-Écaillé (*Acanthis flammea flammea*)

Mutation Brun-Écaillé. (~~ex. Brun-Pastel~~)



FIGURE 184 – Sizerin flammé Brun-Écaillé. Photo BOF.

Taille du corps : 11,5 cm pour le Cabaret. Entre 13 et 15 cm pour le Flammé.

134

134. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

17.4.9 Sizerin flammé Facteur Foncé (*Acanthis flammea flammea*)
Mutation Facteur Foncé.



FIGURE 185 – Sizerin flammé Facteur Foncé. Photo P. Rocher.

Taille du corps : 11,5 cm pour le Cabaret. Entre 13 et 15 cm pour le Flammé.

135

135. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

17.4.10 Sizerin flammé Pastel Facteur Foncé (*Acanthis flammea flammea*)

Mutation Pastel Facteur Foncé. (~~ex-agate foncé~~)



FIGURE 186 – Sizerin flammé Pastel Facteur Foncé. Photo KBOF.

Taille du corps : 11,5 cm pour le Cabaret. Entre 13 et 15 cm pour le Flammé.

136

136. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

17.4.11 Sizerin flammé Brun Facteur Foncé (*Acanthis flammea flammea*)

Mutation Brun Facteur Foncé.



FIGURE 187 – Sizerin flammé Brun Facteur Foncé. Photo 1 R. Driesmans.

Taille du corps : 11,5 cm pour le Cabaret. Entre 13 et 15 cm pour le Flammé.

137

137. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

17.4.12 Sizerin flammé Phéo (*Acanthis flammea flammea*)

Mutation Phéo.



FIGURE 188 – Sizerin flammé Phéo. Photo 1 R. Driesmans. Photo 2 P. Rocher.

Taille du corps : 11,5 cm pour le Cabaret. Entre 13 et 15 cm pour le Flammé.

138

138. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

17.4.13 Sizerin blanchâtre (*Acanthis hornemanni*)

Phénotype ancestral.



FIGURE 189 – Sizerin blanchâtre. Photo H. Heinzel.



FIGURE 190 – Sizerin blanchâtre. Photo P. Rocher.

Taille du corps : 14 cm.

Défauts :

- 1) Trop culotté (peut être légèrement culotté),
- 2) Traits sourciliers irréguliers,
- 3) Bavette irrégulière,
- 4) Stries des flancs irrégulières,
- 5) Couleur du bec rougeâtre,
- 6) Bande alaire irrégulière ou incomplète,
- 7) Excès de coloration rouge.

139

139. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Conique, fin et pointu de couleur de corne jaunâtre. La mandibule supérieure est plus foncée que l'inférieure.
Yeux.	Noirs.
Tête.	1) Ronde, bien enchâssée dans les épaules. 2) Fine bande frontale et lorums brun-noirâtre. 3) Tache rose carmin en forme de casque partant du front et couvrant la moitié du crâne. 4) Ligne oculaire gris-brun surmontée d'un fin sourcil gris-beige. 5) Arrière du crâne et nuque : Gris-beige, striés de noirâtre. 6) Dessin des joues légèrement marqué.
Dos.	Beige-grisâtre marqué régulièrement de stries brun noir, avec une zone plus claire au centre.
Gorge.	Petite bavette noir-brun au menton. Gorge blanchâtre, un très léger reflet rose peut parfois apparaître,
Poitrine.	Blanchâtre comme la gorge, peut être aussi légèrement rose.
Flancs.	Beige-grisâtre très clair, striés de brun-noir.
Ventre.	Blanc.
Ailes.	Grandes rémiges : Noirâtres, finement liserées de brun clair. <u>Rémiges secondaires</u> : Noirâtres, portant un liseré gris-beige plus large. <u>Couvertures</u> : Noirâtres, bordées de blanc sale formant une double barre alaire.
Croupion.	Blanchâtre, légèrement strié ou lavé de rose accepté.
Queue.	<u>Rectrices</u> : Noirâtres, portant un liseré gris-beige.
Pattes. Doigts.	Brun-noir.
Ongles.	Noir.
Forme Générale.	Assez ronde, trapue et élégante.



FIGURE 191 – Sizerin blanchâtre.

17.5 Linottes

Linottes

17.5.1 Linotte mélodieuse (*Linaria cannabina*)



FIGURE 192 – Linotte mélodieuse en Mâle et Femelle. Plumage Nuptial.
Photo : H. Heinzl.

Défauts :

- 1) Dessin de tête, de la gorge et des joues irréguliers,
- 2) Stries des flancs irrégulières,
- 3) Le vexille blanc des rémiges et des rectrices non visibles
- 4) Dessin de la poitrine irrégulier chez la femelle.

17.5.2 Linotte mélodieuse Mâle (*Linaria cannabina*)

Phénotype ancestral.



FIGURE 193 – Linotte mélodieuse. Photo E. Gomez.

Taille du corps : 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Gris-brun clair en hiver avec la mandibule inférieure plus claire.
Yeux.	Brun foncé.
Tête.	<u>Front et couronne</u> : Brun cannelle avec sourcils crème et une tache crème sur chaque joue.
Dos.	Brun marron.
Épaules.	Brun marron.
Poitrine.	De couleur beige striée de brun noir.
Gorge. Menton.	Blanchâtre avec stries brun foncé.
Flancs.	Brun clair avec des fines stries brun foncé.
Ventre.	Blanchâtre.
Ailes.	<u>Grandes rémiges primaires</u> : Noires avec un liseré externe blanc. <u>Rémiges secondaires</u> : Brun marron.
Croupion.	Cannelle clair, légèrement strié de raies interrompues.
Queue.	Rectrices noires avec un liseré blanc le long du vexille externe.
Pattes. Doigts.	Brunâtre.
Ongles.	Noirs.
Bec.	Gris-brun clair en hiver avec la mandibule inférieure plus claire.



FIGURE 194 – Linotte mélodieuse Mâle. Photo Internet.

17.5.3 Linotte mélodieuse Femelle (*Linaria cannabina*)

Phénotype ancestral.



FIGURE 195 – Linotte mélodieuse Femelle. Photo E. Gomez.

Mêmes caractéristiques que le mâle mais la poitrine, la tête et les flancs sont plus striés que chez le mâle et non coloré.

141

17.5.4 Linotte à bec jaune (*Linaria flavirostris*)

Phénotype ancestral.



FIGURE 196 – Linotte à bec jaune. Photo H. Heinzel.

Défauts :

- 1) Liseré blanc des rémiges pas visible,
- 2) Dessin irrégulier des flancs et de la poitrine,
- 3) Tête plate,
- 4) Pattes trop claires.

17.5.5 Linotte à bec jaune (*Linaria flavirostris*)

Phénotype ancestral.



FIGURE 197 – Linotte à bec jaune. Photo FOI.

La femelle ressemble au mâle mais est de couleur plus pâle. Le croupion n'est jamais carmin mais brun gris léger avec des stries noires et étroites.

142

142. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Petit, jaune avec pointe noirâtre.
Yeux.	Brun foncé.
Tête.	Petite et ronde. Front, couronne, joues et nuque : Brun ocre, striés de noir. <u>Lorums</u> : De couleur rouille.
Dos.	Brun ocre, strié de brun noirâtre.
Épaules.	Jaune ocre.
Poitrine.	Brun ocre avec des stries brun foncé, partant du milieu de la poitrine vers les flancs.
Gorge.	Brun ocre, légèrement strié.
Flancs.	Brun ocre avec des stries brun foncé et bien régulières.
Ventre.	Blanc sale.
Ailes.	Brun noirâtre avec un étroit liseré blanc le long du vexille externe des rémiges
Croupion.	Rose carmin dans la nature mais ocre roux n'est pas fautif.
Queue.	Brun noirâtre avec liseré blanchâtre le long du vexille externe, l'extrémité de la queue fourchue.
Pattes. Doigts.	Brun noirâtre.
Ongles.	Noirs.
Bec.	Gris-brun clair en hiver avec la mandibule inférieure plus claire.

17.6 Tarin des aulnes

Tarins

17.6.1 Tarin des aulnes (*Spinus spinus*)



FIGURE 198 – Tarin des aulnes en Mâle et Femelle. Photo : H. Heinzl.

Défauts :

- 1) Lunettes : les 2 petites tâches jaune (mâle) ou grise (femelle) sur le front,
- 2) Traits sourciliers qui dépassent l'oeil en direction du front,
- 3) Traits sourciliers trop larges,
- 4) Bavette grande ou irrégulière,
- 5) Barres alaires irrégulière,
- 6) Absence du petit miroir,
- 7) Stries des flancs irrégulières,
- 8) Couleur de fond trop jaune pour les femelles,
- 9) Poitrine du mâle jaune intense au lieu de verdâtre.

17.6.2 Tarin des aulnes Mâle (*Spinus spinus*)

Phénotype ancestral.



FIGURE 199 – Tarin des aulnes Mâle. Photo P. Rocher.

143

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Front. Vertex. Occiput. Calotte.	Noirs avec la calotte légèrement pointillé de gris.
Joues. Région auriculaire.	Jaune grisâtre légèrement voilé.
Traits sourciliers.	Jaunâtres partant de derrière l'oeil et s'élargissant vers le cou.
Cou. Nuque. Scapulaires. Dos.	Verdâtres avec de fines stries foncées.
Poitrine. Gorge.	Vert jaunâtre. Certains mâles ont une petite bavette (nullement obligatoire) noire sur le haut de la gorge, elle doit être petite et régulière.
Flancs.	Gris verdâtre avec des stries noirâtres qui doivent être bien régulières de chaque côté du corps.
Ventre. Région anale.	Légèrement grisâtre.
Ailes.	Grandes Rémiges : Noir brunâtre avec le vexille externe jaune. Rémiges Secondaires : Liserées de grisâtre à leur extrémité. Barre alaire jaune et petit miroir jaune.
Croupion.	Jaune verdâtre.
Queue.	Deux premiers tiers jaunes et extrémité noire. Rectrices médianes noires.
Bec.	Fin, pointu, de couleur corne claire, flammé de noir.
Yeux.	Brun foncé.
Pattes. Doigts.	Chair foncé.
Ongles.	Noirs.

17.6.3 Tarin des aulnes Femelle (*Spinus spinus*)

Phénotype ancestral.



FIGURE 200 – Tarin des aulnes Femelle.

Les femelles doivent avoir une couleur de fond la plus grise possible.

144

144. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Front. Vertex. Occiput.	Grisâtres avec de fines stries entrecoupées.
Joues. Région auriculaire.	Brunâtres voilés jaune.
Traits sourciliers.	Beaucoup moins jaunes que chez le mâle mais plutôt de couleur brun grisâtre.
Cou. Dos. Épaules.	Grisâtres finement striés de brun noirâtre.
Poitrine. Gorge. Flancs.	Grisâtres dans l'ensemble. Les côtés de la poitrine et surtout les flancs ont un beau dessin strié, bien régulier, net, de couleur gris foncé.
Ventre. Région anale.	Grisâtres.
Ailes.	Gris foncé avec les mêmes marques que le mâle.
Croupion.	Jaune verdâtre, légèrement strié de gris foncé.
Queue.	Deux premiers tiers jaune, le reste est noir-gris. Rectrices médianes noir-gris.
Sous-Caudales.	Présence d'un dessin écaillé.
Bec.	Fin, pointu, de couleur corne claire, flammé de noir.
Yeux.	Brun foncé.
Pattes. Doigts.	Chair foncé.
Ongles.	Noirs.

17.6.4 Tarin des aulnes Mâle Brun (*Spinus spinus*)

Mutation Brune.



FIGURE 201 – Tarin des aulnes Mâle Brun. Photo P. Rocher.

145

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Front. Vertex.	Brun très foncé. La calotte est nuancée et pointillée de beige.
Occiput.	
Joues.	Jaune verdâtre lavées de brun.
Traits sourciliers.	Jaunes.
Gorge.	Bavette brun foncé si elle est présente.
Poitrine.	Verdâtre lavée de beige.
Croupion.	Jaune verdâtre.
Queue.	Deux premiers tiers jaunes et extrémité brun très foncé. Rectrices médianes brunes, très foncées.
Ailes.	Grandes rémiges brun foncé avec un léger liseré jaune le long du vexille externe. Épaules jaune verdâtre lorsqu'elles sont visibles.
Flancs.	Couleur de fond blanc jaunâtre avec stries brun foncé.
Dos.	Manteau couleur verdâtre strié de brun avec un voile brun clair sur le dos.
Bec.	Couleur corne à la base avec l'extrémité de la mandibule supérieure brun noir.
Yeux.	Brun foncé.
Pattes. Doigts.	Bruns.
Ongles.	Foncés.



FIGURE 202 – Tarin des aulnes Mâle Brun.

17.6.5 Tarin des aulnes Femelle Brune (*Spinus spinus*)

Mutation Brune.



FIGURE 203 – Tarin des aulnes Femelle Brune.

Défauts :

- 1) Manteau trop verdâtre,
- 2) Poitrine trop lipochrome,
- 3) Joues grisâtres pas assez brunes,
- 4) Ongles clairs,
- 5) Queue : Deux derniers tiers trop clairs, idem pour les rectrices médianes (normalement brun foncé).

146

146. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Front. Vertex. Occiput.	Brun verdâtre striés de brun foncé.
Joues.	Grisâtres lavées de brun.
Traits sourciliers.	Jaunâtres.
Croupion.	Jaune verdâtre légèrement strié de brun.
Queue.	Premier tiers jaune et deux derniers tiers brun foncé. Rec- trices médianes brunes, très foncées.
Ailes.	Grandes rémiges : Brun foncé avec un léger liseré jaune le long du vexille externe. Rémiges secondaires : Au liseré jaunâtre avec barre alaire chamois et miroir jaune pâle.
Épaules.	Jaune verdâtre lorsqu'elles sont visibles.
Poitrine.	Blanc sale striée de brun.
Flancs.	Couleur de fond beige avec stries brun foncé.
Dos.	Manteau verdâtre lavé de brun assez foncé strié de brun foncé.
Bec.	Couleur corne à la base avec l'extrémité de la mandibule supérieure brun noir.
Yeux.	Brun foncé.
Pattes. Doigts.	Bruns.
Ongles.	Foncés.

17.6.6 Tarin des aulnes Mâle Agate (*Spinus spinus*)
Mutation Agate.



FIGURE 204 – Tarin des aulnes Mâle Agate. Photo Guy Doumergue

147

147. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Front. Vertex. Occiput.	
Joues.	
Traits sourciliers.	
Gorge.	
Poitrine.	
Croupion.	
Queue.	
Ailes.	
Flancs.	
Dos.	
Bec.	
Yeux.	
Pattes. Doigts.	
Ongles.	

17.6.7 Tarin des aulnes Femelle Agate (*Spinus spinus*)

Mutation Agate.



FIGURE 205 – Tarin des aulnes Femelle Agate. Élevage Paolo Gregorutti.

148

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Front. Vertex. Occiput.	
Joues.	
Traits sourciliers.	
Gorge.	
Poitrine.	
Croupion.	
Queue.	
Ailes.	
Flancs.	
Dos.	
Bec.	
Yeux.	
Pattes. Doigts.	
Ongles.	

17.6.8 Tarin des aulnes Mâle Brun Dilué (*Spinus spinus*)

Mutation Brune Diluée.



FIGURE 206 – Tarin des aulnes Mâle Brun Dilué. Photo JP. Hennbique.

149

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Front. Vertex. Occiput.	Bruns, lavés de vert. Vertex écaillé de beige.
Trait oculaire.	Jaune.
Joues.	Jaunâtres, lavées de brun.
Dos.	Vert brunâtre strié de brun foncé.
Gorge. Poitrine.	Jaune clair avec un léger voile beige. Bavette brun foncé. Poitrine plus claire.
Flancs.	Jaunâtres lavés de beige à l'avant et grisâtre lavé de beige à l'arrière. Stries brunes.
Ailes.	<u>Rémiges</u> : Diluées en gris brun avec bord du vexille externe jaune brunâtre. <u>Couvertures</u> : Terminées par du jaune verdâtre, bordées de brun clair, d'où une bande alaire jaune verdâtre bordée de brun clair.
Croupion.	Jaune verdâtre strié de brun foncé.
Queue.	Deux premiers tiers jaunâtres et extrémité gris brun. Rectrices médianes gris brun, très foncées. Sous-caudales jaune verdâtre striées de brun foncé.
Bec.	Brunâtre, flammé de brun foncé à la mandibule supérieure.
Pattes. Doigts.	Chair.
Yeux.	Brun foncé.
Ongles.	Brun foncé.

17.6.9 Tarin des aulnes Femelle Brun Dilué (*Spinus spinus*)
Mutation Brune Diluée.



FIGURE 207 – Tarin des aulnes Femelle Brune Dilué. Photo P. Rocher.

150

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Front. Vertex. Occiput.	Bruns striés de brun foncé.
Trait oculaire.	Jaune clair.
Joues.	Jaunâtres lavées de brun foncé.
Poitrine. Gorge.	Gris clair légèrement striée de brun.
Flancs.	Gris clair lavé de beige. Stries brun foncé.
Croupion.	Jaune verdâtre strié de brun foncé.
Dos.	Brun verdâtre strié de brun foncé.
Ailes.	<u>Rémiges</u> : Diluées en gris brun avec bord du vexille externe jaune brunâtre. <u>Couvertures</u> : Terminées par du jaunâtre, bordées de brun clair, d'où une bande alaire jaunâtre bordée de brun clair.
Queue.	Premier tiers jaunâtre et deux derniers tiers bruns. Rectrices médianes brun gris. Sous-caudales gris beige striées de brun.
Bec.	Brunâtre flammé de brun foncé à la mandibule supérieure.
Yeux.	Brun foncé.
Pattes. Doigts.	Chair.
Ongles.	Brun foncé.

17.6.10 Tarin des aulnes Mâle Brun Double Dilué (*Spinus spinus*)
Mutation Brune Double Diluée.



FIGURE 208 – Tarin des aulnes Mâle Brun Double Dilué.

Défauts :

- 1) Manteau pas assez brun,
- 2) Poitrine trop lipochrome,
- 3) Lipochrome pas assez lumineux,
- 4) Ongles foncés,
- 5) Queue pas assez grise (doit être gris clair) et tirant sur le brun.

151

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Vertex. Occiput. Dos.	Brun beige. Manteau sans stries.
Traits sourciliers.	Jaunes.
Joues.	Brunes striées de blanc.
Gorge. Poitrine. Flancs.	Bavette pratiquement devenue invisible. Jaunâtre légèrement striée de brun beige.
Ventre.	Blanc sale.
Couvertures.	<u>Petites</u> : Brun beige. <u>Moyennes et Grandes</u> : Jaune pâle bordées de jaune foncé.
Rémiges.	<u>Secondaires</u> : Gris très clair avec vexille externe jaune et portant une bande alaire jaune intense. <u>Primaires</u> : Gris très clair avec vexille externe jaune. Pas de miroir visible.
Croupion.	Jaune strié de brun.
Queue.	Deux premiers tiers jaunes et extrémité gris très clair avec vexille externe jaune. Rectrices médianes gris très clair.
Bec.	Chair flammé à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux.	Brun foncé.
Pattes. Doigts.	Chair.
Ongles.	Corne claire.



FIGURE 209 – Tarin des aulnes Mâle Brun Double Dilué.

17.6.11 **Tarin des aulnes Femelle Brune Double Dilué** (*Spinus spinus*)

Mutation Brune Double Diluée.




FIGURE 210 – Tarin des aulnes Femelle Brun Double Dilué. Photo P. Rocher.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Vertex. Occiput. Manteau.	Brun beige avec un dessin strié léger. Manteau sans stries.
Traits sourciliers.	Jaune clair.
Joues.	Brunes, striées de blanc.
Gorge. Poitrine.	Gris très clair. Poitrine striée de brun beige.
Flancs.	Beiges, striés de brun.
Croupion.	Jaune strié de brun.
Ventre.	Blanc sale.
Queue.	Premier tiers jaunâtre et deux derniers tiers beiges avec vexille externe jaunâtre. Rectrices médianes beiges.
Couvertures.	<u>Petites</u> : Brun beige. <u>Moyennes et Grandes</u> : Jaunâtres bordée de jaune foncé.
Rémiges.	<u>Secondaires</u> : Beige avec vexille externe jaune pâle et portant une bande alaire jaune. <u>Primaires</u> : Beiges avec vexille externe jaune pâle. Pas de miroir visible.
Bec.	Chair flammé à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux.	Brun foncé.
Pattes. Doigts.	Chair.
Ongles.	Corne claire.

17.6.12 Tarin des aulnes Mâle Vert Dilué (*Spinus spinus*)
Mutation Vert Dilué.



FIGURE 211 – Tarin des aulnes Mâle Vert Dilué.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Vertex. Occiput. Dos.	Gris très foncé lavé de vert.
Traits sourciliers.	Jaune.
Joues.	Verdâtres lavées de gris.
Gorge. Poitrine.	Vert jaunâtre lavée de gris clair. Bavette gris foncé si elle existe.
Flancs.	Gris clair à l'arrière et gris clair lavé de verdâtre à l'avant. Stries gris foncé.
Ventre.	Blanc sale.
Couvertures.	Se terminent par du vert clair très lumineux qui donne une bande alaire verte avec des épaules vertes. Miroir jaune pâle.
Rémiges. Rectrices médianes.	Gris verdâtre. Rémiges avec bord du vexille externe jaunâtre.
Croupion. Sous-caudales.	Jaune verdâtre légèrement strié de gris.
Queue.	Deux premiers tiers jaunes et extrémité gris verdâtre.
Bec.	Brunâtre flammé de noir à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux.	Brun foncé.
Pattes. Doigts.	Chair foncée.
Ongles.	Foncés.

17.6.13 Tarin des aulnes Femelle Verte Dilué (*Spinus spinus*)
Mutation Vert Dilué.




FIGURE 212 – Tarin des aulnes Femelle Vert Dilué.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Vertex. Occiput. Front.	Gris striés de gris foncé.
Traits sourciliers.	Jaunâtres.
Joues.	Gris brun, légèrement striées.
Gorge.	Gris très clair légèrement striée de gris.
Poitrine.	Gris très clair striée de gris foncé.
Dos.	Gris brun, lavé de vert et strié de gris foncé.
Flancs.	Gris clair striés de gris foncé avec un voile brun léger.
Croupion.	Jaune verdâtre strié de gris.
Queue.	Premier tiers jaunâtre et deux derniers tiers gris verdâtre. Rectrices médianes entièrement gris verdâtre. Sous-caudales gris clair striées de gris.
Ailes.	Rémiges gris verdâtre avec le bord du vexille externe jaunâtre. Couvertures primaires et secondaires terminées par un bord vert lavé de chamois avec miroir jaune très pâle.
Bec.	Brunâtre.
Yeux.	Brun foncé.
Pattes. Doigts.	Chair foncé.
Ongles.	Foncés.

17.6.14 Tarin des aulnes Mâle Vert Double Dilué (*Spinus spinus*)
 Mutation Vert Double Dilué.



FIGURE 213 – Tarin des aulnes Mâle Vert Double Dilué.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Vertex. Occiput.	Gris brun clair. Vertex avec un léger dessin.
Traits sourciliers.	Jaunes.
Joues.	Gris verdâtre striées de clair.
Gorge.	Jaunâtre légèrement striée de brun. Bavette pratiquement invisible.
Poitrine. Flancs.	Jaunâtre légèrement striée de gris brunâtre.
Ventre.	Blanc sale.
Dos.	Manteau gris brun jusqu'aux épaules, sans stries.
Croupion.	Jaune strié de gris brun.
Queue.	Deux premiers tiers jaunes et extrémité gris clair avec vexille externe jaune. Rectrices médianes gris clair.
Couvertures alaires.	<u>Petites</u> : Gris brun. <u>Grandes</u> : Jaune pâle bordées de jaune intense.
Rémiges.	<u>Secondaires</u> : Gris clair avec vexille jaune et portant une bande alaire jaune intense. <u>Primaires</u> : Gris clair avec vexille externe jaune. Pas de miroir.
Bec.	Chair, flammé à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux.	Brun foncé.
Pattes. Doigts.	Chair.
Ongles.	Couleur corne.

17.6.15 **Tarin des aulnes Femelle Verte Double Diluée** (*Spinus spinus*)

Mutation Verte Double Diluée.



FIGURE 214 – Tarin des aulnes Femelle Verte Double Diluée. Photo P. Rocher.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Vertex. Occiput.	Gris brun clair avec un dessin strié très léger.
Traits sourciliers.	Jaune clair.
Joues.	Gris brun clair, striées de clair.
Gorge. Poitrine.	Gris clair. Poitrine légèrement striée de gris brun.
Dos.	Manteau gris brun jusqu'aux épaules, sans stries.
Flancs.	Brun clair, striés de gris brun.
Croupion.	Jaune, strié de gris brun.
Queue.	Premier tiers jaune et deux derniers tiers gris clair avec vexille externe jaunâtre. Rectrices médianes entièrement gris clair.
Couvertures alaires.	<u>Petites</u> : Gris brun. <u>Moyenne</u> : Gris verdâtre bordées de jaune intense. <u>Grandes</u> : Gris verdâtre bordées de jaune intense.
Rémiges.	<u>Secondaires</u> : Gris clair avec vexille jaune pâle et portant une bande alaire jaune. <u>Primaires</u> : Gris clair avec vexille externe jaune pâle. Pas de miroir.
Bec.	Chair flammé à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux.	Brun foncé.
Pattes. Doigts.	Chair.
Ongles.	Couleur corne.

17.6.16 Tarin des aulnes Mâle Pastel (*Spinus spinus*)

Mutation Pastel.



FIGURE 215 – Tarin des aulnes Mâle Pastel.

157

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Vertex. Occiput. Front.	Gris foncé. Nuance de couleur dans la calotte pointillée de gris.
Traits sourciliers.	Jaune.
Joues. Régions auriculaires.	Vertes lavées de gris.
Gorge.	Bavette gris foncé si elle est présente.
Poitrine. Flancs.	Vert jaunâtre. Flancs striés de gris très foncé.
Dos.	Manteau verdâtre voilé de gris avec des stries noires.
Croupion.	Verdâtre.
Queue.	Deux premiers tiers jaunes et extrémité gris très foncé. Rectrices médianes entièrement gris foncé.
Rémiges.	<u>Grandes</u> : Gris foncé avec bords externes liserés de jaune. <u>Secondaires</u> : Avec liseré grisâtre. Barre alaire et miroir jaune clair.
Bec.	Couleur chair flammé.
Yeux.	Noirs.
Pattes. Doigts.	Chair foncée.
Ongles.	Foncés.



FIGURE 216 – Tarin des aulnes Mâle Pastel.

17.6.17 Tarin des aulnes Femelle Pastel (*Spinus spinus*)
Mutation Pastel.



FIGURE 217 – Tarin des aulnes Femelle Pastel.

Défauts :

- 1) Manteau avec incrustations brunes,
- 2) Poitrine avec trop de lipochrome et pas assez grise,
- 3) Joues brunâtres,
- 4) Ongles clairs,
- 5) Queue délavée et pas assez noire. Pas en harmonie avec le manteau.

158

158. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Vertex. Occiput. Front.	Gris clair striés de noir.
Traits sourciliers.	Gris clair.
Joues. Régions auriculaires.	Grisâtres.
Poitrine.	Gris clair striée de noir dilué.
Dos.	Manteau grisâtre de noir dilué.
Flancs.	Gris clair avec des tries d'un gris très foncé.
Croupion.	Grisâtre légèrement strié de gris foncé.
Queue.	Premier tiers jaune et deux derniers tiers gris très foncé. Rectrices médianes entièrement gris très foncé.
Rémiges.	<u>Grandes</u> : Gris foncé avec bords externes liserés de jaune. Le liseré des rémiges secondaires est grisâtre. Barre alaire et miroir jaune clair.
Bec.	Couleur chair flammé.
Yeux.	Noirs.
Pattes. Doigts.	Chair foncée.
Ongles.	Foncés.

17.6.18 Tarin des aulnes Mâle Pastel Dilué (*Spinus spinus*)

Mutation Pastel Dilué.



FIGURE 218 – Tarin des aulnes Mâle Pastel Dilué. Photo JM. Eytorff.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Calotte.	Gris foncé.
Traits sourciliers. Croupion.	Jaunes.
Joues.	Jaune verdâtre bien dessinées de gris foncé. Légère décoloration autour du bec.
Gorge.	Bavette gris foncé si elle est présente.
Poitrine.	Jaune verdâtre voilé de gris.
Flancs.	Jaunâtres, plus clairs que la poitrine, avec stries gris foncé.
Dos.	Vert jaunâtre avec stries gris foncé bien visibles.
Queue.	Partie supérieure : Gris foncé. Partie inférieure : Les deux premiers tiers jaunes et extrémités grises foncées.
Rémiges.	Grandes : Gris foncé avec liseré jaune pour le vexille externe. Secondaires : Gris foncé avec liseré jaune à l'extrémité.
Couvertures alaires.	Gris foncé. Barre alaire jaune bien visible.
Bec.	Couleur chair flammé à la mandibule supérieure.
Yeux.	Noirs.
Pattes. Doigts.	Chair.
Ongles.	Couleur corne.

17.6.19 Tarin des aulnes Femelle Pastel Dilué (*Spinus spinus*)
Mutation Pastel Dilué.



FIGURE 219 – Tarin des aulnes Femelle Pastel Dilué. Photo KBOF.

160

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Calotte.	Jaune verdâtre claire, striée de gris foncé.
Joues.	Jaunes verdâtre lavées de gris.
Gorge.	Grisâtre.
Poitrine.	Grisâtre avec légères stries gris foncé.
Dos.	Vert jaunâtre pâle avec stries dorsales gris foncé bien visibles.
Flancs.	Grisâtres, très clairs, striés de gris foncé.
Croupion.	Jaunâtre.
Queue.	<u>Partie supérieure</u> : Gris foncé. <u>Partie inférieure</u> : Le premier tiers est jaunâtre et le reste est gris foncé.
Rémiges.	<u>Grandes</u> : Gris foncé avec liseré jaune le long du vexille externe. <u>Secondaires</u> : Gris foncé avec un liseré jaune à l'extrémité.
Couvertures.	Gris foncé. Barre alaire jaunâtre.
Bec.	Couleur chair flammé à la mandibule supérieure.
Yeux.	Noirs.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur corne.

17.6.20 Tarin des aulnes Mâle Brun Pastel (*Spinus spinus*)

Mutation Brun Pastel.



FIGURE 220 – Tarin des aulnes Mâle Brun Pastel. Photo FOI.

Défauts :

- 1) Manteau présentant trop de brun (intermédiaire brun-pastel),
- 2) Poitrine jaunâtre (trop terne),
- 3) Joues brunes foncées,
- 4) Ongles foncés,
- 5) Queue trop foncée pour un brun-pastel.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Vertex. Occiput.	Brun clair.
Traits sourciliers.	Jaunes.
Joues.	Brun clair lavées de jaune.
Gorge. Poitrine.	Jaunes. Bavette brun claire si elle existe.
Flancs.	Jaunâtres avec stries brun clair.
Dos.	Manteau brun clair très légèrement strié.
Ventre.	Blanc sale.
Croupion.	Jaune.
Queue.	Deux premiers tiers jaunes et le reste est brun clair. Rectrices médianes entièrement brunes.
Rémiges.	<u>Grandes</u> : Brun clair avec liseré jaune. Bandes alaires et miroir jaune.
Couvertures alaires.	<u>Petites</u> : Brun clair. <u>Moyennes</u> : Brun clair avec liseré jaune (bande alaire). <u>Grandes</u> : Brun clair avec liseré jaune.
Bec.	Chair, flammé de brun à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux.	Bruns.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.



FIGURE 221 – Tarin des aulnes Mâle Brun Pastel. Photo JM. Eytorff.

17.6.21 Tarin des aulnes Femelle Brun Pastel (*Spinus spinus*)
Mutation Brun Pastel.



FIGURE 222 – Tarin des aulnes Femelle Brun Pastel. Photo KBOF.

161. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.
162. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Vertex. Occiput. Dos. Front.	Blanc sale lavées de jaune et striés de brun clair.
Traits sourciliers.	Jaune clair et peu visibles.
Joues.	Jaunâtres striées de brun clair.
Gorge.	Blanc sale.
Poitrine.	Blanc sale lavée de jaune pâle avec stries brun clair sur le haut de la poitrine.
Flancs.	Blanc sale striés de brun clair.
Ventre.	Blanc sale.
Croupion.	Blanc sale lavé de jaune.
Queue.	Premier tiers jaune et deux derniers tiers brun clair. Rectrices médianes entièrement brunes.
Ailes.	Identiques aux ailes des mâles mais avec un jaune moins intense.
Bec.	Chair, flammé de brun à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux.	Bruns.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

17.6.22 Tarin des aulnes Mâle Brun Pastel Dilué (*Spinus spinus*)
 Mutation Brun Pastel Dilué.



FIGURE 223 – Tarin des aulnes Mâle Brun Pastel Dilué. Photo JM. Eytorff.

163

163. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Vertex. Occiput. Joues.	Jaunes, voilés de beige.
Traits sourciliers.	Jaunes mais peu visibles.
Gorge. Poitrine. Dos. Croupion.	Jaunes, voilés de beige. Pas de stries.
Flancs.	Jaunes légèrement striés de beige.
Ventre.	Blanc sale.
Queue.	Deux premiers tiers jaunes et le reste est beige clair. Rectrices médianes entièrement beiges.
Rémiges.	Beige clair avec liserés jaunes.
Couvertures alaires.	Jaunes avec liserés et extrémités beige clair. Barre alaire visible.
Bec.	Chair, flammé de brun à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux.	Bruns.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

17.6.23 Tarin des aulnes Femelle Brun Pastel Dilué (*Spinus spinus*)
Mutation Brun Pastel Dilué.



FIGURE 224 – Tarin des aulnes Femelle Brun Pastel Dilué. Photo JM. Eytorff.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Vertex. Occiput. Front.	Beige clair lavés de jeune.
Traits sourciliers.	Jaune clair.
Gorge. Poitrine.	Blanc sale avec le moins de jaune possible.
Dos.	Manteau jaune lavé de beige et légèrement strié.
Flancs.	Blanc sale striés de beige clair.
Ventre.	Blanc sale.
Croupion.	Jaune lavé de beige clair.
Queue.	Premier tiers jaune et deux derniers tiers beiges. Rectrices médianes entièrement beiges.
Couvertures.	Jaunes avec liserés et extrémités beiges.
Rémiges.	Beiges avec liseré jaune.
Bec.	Chair, flammé de brun à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux.	Bruns.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

17.6.24 Tarin des aulnes Mâle Ivoire (*Spinus spinus*)
Mutation Ivoire.



FIGURE 225 – Tarin des aulnes Mâle Ivoire.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Vertex. Occiput. Front. Calotte.	Noirs. Calotte légèrement pointillée de gris.
Joues. Région auriculaire.	Jaune ivoire grisâtre légèrement voilé.
Traits sourciliers.	Jaune ivoire, partant de derrière l'oeil et s'élargissant vers le cou.
Cou. Dos.	Nuque gris verdâtre avec de fines stries très foncées.
Gorge. Poitrine. Épaules.	Vert gris. Certains mâles ont une petite bavette noire et régulière sur le haut de la gorge.
Flancs.	Gris vert avec des stries noires bien régulières. La couleur devient plus claire vers l'arrière des flancs.
Ventre.	Région anale légèrement grisâtre.
Croupion.	Gris vert.
Queue.	Deux premiers tiers des rectrices jaune ivoire et extrémité noire. Deux rectrices médianes noires.
Rémiges.	Grandes rémiges noir brunâtre avec vexille externe jaune ivoire. Barre alaire et petit miroir jaune ivoire.
Bec.	Couleur corne claire flammé de noir.
Yeux.	Brun foncé.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Noirs.

17.6.25 Tarin des aulnes Femelle Ivoire (*Spinus spinus*)

Mutation Ivoire.



FIGURE 226 – Tarin des aulnes Femelle Ivoire. Photo JM. Eytorff.

Défauts :

- 1) Manteau trop brun et trop terne,
- 2) Poitrine trop lipochrome,
- 3) Joues verdâtres,
- 4) Ongles clairs,
- 5) Mirroirs alaires trop jaune (mâles et femelles).

166

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Vertex. Occiput. Front.	Grisâtres avec de fines stries.
Joues. Région auriculaire.	Brunâtres, voilées de jaune ivoire.
Traits sourciliers.	Beaucoup moins jaunes que chez le mâle et plutôt brun grisâtre.
Cou. Dos. Épaules.	Grisâtres finement striés de noir brunâtre.
Gorge. Poitrine. Flancs.	Grisâtre dans l'ensemble. Côtés de la poitrine et flancs avec un beau dessin strié régulier et net de couleur gris foncé.
Ventre.	Grisâtre.
Croupion.	Gris vert légèrement strié de gris foncé.
Queue.	Premier tiers des rectrices jaune ivoire, le reste est noir gris. Deux rectrices médianes noir gris. Sous-caudales avec dessin écaillé.
Ailes.	Gris foncé avec les mêmes marques que les mâles.
Bec.	Couleur corne claire flammé de noir.
Yeux.	Brun foncé.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Noirs.

17.6.26 Tarin des aulnes Mâle Pastel Ivoire (*Spinus spinus*)
Mutation Pastel Ivoire.



FIGURE 227 – Tarin des aulnes Mâle Pastel Ivoire. Photo JM. Eytorff.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Vertex. Occiput. Front. Calotte.	Gris foncé. Calotte pointillée de gris.
Joues. Région auriculaire.	Vertes lavées de gris.
Traits sourciliers.	Jaune ivoire.
Dos.	Manteau verdâtre voilé de gris avec des stries noires.
Gorge. Poitrine.	Vert jaunâtre ivoire. Gorge avec parfois une bavette gris foncé.
Flancs.	Flancs à stries grises très foncées.
Croupion.	Verdâtre.
Queue.	Deux premiers tiers des rectrices jaune ivoire et extrémité gris très foncé. Deux rectrices médianes entièrement gris foncé.
Ailes.	Grandes rémiges : Gris foncé avec bords externes liserés de jaune ivoire. Rémiges secondaires : Avec liseré grisâtre. Barre alaire et miroir jaune ivoire clair.
Bec.	Couleur chair flammé.
Yeux.	Noirs.
Pattes. Doigts.	Chair foncé.
Ongles.	Foncés.

17.6.27 Tarin des aulnes Femelle Pastel Ivoire (*Spinus spinus*)

Mutation Pastel Ivoire.



FIGURE 228 – Tarin des aulnes Femelle Pastel Ivoire. Photo JM. Eytorff.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Vertex. Occiput. Front. Calotte.	Gris clair striés de noir.
Joues. Région auriculaire.	Grisâtres.
Traits sourciliers.	Gris clair.
Dos.	Manteau grisâtre strié de noir dilué.
Poitrine.	Gris clair strié de noir dilué.
Flancs.	Couleur de fond gris clair avec des stries d'un gris très foncé.
Croupion.	Grisâtre, légèrement strié de gris foncé.
Queue.	Le premier tiers des rectrices jaune ivoire et le reste est gris très foncé. Deux rectrices médianes entièrement gris très foncé.
Ailes.	<u>Grandes Rémiges</u> : Gris foncé avec bords externes liserés de jaune ivoire. <u>Rémiges Secondaires</u> : Avec liseré grisâtre. Barre alaire et miroir jaune ivoire clair.
Bec.	Couleur chair flammé.
Yeux.	Noirs.
Pattes. Doigts.	Chair foncé.
Ongles.	Foncés.

17.7 Chardonnerets

Chardonnerets

17.7.1 Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis carduelis*)



FIGURE 229 – Chardonneret élégant. Mâle à gauche. Femelle à droite.
Photo H. Heinzel.

Attention aux tailles intermédiaires.

Tailles	
Carduelis carduelis	—> 13/14 cm
Carduelis britannica	——> 13 cm
Carduelis parva	——> 11 cm
Carduelis tschusii	——> 11 cm
Carduelis frigoris	——> 16 cm
Carduelis balcanica	——> 13 cm
Carduelis niediecki	——> 12/14 cm
Carduelis brevirostris	——> 12,5 cm

Défauts
1) Dessin du masque irrégulier, 2) Couleur du masque irrégulière, (points noirs ou blancs dans le masque bicolore), 3) Calotte noire, bande alaire et champignon irrégulier, 4) Dessin de la nuque et des ailes pas symétrique.

17.7.2 Chardonneret Frigoris (*Carduelis carduelis frigoris*)



FIGURE 230 – Chardonneret frigoris. Photo H. Heinzl.

Attention aux tailles intermédiaires.

~~Anciennement Major.~~

Taille 16 cm

Caractéristiques :

- 1) Marque de nuque blanche et importante.
- 2) Joues, gorge, champignons blancs.
- 3) Brides du casque larges, très noires contournant l'arrière de la joue.
- 4) Dessin pectoral chamois intense et présentant souvent des traces noirâtres et jaunes. Les limites du champignon sont larges et bien nettes.
- 5) Flancs chamois bien marqués, croupion blanc lavé de beige.

17.7.3 Chardonneret Britannica (*Carduelis carduelis britannica*)



FIGURE 231 – Chardonneret britannica. Photo H. Heinzel.

Attention aux tailles intermédiaires.

Taille 13 cm

Caractéristiques :

- 1) Marque de nuque étroite, blanc sale.
- 2) Gorge et joues, fortement lavées de beige.
- 3) Champignons et ventre blancs et ternes.
- 4) Flancs et dessin pectoral brun,
- 5) Manteau brun foncé.
- 6) Croupion blanc sale fortement lavé de brun.

17.7.4 Chardonneret Parva (*Carduelis carduelis parva*)



FIGURE 232 – Chardonneret parva. Photo H. Heinzel.

Attention aux tailles intermédiaires.

Taille 11 / 12 cm

Caractéristiques :

- 1) Joues brun-grisâtres,
- 2) Gorge, champignons et ventre blancs,
- 3) Dessin pectoral et flancs chamois,
- 4) Croupion blanc lavé de beige,
- 5) Marque de nuque blanche et étroite,
- 6) Bec long, fort et pointu qui peut parfois paraître disproportionné avec la taille de l'oiseau.

17.7.5 Chardonneret Tschusii (*Carduelis carduelis tschusii*)



FIGURE 233 – Chardonneret tschusii. Photo. Heinzl.

Attention aux tailles intermédiaires.

Taille 11 / 12 cm

Caractéristiques :

- 1) Marque de nuque quasiment inexistante,
- 2) Joues lavées de brun,
- 3) Gorge, champignons et ventre blancs,
- 4) Dessin pectoral et flancs chamois,
- 5) Manteau brun jusqu'à la base du casque.
- 6) Croupion blanc lavé de beige,
- 7) Bec long, fort et pointu (moins long que chez le parva)

17.7.6 Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis carduelis*)

Phénotype ancestral.



FIGURE 234 – Chardonneret élégant.

Attention aux tailles intermédiaires.

Dimorphisme sexuel : Chez la femelle la couverture des épaules est brun verdâtre et non noire comme chez les mâles.

169

169. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 13 / 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Masque rouge écarlate englobant le front, le menton et la moitié des joues jusqu'à l'œil. Derrière le masque, large tache blanche (parfois brune selon les sous-espèces) sur les côtés de la tête et la gorge.
Cou.	Collier blanc dans la nuque séparant le noir de la nuque et le brun du dos.
Dos.	Brun foncé.
Calotte. Nuque. Lorums. Épaules. Ailes.	Noirs. Large barre alaire jaune vif. Points blancs à l'extrémité de chaque rémige.
Poitrine.	Brune sur les côtés avec un champignon blanc au centre.
Flancs.	Brunâtre en s'éclaircissant vers le ventre.
Ventre.	Blanc.
Croupion.	Blanchâtre.
Queue.	Noire. Points blancs à l'extrémité de chaque rectrice. Grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices externes.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Couleur chair. Extrémité noire et effilée.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Foncés.

17.7.7 Chardonneret élégant Brun (*Carduelis carduelis carduelis*)

Mutation brune.



FIGURE 235 – Chardonneret élégant brun. Photo UOF P. Malburet.

Dimorphisme sexuel : Chez la femelle, couverture des épaules brun verdâtre et non noire comme chez les mâles.

170

170. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Attention aux tailles intermédiaires.

Taille du corps : 13 / 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Masque rouge orange englobant le front, le menton, et la moitié des joues jusqu'à l'oeil. Derrière le masque, large tache blanche (parfois brune selon les sous-espèces) sur les côtés de la tête et la gorge.
Calotte. Nuque. Épaules. Lorum.	Brun foncé.
Cou.	Collier blanc dans la nuque séparant le brun de la nuque et le brun du dos.
Dos.	Brun chaud uniforme.
Poitrine.	Brun chaud avec champignon blanc au centre.
Flancs.	Brun en s'éclaircissant vers l'arrière.
Ventre.	Blanc sale.
Ailes.	Brun foncé avec large barre alaire jaune vif. Points blancs à l'extrémité de chaque rémige.
Croupion.	Blanchâtre lavé de brun.
Queue.	Brun foncé, avec pointillés blancs à l'extrémité des rectrices. Grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices externes.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.



FIGURE 236 – Chardonneret élégant brun. Photo L. Poullard.

17.7.8 Chardonneret élégant Agate (*Carduelis carduelis carduelis*)
Mutation agate.



FIGURE 237 – Chardonneret élégant agate. Photo JA. Abellan.

Dimorphisme sexuel : Chez la femelle la couverture des épaules est brune verdâtre et non noire comme chez les mâles.

171

171. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Attention aux tailles intermédiaires.

Taille du corps : 13 / 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Masque rouge écarlate. Derrière le masque, large tache blanche sur les côtés de la tête et la gorge.
Calotte. Nuque. Épaules. Lorums.	Noirs.
Cou.	Collier blanc dans la nuque séparant le noir de la nuque et le gris beige du manteau.
Dos.	Gris soutenu uniforme.
Poitrine.	Gris avec champignon blanc au centre.
Flancs.	Gris en s'éclaircissant vers l'arrière.
Ventre.	Blanc sale.
Ailes.	Noires avec large barre alaire jaune vif. Points blancs à l'extrémité de chaque rémige.
Croupion.	Blanchâtre lavé de gris beige.
Queue.	Noire, avec pointillés blancs à l'extrémité des rectrices. Grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices externes.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Extrémité du bec flammée de gris.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair (un peu grisâtre).



FIGURE 238 – Chardonneret élégant agate. Photo L. Poullard.

17.7.9 Chardonneret élégant Pastel (*Carduelis carduelis carduelis*)

Mutation pastel.



FIGURE 239 – Chardonneret élégant pastel. Photo R. Driesmans.

Dimorphisme sexuel : Chez la femelle, couverture des épaules brun verdâtre et non noire comme chez les mâles.

172

172. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Attention aux tailles intermédiaires.

Taille du corps : 13 / 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Masque rouge orange avec dessin gris sur le crâne et la nuque.
Joues.	Blanc sale.
Gorge.	Blanc sale sous le masque.
Dos. Flancs.	Gris brun clair.
Poitrine.	Gris brun clair avec champignon blanc au centre.
Ailes.	Rémiges primaires et secondaires gris foncé le plus égal possible avec extrémités blanches. Miroir jaune.
Couvertures.	Gris foncé.
Croupion.	Gris brun clair se transformant en blanc sale vers la queue.
Queue.	Rectrices grises avec taches blanches sur les deux rectrices externes.
Yeux.	Noirs.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.



FIGURE 240 – Chardonneret élégant pastel.



FIGURE 241 – Chardonneret élégant pastel. Différence entre Pastel et Ancestral.
Photo M. Natale.

17.7.10 Chardonneret élégant Isabelle (*Carduelis carduelis carduelis*)
Mutation isabelle.



FIGURE 242 – Chardonneret élégant isabelle. Photo UOF P. Malburet.

Dimorphisme sexuel : Chez la femelle, couverture des épaules brun verdâtre et non noire comme chez les mâles.

173

173. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Attention aux tailles intermédiaires.

Taille du corps : 13 / 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Masque rouge orange englobant le front, le menton, et la moitié des joues jusqu'à l'oeil. Derrière le masque, large tache blanche (parfois brune selon les sous-espèces) sur les côtés de la tête et la gorge.
Calotte. Nuque. Lorums.	Brun beige.
Cou.	Collier blanc séparant le brun beige de la nuque et le brun beige du manteau.
Dos. Flancs.	Brun beige. Les flancs s'éclaircissent vers l'arrière.
Épaules.	Brunes.
Poitrine.	Brun beige avec champignon blanc au centre.
Ventre.	Blanc sale.
Ailes.	Brun beige avec large barre alaire jaune vif. Points blancs à l'extrémité de chaque rémige.
Croupion.	Blanchâtre lavé de gris.
Queue.	Brun beige, avec pointillés blancs à l'extrémité des rectrices. Grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices externes.
Yeux.	Bruns.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

17.7.11 Chardonneret élégant Satiné (*Carduelis carduelis carduelis*)
Mutation Satiné.



FIGURE 243 – Chardonneret élégant Satiné. Photo JM. Eytorff.

Attention aux tailles intermédiaires.

Taille du corps : 13 / 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Masque rouge orange englobant le front, le menton, et la moitié des joues jusqu'à l'oeil. Derrière le masque, large tache blanche (parfois brune selon les sous-espèces) sur les côtés de la tête et la gorge.
Calotte. Nuque. Lorums.	Beiges.
Cou. Gorge.	Blancs. Collier blanc séparant le beige de la nuque et le beige du dos.
Dos.	Blanc voilé de beige.
Épaules.	Beiges.
Poitrine.	Blanc sale voilé de beige avec champignon blanc visible au centre.
Flancs.	Blanc sale légèrement voilé de beige.
Ventre.	Blanc sale.
Ailes.	Beiges, avec large barre alaire jaune vif. Points blancs à l'extrémité de chaque rémige.
Croupion.	Blanchâtre lavé de beige.
Queue.	Beige, avec pointillés blancs à l'extrémité des rectrices. Grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices externes.
Yeux.	Rouges.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

17.7.12 Chardonneret élégant Blanc avec masque orange (*Carduelis carduelis carduelis*)

Mutation blanc avec masque orange.

Photo en

Attente

FIGURE 244 – Chardonneret élégant blanc avec masque orange.

175

175. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Attention aux tailles intermédiaires.

Taille du corps : 13 / 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Blanche. Masque orange qui ne va pas jusqu'à la base du bec.
Dos.	Blanc.
Poitrine.	Blanche.
Flancs.	Blancs.
Rémiges.	<u>Rémiges primaires</u> : Blanches avec un liseré jaune dans leur partie médiane. <u>Rémiges secondaires</u> : Blanches.
Couvertures.	<u>Couvertures primaires</u> : Blanches avec quelques plumes jaunes. <u>Couvertures secondaires et tertiaires</u> : Blanches.
Croupion.	Blanc.
Queue.	Blanche avec un léger liseré jaune.
Bec.	Couleur chair, légèrement flammé à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux.	Noirs.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Blancs.

17.7.13 Chardonneret élégant Jaune (*Carduelis carduelis carduelis*)
Mutation jaune.



FIGURE 245 – Chardonneret élégant jaune.

176

Attention aux tailles intermédiaires.

Taille du corps : 13 / 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête. Dos.	L'ensemble du plumage présente une suffusion jaune, visible surtout sur les parties dépourvues de pigments mélaniques : joues, nuque, poitrail, croupion.
Poitrine. Flancs.	La couleur jaune doit être pure, intense, le plus uniforme possible.
Rémiges. Croupion.	Le masque facial est très lumineux, plus étendu et plus diffus que chez les sujets présentant le patron classique.
Queue. Bec.	Cette mutation à hérédité dominante a été transposée à toutes les variétés existantes.
Yeux. Pattes. Doigts. Ongles.	

17.7.14 Chardonneret élégant Aminet (*Carduelis carduelis carduelis*)

Mutation aminet. (~~ex-Eumo~~)



FIGURE 246 – Chardonneret élégant aminet.

Attention aux tailles intermédiaires.

Taille du corps : 13 / 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Masque rouge écarlate englobant le front, le menton, et la moitié des joues jusqu'à l'oeil. Derrière le masque, large tache blanche (parfois brune selon les sous-espèces) sur les côtés de la tête et la gorge.
Calotte. Lorums. Nuque.	calotte et lorums le plus noir possible. Nuque blanche.
Cou. Gorge.	Collier blanc formant une séparation entre le noir de la nuque et le manteau beige-rosé.
Dos.	De couleur beige-rosé.
Épaules.	Marbrées brun-noir chez le mâle et brun verdâtre chez la femelle.
Poitrine.	Beige avec voile jaunâtre le champignon est quasiment invisible.
Flancs.	Beige très clair voilé de blanc.
Ventre.	Blanc.
Ailes.	Rémiges noires, avec large barre alaire jaune vif. Points blancs à l'extrémité de chaque rémige.
Croupion.	Le plus blanc possible.
Queue.	noire, avec points blancs à l'extrémité des rectrices. Grande tache blanche à la partie intérieure des rectrices externes.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.



FIGURE 247 – Chardonneret élégant aminet. Différence entre Aminet et Agate.
Photo KBOF.

17.7.15 Chardonneret élégant Opale (*Carduelis carduelis carduelis*)

Mutation Opale.

Standard en attente de validation par la COM/OMJ



FIGURE 248 – Chardonneret élégant Opale. Photo M. Natale.

Défauts :

Réduction phéomélanique excessive. Couleur grise trop claire.

Croix noire trop fine et irrégulière

Attention aux tailles intermédiaires.

Taille du corps : 13 / 14 cm.

Cette mutation a une hérédité récessive autosomale et particulièrement rare encore en élevage. C'est grâce à un éleveur italien réputé, Paolo GREGORUTTI que cette formidable mutation a été fixée. L'ensemble du plumage est à dominante gris blanc sale, les rémiges et les rectrices sont gris cendré. Le masque rouge subsiste avec des incrustations grises noires. Les miroirs alaires jaunes subsistent.

Texte de JM. Eytorff.

Effets phénotypiques : Le gène mutant provoque une réduction spectaculaire de la phéomélanine et de l'eumélanine. Le dos est de couleur gris. La réduction n'est pas homogène. et il est possible d'apprécier dans cette partie une alternance de zones plus claires et plus foncées, surtout chez les femelles. probablement en raison de la plus grande quantité de phéomélanine qui caractérise ce sexe. La poitrine est très claire, voilée de gris. Les flancs et les joues sont blancs. Les parties eumélaniques (zones noires de l'ancestrale) ont une émission opale intéressante, typique de la pierre Opale. d'où la mutation tire son nom. Notez une tendance inégale dans ces zones, typique de cette mutation.

Caractéristiques fondamentales : La caractéristique la plus typique est le reflet bleu gris des zones eumélaniques. ailes et queue, tandis que la croix sur la tête est gris anthracite.

La non-uniformité des parties mélaniques est l'une des caractéristiques typiques, évidente à la fois sur le dos (surtout chez les femelles, plus riches en phéo) et sur les ailes et la queue, où il est possible de reconnaître des traits avec un dégradé de pigmentation plus faible. Comme déjà étudié chez le Canari de couleur, la mutation s'accompagne d'une certaine « difficulté » du plumage, plus sec et plus morcelé.

D'un point de vue sélectif, il est bon de garder une certaine patine phéo sur le dos et la poitrine. Une attention particulière doit être accordée à la structure et à la conception de la croix et du masque.



FIGURE 249 – Chardonneret élégant Opale. Photo M. Natale.

17.7.16 Chardonneret élégant Tête blanche Ancestral (*Carduelis carduelis carduelis*)

Mutation Tête blanche ancestrale.



FIGURE 250 – Chardonneret élégant Tête blanche Ancestral. Photo M. Natale.

Défauts : Débordement excessif du rouge du masque en direction nucale. Phaéomélanine dorsale non uniforme. Présence parfois de traces noires sur la zone correspondante à la calotte, qui par contre pourrait disparaître totalement.

178. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Attention aux tailles intermédiaires.

Taille du corps : 13 / 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Absence de casque noir remplacé par une couleur blanche la plus uniforme possible (crâne, lorums, nuque). Seules subsistent de chaque côté de la tête les traces des brides du casque, de forme triangulaire et de couleur rouge ou orange.
Masque.	Rouge lumineux, qui peut-être plus étendu sur la face et le front.
Dos. Poitrine. Flancs. Rémiges. Couvertures. Croupion. Queue. Bec. Yeux. Pattes. Doigts. Ongles.	Mêmes caractéristiques que le phénotype sauvage, avec des miroirs alaires qui s'étendent aux grandes couvertures et pouvant remonter à la pliure de l'épaule (il est aussi visible à l'envers de l'aile). Cette mutation récessive autosomale a été transposée aux autres mutations existantes (brun, agate, etc.)

17.7.17 Chardonneret élégant Tête blanche Brun (*Carduelis carduelis*)

Mutation Tête blanche Brun.

Standard en attente de validation par la COM/OMJ



FIGURE 251 – Chardonneret élégant Tête blanche Brun. Photo M. Natale.

Attention aux tailles intermédiaires.

Taille du corps : 13 / 14 cm.

Génétique : Le facteur Tête Blanche a une transmission autosomique récessive. Le facteur Brun est une mutation récessive liée au sexe.

Effets phénotypiques : Aux classiques effets de la mutation Tête Blanche (perte de la Calotte Noire, dépigmentation de la phaéomélanine apicale, réduction importante de l'eumélanine) s'ajoute à l'effet de la mutation du Brun. Ainsi, le résultat de ce chevauchement apparaît phénotypiquement comme Tête Blanche caractérisée par la transformation du noir des ailes et de la queue en un brun foncé (tête de maure). Le poitrail est taché de phaéomélanine. Les flancs et la poitrine sont blancs, les pattes de couleur chair, les yeux noirs. Même dans ce cas, l'existence d'un sous plumage blanc donne au sujet muté une vue d'ensemble assez claire, et particulière.

Caractéristiques fondamentales : La superposition est très intéressante. Le Brun confère une tonalité très chaude à la zone dorsale, laissant intact le reste des schémas typiques du Tête Blanche. Encore une fois, la disparition de la calotte noire, provoque le débordement du rouge presque à la région de la nuque, surtout chez les mâles. Défaut inévitable qui ne peut être supprimé que par la sélection.

Le jaune des ailes est plus pâle chez le Brun Tête Blanche que chez l'Agate Tête Blanche. Le noir des ailes et de la queue est de couleur anthracite (moins noir que chez l'Agate Tête Blanche).

Pour obtenir le premier Brun Tête Blanche, il est nécessaire d'accoupler deux sujets homozygotes. Préférant le mâle (car la mutation est liée au sexe), c'est à dire un mâle et une femelle Brun Tête Blanche non consanguins.

Les accouplements conseillés : Le mâle phénotype sauvage / Tête Blanche / Brun X Femelle brun / Tête Blanche.

En couples, il est préférable d'utiliser au moins un porteur Brun Tête Blanche, afin d'optimiser l'oxydation requis pour la mutation Brune.

17.7.18 Chardonneret élégant Tête blanche Agate (*Carduelis carduelis*)

Mutation Tête blanche Agate.

Standard en attente de validation par la COM/OMJ



FIGURE 252 – Chardonneret élégant Tête blanche Agate. Photo M. Natale.

Attention aux tailles intermédiaires.

Taille du corps : 13 / 14 cm.

Génétique : Le facteur Tête Blanche a une transmission autosomique récessive. Le facteur Agate est une mutation récessive liée au sexe.

Effets phénotypiques : Aux classiques effets de la mutation Tête Blanche (perte de la Calotte Noire, dépigmentation de la phaéomélanine apicale, réduction quantitative de l'eumélanine) s'ajoute à l'effet de la mutation Agate, qui consiste surtout dans l'importance de la réduction de la phaéomélanine. Ainsi, le résultat de cette superposition apparaît phénotypiquement comme Tête Blanche caractérisée par une réduction importante de la phaéomélanine, surtout sur le dos, qui se présente d'un beau gris aluminium avec une dépigmentation des pointes. Même la poitrine perd de la phaéomélanine, apparaissant presque blanche avec des effets jaune. Les flancs et la poitrine sont blancs, les pattes de couleur chair, les yeux noirs. La persistance d'un sous plumage blanc confère au sujet muté un aspect général assez clair et particulier.

Caractéristiques fondamentales : La superposition est très intéressante car la couleur contraste entre les zones noires et grises. Le dos est gris foncé tandis que la poitrine est blanche. Dans ce cas, la disparition de la calotte noire provoque le débordement du rouge jusqu'à la région de la nuque, surtout chez les mâles. Défaut inévitable qui ne peut être supprimé que par la sélection.

Le jaune des ailes est plus vif que chez le Brun Tête Blanche. Le noir des ailes et de la queue est plus foncé que chez le Brun Tête Blanche.

Pour obtenir l'Agate Tête Blanche, il est évidemment nécessaire d'accoupler deux sujets homozygotes, préférant un mâle Agate (car la mutation est liée au sexe), c'est à dire un mâle et une femelle Agate Tête Blanche, éventuellement non consanguines.

17.7.19 Chardonneret élégant Tête blanche Isabelle (*Carduelis carduelis*)

Mutation Tête blanche Isabelle.

Standard en attente de validation par la COM/OMJ



FIGURE 253 – Chardonneret élégant Tête blanche Isabelle. Photo M. Natale.

Attention aux tailles intermédiaires.

Taille du corps : 13 / 14 cm.

Génétique : Le facteur Tête Blanche a une transmission autosomique récessive. Le facteur Isabelle est une mutation récessive liée au sexe.

Effets phénotypiques : Aux classiques effets de la mutation Tête Blanche (perte de la Calotte Noire, dépigmentation de la phaéomélanine apicale, réduction quantitative de l'eumélanine) s'ajoute à l'effet des deux mutations Agate et Brune qui sont caractéristiques du croisement isabelle (l'Agate amène une importante réduction de la phaéomélanine et le Brun transforme le noir en marron). Ainsi le Tête Blanche Isabelle se présente phénotypiquement comme un Tête Blanche caractérisé par une importante réduction de la phaéomélanine et de l'eumélanine, le noir se présente d'un marron légèrement plus réduit par rapport à un brun classique, de plus le dos se présente en un beau beige sable avec une dépigmentation des pointes des rémiges tertiaires. Même la poitrine perd de la phaéomélanine apparaissant presque blanche avec des effets jaune. Les flancs et les joues sont blancs, les pattes de couleur chair, les yeux rougeâtres.

Caractéristiques fondamentales : La superposition est très importante car les dessins même fortement réduits demeurent bien visibles. Même dans ce cas la disparition de la calotte noire provoque le débordement du rouge jusqu'à la région de la nuque surtout chez les mâles. Défaut inévitable qui ne peut être supprimé que par la sélection.

17.7.20 Chardonneret élégant Tête blanche Lutino (*Carduelis carduelis*)

Mutation Tête blanche Lutino.

Standard en attente de validation par la COM/OMJ



FIGURE 254 – Chardonneret élégant Tête blanche Lutino. Photo M. Natale.

Attention aux tailles intermédiaires.

Taille du corps : 13 / 14 cm.

Génétique : Le facteur Tête Blanche a une transmission autosomique récessive. Le facteur Lutino est une mutation récessive liée au sexe.

Effets phénotypiques : Le Lutino enlève complètement la phaéomélanine et réduit fortement l'eumélanine noire. Le Tête Blanche dans cette superposition devient visible surtout au niveau de la tête par la disparition du dessin de la calotte. La réduction apicale de la phaéomélanine est liée à la totale perte de ce pigment. L'effet général est beaucoup plus clair par rapport à un Lutino ((Agate Satiné) classique par la présence d'un sous-plumage blanc, ainsi le résultat de cette superposition se présente phénotypiquement comme un Lutino sans dessin au niveau de la tête. La poitrine est blanche avec quelques effets jaunes. Les flancs et les joues blancs. Les pattes de couleur chair. Les yeux rouges.

Caractéristiques fondamentales : La superposition est extrême, spectaculaire mais techniquement moins intéressante par rapport à un Tête Blanche Agate (les contrastes sont bien plus marqués pour l'Agate). Même dans ce cas, la disparition de la calotte noire provoque le débordement du rouge jusqu'à la région de la nuque, surtout chez les mâles. Défaut inévitable qui ne peut être supprimé que par sélection.

17.7.21 Chardonneret élégant Tête blanche Satiné (*Carduelis carduelis*)

Mutation Tête blanche Satiné.

Standard en attente de validation par la COM/OMJ



FIGURE 255 – Chardonneret élégant Tête blanche Satiné. Photo M. Natale.

Taille du corps : 13 / 14 cm.

Génétique : Le facteur Tête Blanche a une transmission autosomique récessive. Le facteur Satiné est une mutation récessives liée au sexe.

Effets phénotypiques : Le Brun transforme l'eumélanine noire en Brun, le Lutino abolit la phaéomélanine et réduit fortement l'eumélanine noire. Il ressort donc des dessins moins marqués quand l'eumélanine est transformée en Brun. Pour cette raison, le Satiné par rapport au Lutino présente un dessin plus marqué avec des tendances Brune au niveau des ailes et de la queue. Le Tête Blanche dans cette superposition devient reconnaissable surtout au niveau de la tête par la disparition du dessin de la calotte. La réduction apicale de la phaéomélanine est liée à la totale disparition de ce pigment. Ainsi, le résultat de cette superposition se présente phénotypiquement comme un Satiné Brun à savoir les ailes et la queue d'un Brun noisette plus marqué que chez un Lutino mais sans dessin au niveau de la tête. La poitrine est blanche avec des traces jaune. Les flancs et les joues blancs. Les pattes de couleur chair et les yeux rouges.

Caractéristiques fondamentales : La superposition est extrême et spectaculaire même si techniquement elle est moins intéressante par rapport à un Tête Blanche Agate qui a des contrastes bien plus marqués. Même dans ce cas, la disparition de la calotte noire amène le débordement du rouge presque jusqu'à la région de la nuque, surtout chez les mâles. Défaut inévitable qui ne peut être supprimé que par sélection.

Il est important de distinguer le Tête Blanche Lutino qui a la terminaison des plumes alaires et les rectrices plus marquées et à tendances Brune par rapport au Tête Blanche Satiné qui lui a les rectrices et les alaires de couleur noisette.

Attention aux tailles intermédiaires.

17.8 Verdiers

Verdiers

17.8.1 Verdier d'Europe (*Chloris chloris chloris*)



FIGURE 256 – Verdier d'Europe. Mâle à gauche. Femelle à droite.
Photo H. Heinzl.

Défauts des verdiers en général :

- 1) Tête trop plate et trop petite,
- 2) Bosse à la nuque,
- 3) Dessins des joues pas assez visibles,
- 4) Corps pas assez trapu,
- 5) Liseré jaune pas assez vif chez le mâle,
- 6) Dos creux,
- 7) Tache jaune sur le front,
- 8) Couleur trop brune chez les mâles.

17.8.2 Verdier d'Europe (*Chloris chloris aurantiiventris*)



FIGURE 257 – Verdier d'Europe. Photo : Gauche H. Heinzel. Droite E. Gomez.

Taille de 14 à 16 cm selon la sous-espèce.

Caractéristiques concernant aurantiiventris :

- 1) Couleur verte plus lumineuse que chez *chloris chloris*,
- 2) Gorge et face ventrale fortement lavées de jaune,
- 3) Bec et pattes plus clairs que chez *chloris chloris*,
- 4) Plus grand et plus coloré que *chloris chloris*.

17.8.3 Verdier d'Europe Mâle (*Chloris chloris chloris*)

Phénotype ancestral.



FIGURE 258 – Verdier d'Europe Mâle.

184

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Large, massive, avec le cou bien rempli. Front vert lumineux. Zone loreale et moustache gris-vert.
Joues.	Gris cendré.
Gorge. Épaules.	Vert jaunâtre.
Dos.	Vert olive avec reflets brunâtres.
Poitrine. Flancs.	Vert olive.
Ventre.	Gris blanchâtre.
Ailes.	Grandes rémiges : Noir brunâtre avec vexille externe jaune vif. Rémiges secondaires : Grises avec un liseré noir brunâtre à l'extrémité.
Queue.	Rectrices jaunes à la base et noir brunâtre à l'extrémité avec un liseré gris le long du vexille externe. Les deux rectrices médianes sont noir brunâtre. Queue courte avec l'extrémité fourchue.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Couleur chair, flammé de brun. Gros et conique.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair foncé.



FIGURE 259 – Verdier d'Europe Mâle. Photo M. Chrisostome.

17.8.4 Verdier d'Europe Femelle (*Chloris chloris chloris*)

Phénotype ancestral.



FIGURE 260 – Verdier d'Europe Femelle.

185

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Brun grisâtre. Large, massive, avec le cou bien rempli.
Joues.	Gris cendré.
Gorge. Épaules.	Gris-vert.
Dos.	Brun grisâtre marqué de stries plus foncées.
Poitrine. Flancs.	Brun grisâtre strié.
Ventre.	Gris blanchâtre.
Ailes.	Grandes <u>rémyges</u> : Noir brunâtre avec vexille externe jaune. Rémyges secondaires : Grises avec un liseré noir brunâtre à l'extrémité. Liseré moins large que chez le mâle.
Queue.	Rectrices jaunes à la base et noir brunâtre à l'extrémité avec un liseré gris le long du vexille externe. Les deux rectrices médianes sont noir brunâtre. Queue courte avec l'extrémité fourchue. Miroir moins large que chez le mâle.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Couleur chair, flammé de brun. Gros et conique..
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair foncé.

17.8.5 Verdier d'Europe Mâle Brun (*Chloris chloris chloris*)

Mutation brune.



FIGURE 261 – Verdier Mâle Brun. Photo P. Rocher.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Brun jaunâtre avec un voile gris brun sur les joues. Moustaches plus foncées que les joues. Sourcils plus clairs.
Dos.	Brun jaunâtre.
Poitrine.	Jaune brun.
Flancs.	Bruns jaunâtres.
Ventre.	Jaunâtre.
Ailes.	Grandes rémiges : Brunes avec vexille externe jaune et liseré beige à l'extrémité. Rémiges secondaires : Brun grisâtre.
Couvertures.	Grandes couvertures brun grisâtre. Petites et moyennes couvertures brun jaunâtre.
Croupion.	Olive.
Queue.	Deux premiers tiers des rectrices jaunes et dernier tiers brun avec liseré beige sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux.	Bruns.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

17.8.6 Verdier d'Europe Femelle Brune (*Chloris chloris chloris*)
Mutation brune.



FIGURE 262 – Verdier Femelle Brune. Photo UOF P. Malburet.

Défauts :

- 1) Manteau brun grisâtre,
- 2) Tonalité terne,
- 3) Trop de lipochrome à la poitrine,
- 4) Couleur intermédiaire brun/isabelle,
- 5) Bec : Mandibule inférieure jaune (porteur bec jaune).

187

187. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Brun jaunâtre avec un voile gris brun sur les joues. Moustaches plus foncées que les joues. Sourcils plus clairs.
Dos.	Brun jaunâtre.
Poitrine.	Jaune brun.
Flancs.	Bruns jaunâtres.
Ventre.	Jaunâtre.
Ailes.	Grandes rémiges : Brunes avec vexille externe jaune et liseré beige à l'extrémité. Rémiges secondaires : Brun grisâtre.
Couvertures.	Grandes couvertures brun grisâtre. Petites et moyennes couvertures brun jaunâtre.
Croupion.	Olive.
Queue.	Deux premiers tiers des rectrices jaunes et dernier tiers brun avec liseré beige sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux.	Bruns.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

17.8.7 Verdier d'Europe Mâle Agate (*Chloris chloris chloris*)
Mutation Agate.



FIGURE 263 – Verdier Mâle Agate.

188

188. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Vert jaunâtre.
Couronne. Joues. Moustaches.	Gris.
Gorge.	Vert jaunâtre.
Dos.	Vert avec léger voile gris bien régulier.
Poitrine. Flancs.	Vert jaunâtre avec un voile gris.
Ventre.	Vert jaunâtre.
Ailes.	Grandes rémiges : Gris foncé avec vexille externe jaune et liseré gris clair à l'extrémité. <u>Rémiges secondaires</u> : Gris foncé avec un large liseré gris clair.
Couvertures.	Grandes couvertures gris argenté. Petites et moyennes couvertures vert jaunâtre.
Croupion.	Vert jaunâtre.
Queue.	Deux premiers tiers des rectrices jaunes et dernier tiers gris foncé avec liseré gris clair sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux.	Noirs.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

Remarque : Le voile gris est moins visible chez les mâles adultes.



FIGURE 264 – Verdier Mâle Agate.

17.8.8 Verdier d'Europe Femelle Agate (*Chloris chloris chloris*)

Mutation Agate.



FIGURE 265 – Verdier Femelle Agate.

Défauts :

- 1) Manteau trop brun,
- 2) Interstries brunes,
- 3) Rémiges secondaires brunâtres,
- 4) Trop de lipochrome à la poitrine,
- 5) Bec : Mandibule inférieure jaune (porteur bec jaune).

189

189. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Couronne vert jaunâtre striée de gris. Joues vert jaunâtre lavées de gris. Moustaches grises.
Gorge.	Gris clair.
Dos.	Vert avec dessin strié gris bien visible.
Poitrine. Flancs.	Gris clair. Poitrine avec dessin strié gris sur les côtés.
Ventre.	Gris clair.
Ailes.	<u>Grandes rémiges</u> : Gris foncé avec vexille externe jaune clair et liseré gris clair à l'extrémité. <u>Rémiges secondaires</u> : Gris foncé avec un large liseré gris brun.
Couvertures.	Grandes couvertures gris brun. Petites et moyennes couvertures vert lavé de gris.
Croupion.	Vert jaunâtre voilé de gris
Queue.	Deux premiers tiers des rectrices jaune clair et dernier tiers gris foncé avec liseré gris clair à l'extrémité sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux.	Noirs.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

Remarque : La couleur de fond jaune est plus visible chez les adultes.

17.8.9 Verdier d'Europe Mâle Isabelle (*Chloris chloris chloris*)
Mutation Isabelle.



FIGURE 266 – Verdier d'Europe Mâle Isabelle. Photo UOF. P. Malburet.



FIGURE 267 – Verdier d'Europe Mâle Isabelle. Photo UOF. P. Malburet.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Jaunâtre.
Couronne. Joues. Moustaches.	Beiges.
Gorge.	Jaune.
Dos.	Jaune avec léger voile beige bien réparti.
Poitrine. Flancs.	Jaune avec un voile beige.
Ventre.	Jaune devenant blanc vers l'anus.
Ailes.	Grandes rémiges : Brunnes avec vexille externe jaune et liseré beige à l'extrémité. Rémiges secondaires : Brunnes avec un large liseré beige.
Couvertures.	Grandes couvertures beiges. Petites et moyennes couvertures jaunes.
Croupion.	Jaune.
Queue.	Deux premiers tiers des rectrices jaunes et dernier tiers brun avec liseré beige à l'extrémité sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux.	Brun foncé (yeux isabelle).
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

Remarque : Le voile beige est moins visible chez les mâles adultes.

17.8.10 Verdier d'Europe Femelle Isabelle (*Chloris chloris chloris*)

Mutation Isabelle.



FIGURE 268 – Verdier d'Europe Femelle Isabelle. Photo KBOF.

Défauts :

- 1) Manteau trop brun,
- 2) Rémiges trop brunes,
- 3) Rectrices trop brunes,
- 4) Trop de lipochrome à la poitrine,
- 5) Bec : Mandibule inférieure jaune (porteur bec jaune).

191

191. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Jaunâtre.
Couronne. Joues. Moustaches.	Beiges.
Gorge.	Vert jaunâtre.
Dos.	Vert jaunâtre avec léger voile beige bien réparti.
Poitrine. Flancs.	Vert jaunâtre avec un voile beige.
Ventre.	Beige clair.
Ailes.	Grandes rémiges : Brun beige avec vexille externe jaune clair et liseré beige clair à l'extrémité. Rémiges secondaires : Brun beige.
Couvertures.	Grandes couvertures brun beige. Petites et moyennes couvertures vert jaunâtre lavé de beige.
Croupion.	Vert jaunâtre.
Queue.	Deux premiers tiers des rectrices jaune pâle et dernier tiers brun avec liseré beige à l'extrémité sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux.	Brun foncé (yeux isabelle).
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

Remarque : La couleur de fond jaune est plus visible chez les adultes.

17.8.11 Verdier d'Europe Mâle Isabelle Satiné (*Chloris chloris chloris*)

Mutation Isabelle Satiné.



FIGURE 269 – Verdier d'Europe Mâle Isabelle Satiné. Photo FOI.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Jaune.
Couronne. Joues.	Beige très clair.
Gorge. Croupion.	Jaune.
Dos.	Jaune avec un voile beige très clair, sans stries.
Poitrine.	Jaune avec un voile beige très clair sur les côtés.
Flancs.	Jaune avec un voile beige très clair.
Ventre.	Blanc sale.
Ailes.	<u>Grandes rémiges</u> : Beiges avec vexille externe jaune et liseré beige très clair à l'extrémité. <u>Rémiges secondaires</u> : Beige clair.
Couvertures.	<u>Grandes couvertures</u> : Beige clair. <u>Petites et moyennes couvertures</u> : Jaunes.
Queue.	Deux premiers tiers des rectrices jaune doré et dernier tiers beige sans liseré sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux.	Rouges.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

Remarque : Les mâles adultes ont une couleur de fond est plus jaune sur la poitrine.

17.8.12 Verdier d'Europe Femelle Isabelle Satiné (*Chloris chloris chloris*)

Mutation Isabelle Satiné.



FIGURE 270 – Verdier d'Europe Femelle Isabelle Satiné.
Photo UOF. P. Malburet.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Jaune clair.
Couronne.	
Joues.	Beige très clair.
Gorge.	Jaune clair.
Dos.	Jaune clair avec un voile beige très clair. Présence d'un léger dessin de stries beiges.
Poitrine. Flancs.	Jaune clair avec un voile beige très clair.
Ventre.	Blanc sale.
Ailes.	Grandes rémiges : Beiges avec vexille externe jaune et liseré beige très clair à l'extrémité. Rémiges secondaires : Beige clair.
Couvertures.	Grandes couvertures : Beige clair avec un voile gris. Petites et moyennes couvertures : Jaunes voilées de beige.
Croupion.	Jaune.
Queue.	Deux premiers tiers des rectrices jaunes et dernier tiers beige sans liseré sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux.	Rouges.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles. Couleur chair.	

17.8.13 Verdier d'Europe Mâle Agate Satiné (*Chloris chloris chloris*)
Mutation Agate Satiné (Lutino).



FIGURE 271 – Verdier d'Europe Mâle Agate Satiné. Photo UOF. P. Malburet.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête. Gorge. Poitrine. Dos. Flancs.	Jaune.
Ventre.	Blanc jaunâtre.
Ailes.	Grandes rémiges : Jaunes avec vexille externe jaune doré et liseré beige très clair à l'extrémité. Rémiges secondaires : Jaunes.
Couvertures.	Jaunes.
Croupion.	Jaune doré.
Queue.	Jaune avec liseré externe jaune doré.
Yeux.	Rouges.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

17.8.14 Verdier d'Europe Femelle Agate Satiné (*Chloris chloris chloris*)

Mutation Agate Satiné (Lutino).



FIGURE 272 – Verdier d'Europe Femelle Agate Satiné.
Photo UOF. P. Malburet.

Défauts :

- 1) Présence de brun dans la queue,
- 2) Présence de reflets brunâtre dans le manteau,
- 3) Traces de brun dans les rémiges,
- 4) Couleur terne,
- 5) Bec : Mandibule inférieure jaune (porteur bec jaune).

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête. Gorge. Poitrine. Dos. Flancs.	Blanc jaunâtre.
Ventre.	Blanchâtre.
Ailes.	Grandes rémiges : Blanchâtres avec vexille externe jaune. Rémiges secondaires : Blanchâtres. Epauls jaunes.
Couvertures.	Grandes couvertures : Jaune blanchâtre. Petites et moyennes couvertures : Blanchâtres.
Croupion.	Jaune.
Queue.	Blanchâtre avec petit liseré jaune.
Yeux.	Rouges.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

17.8.15 Verdier d'Europe Vert Pastel (*Chloris chloris chloris*)

Mutation Vert Pastel.



FIGURE 273 – Verdier d'Europe Femelle Vert Pastel. Photo R. Driesmans.

Dimorphisme sexuel : Mêmes caractéristiques que les mâles mais le pigment est plus foncé. Les liserés jaunes des rémiges et des rectrices sont moins larges et plus ternes. Très léger dessin dorsal visible.

Remarque : Il faut tenir compte qu'il existe des spécimens schimmel et intensifs. Cette différence est bien marquée.

196

196. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Gris vert avec les moustaches et les joues grisâtres.
Dos. Flancs. Poitrine.	Vert olive avec des reflets gris.
Épaules. Gorge.	Jaune verdâtre.
Ventre.	Gris blanchâtre.
Ailes.	<u>Rémiges primaires</u> : Gris foncé avec vexille externe jaune vif. <u>Rémiges secondaires</u> : Gris clair avec un liseré gris foncé.
Croupion.	Vert olive
Queue.	Jaune à la base avec l'extrémité gris clair lavée de jaune. un liseré gris plus foncé entoure les rectrices.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Couleur chair, flammé de brun clair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur corne.

17.8.16 Verdier d'Europe Mâle Agate Pastel (*Chloris chloris chloris*)
Mutation Agate Pastel.



FIGURE 274 – Verdier d'Europe Mâle Agate Pastel. Photo JM. Eytorff.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Couronne. Joes. Moustaches.	Gris clair. Le reste de la tête est vert jaunâtre.
Dos.	Vert olive. Voile gris clair bien régulier.
Gorge. Poitrine. Flancs. Croupion.	Jaune verdâtre. Poitrine et flancs avec un léger voile gris.
Ventre.	Jaune verdâtre plus clair que la poitrine.
Ailes.	<u>Rémiges primaires</u> : Grises, et jaunes le long du vexille externe avec un liseré gris clair à l'extrémité. <u>Rémiges secondaires</u> : Grises, avec un large liseré gris très clair.
Couvertures.	<u>Grandes couvertures</u> : Gris argenté clair. Petites et moyennes couvertures : Jaune verdâtre.
Queue.	Deux premiers tiers des rectrices jaunes et dernier tiers gris avec un liseré gris clair sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
yeux.	Noirs.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur corne.

17.8.17 Verdier d'Europe Femelle Agate Pastel (*Chloris chloris chloris*)

Mutation Agate Pastel.



FIGURE 275 – Verdier d'Europe Femelle Agate Pastel. Photo JM. Eytorff.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Couronne.	Jaune verdâtre avec des stries gris clair.
Joues.	Jaune verdâtre lavées de gris clair.
Moustache.	Gris clair.
Dos.	Gris avec un dessin strié de gris clair bien visible.
Gorge. Poitrine.	Jaune verdâtre pâle avec un voile gris argenté léger.
Flancs.	Jaune verdâtre pâle avec un voile gris clair et un léger dessin.
Croupion.	Jaune verdâtre.
Ventre.	Légèrement plus clair que la poitrine.
Ailes.	<u>Rémiges primaires</u> : Grises, et jaunes le long du vexille externe avec un liseré gris clair à l'extrémité. <u>Rémiges secondaires</u> : Grises, avec un large liseré gris très clair.
Couvertures.	<u>Grandes couvertures</u> : Gris argenté clair. <u>Petites et moyennes couvertures</u> : Jaune verdâtre.
Queue.	Deux premiers tiers des rectrices jaunes et dernier tiers gris avec un liseré gris clair sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux.	Noirs.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur corne.

17.8.18 Verdier d'Europe Mâle et Femelle Isabelle Pastel (*Chloris chloris chloris*)

Mutation Isabelle Pastel.



FIGURE 276 – Verdier d'Europe Mâle Isabelle Pastel. Photo JM. Eytorff.

Dimorphisme sexuel : Mêmes caractéristiques que les mâles mais le pigment est moins lumineux. Les liserés jaunes des rémiges et des rectrices sont moins larges et plus ternes.

ATTENTION : Risque de confusion avec la variété Isabelle Satiné.

199

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Front. Lorums. Menton. Contours des yeux.	Masque jaune.
Région auriculaire. Vertex.	Jaunes avec un léger voile beige clair jusque dans la nuque.
Dos.	Jaunes avec un léger voile beige.
Poitrine. Flancs. Croupion.	Jaunes.
Ventre.	Blanc sale.
Ailes.	<u>Rémiges primaires</u> : Beiges avec un liseré jaune. <u>Rémiges secondaires</u> : Beige clair avec un liseré jaune. <u>Couvertures</u> : Jaunes.
Queue.	Beige avec les deux premiers tiers jaunes.
Yeux.	Isabelle.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

17.8.19 Verdier d'Europe Mâle et Femelle Brun Pastel (*Chloris chloris chloris*)

Mutation Brun Pastel.



FIGURE 277 – Verdier d'Europe Brun Pastel. Photo JM. Eytorff.

Dimorphisme sexuel : Mêmes caractéristiques que les mâles mais le pigment est plus foncé. Les liserés jaunes des rémiges et des rectrices sont moins larges et plus ternes.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Brun très clair.
Région auriculaire. Vertex. Front. Nuque.	Brun clair. Masque et sourcils jaune clair chez le mâle.
Dos.	Jaune clair voilé de brun léger.
Gorge. Poitrine. Flancs.	Jaune clair voilé de brun léger.
Ventre.	Beige crème.
Ailes.	Brun clair avec miroir jaune.
Couvertures.	Jaune voilé de brun clair.
Croupion.	Jaune.
Queue.	Brun clair liseré jaune.
Yeux.	Brun.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

ATTENTION : Risque de confusion avec la variété Isabelle.

200

200. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

17.8.20 Verdier d'Europe Ancestral Bec Jaune (*Chloris chloris chloris*)

Phénotype Ancestral Bec Jaune.



FIGURE 278 – Verdier d'Europe Ancestral Bec Jaune. Photo JM. Eytorff.

Aspect général de l'oiseau très lumineux. Donne une impression de douceur au plumage comme chez le Bouvreuil Githagines (*Bucanetes githagineus*)

En cas d'oiseau schimmel, le givrage blanc est remplacé par du jaune.

201

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Large, massive, avec le cou bien rempli. Front vert lumineux. Zone loreale et moustache gris-vert.
Joues.	Gris cendré avec incrustations vertes jaunâtres lumineuses.
Gorge. Épaules.	Vert jaunâtre très lumineux.
Dos.	Vert olive avec reflets brunâtres très lumineux.
Poitrine. Flancs.	Vert olive lumineux.
Ventre.	Jaune lumineux.
Ailes.	Grandes rémiges : Noir brunâtre avec vexille externe jaune vif. Rémiges secondaires : Grises avec un liseré noir brunâtre à l'extrémité.
Queue.	Rectrices jaunes à la base et noir brunâtre à l'extrémité avec un liseré gris le long du vexille externe. Les deux rectrices médianes sont noir brunâtre. Queue courte avec l'extrémité fourchue.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Couleur jaune doré, flammé de brun. Gros et conique.
Pattes. Doigts.	Couleur jaune doré. Jaune doré plus foncé sur la partie interne cornée.
Ongles.	Jaunes dorés.

17.8.21 Verdier d'Europe Brun Bec Jaune (*Chloris chloris chloris*)

Mutation Brun Bec Jaune.

Photo en
Attente

FIGURE 279 – Verdier d'Europe Brun Bec Jaune. Photo

202

202. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Large, massive, avec le cou bien rempli. Front brun lumineux. Zone loreale et moustache gris-brun.
Joues.	Gris cendré avec incrustations brunes jaunâtres lumineuses.
Gorge. Épaules.	Brun jaunâtre très lumineux.
Dos.	Brun très lumineux.
Poitrine. Flancs.	Brun lumineux.
Ventre.	Jaune lumineux.
Ailes.	Grandes rémiges : Noir brunâtre avec vexille externe jaune vif. Rémiges secondaires : Grises avec un liseré noir brunâtre à l'extrémité.
Queue.	Rectrices jaunes à la base et noir brunâtre à l'extrémité avec un liseré gris le long du vexille externe. Les deux rectrices médianes sont noir brunâtre. Queue courte avec l'extrémité fourchue.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Couleur jaune doré, flammé de brun. Gros et conique.
Pattes. Doigts.	Couleur jaune doré. Jaune doré plus foncé sur la partie interne cornée.
Ongles.	Jaunes dorés.

17.8.22 Verdier d'Europe Mâle Agate Bec Jaune (*Chloris chloris chloris*)

Mutation Agate Bec Jaune.



FIGURE 280 – Verdier d'Europe Mâle Agate Bec Jaune. Photo JM. Eytorff.

Remarque : Le mâle Agate bec jaune à l'apparence d'un oiseau intensif. Plus de traces de blanc remplacées par du jaune verdâtre ou du jaune gris est moins visible chez les mâles adultes.

203

203. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Vert jaune très lumineux.
Couronne. Joues. Moustaches.	Gris sur fond vert jaune très lumineux.
Gorge.	Vert jaune très lumineux.
Dos.	Vert jaune très lumineux avec léger voile gris bien régulier.
Poitrine. Flancs.	Vert jaune très lumineux avec un voile gris.
Ventre.	Vert jaune très lumineux.
Ailes.	<u>Grandes rémiges</u> : Gris foncé avec vexille externe jaune lumineux et liseré gris clair à l'extrémité. <u>Rémiges secondaires</u> : Gris foncé avec un large liseré gris clair.
Couvertures.	<u>Grandes couvertures</u> : Vert jaune. <u>Petites et moyennes couvertures</u> : Vert jaune lumineux.
Croupion.	Vert jaune lumineux.
Queue.	Deux premiers tiers des rectrices jaunes intense et dernier tiers gris foncé avec liseré gris clair.
Yeux.	Noirs.
Bec.	Jaune doré.
Pattes. Doigts.	Couleur jaune doré. Jaune plus foncé sur la partie cornée.
Ongles.	Jaune doré.

17.8.23 Verdier d'Europe Femelle Agate Bec Jaune (*Chloris chloris chloris*)

Mutation Agate Bec Jaune.

Photo en

Attente

FIGURE 281 – Verdier d'Europe Femelle Agate Bec Jaune.

Remarque : L'apparence de la femelle fait penser à un mâle. Phénotype très différent d'une femelle Agate classique. L'apparence est celle d'un sujet intensif. le givrage blanc est remplacé par du jaune

Défauts :

- 1) Présence de brun dans le manteau (le facteur bec jaune fait ressortir le brun si il est présent),
- 2) Rémiges secondaires brunes,
- 3) Ongles couleur chair (si bec mandibule supérieure jaune = porteur bec jaune),
- 4) Pattes de couleur chair (si bec mandibule supérieure jaune = porteur bec jaune),
- 5) Couleur du bec pas assez jaune.

204

204. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Couronne vert jaune lumineux striée de gris. Joues vert jaune très lumineux lavées de gris. Moustaches grises sur fond vert jaune très lumineux.
Gorge.	Vert jaune très lumineux.
Dos.	Vert jaune lumineux avec dessin strié gris bien visible.
Poitrine. Flancs.	Vert jaune très lumineux avec un voile gris.
Ventre.	Vert jaune très lumineux.
Ailes.	<u>Grandes rémiges</u> : Gris foncé avec vexille externe jaune et liseré gris clair à l'extrémité. <u>Rémiges secondaires</u> : Gris foncé avec un large liseré gris brun.
Couvertures.	<u>Grandes couvertures</u> : Gris brun. <u>Petites et moyennes couvertures</u> : Vert jaune lumineux lavé de gris.
Croupion.	Vert jaune lumineux voilé de gris.
Queue.	Deux premiers tiers des rectrices jaune intense et dernier tiers gris foncé avec liseré gris clair.
Yeux.	Noirs.
Bec.	Jaune doré.
Pattes. Doigts.	Couleur jaune doré. Jaune plus foncé sur la partie cornée.
Ongles.	Jaune doré.

17.8.24 Verdier d'Europe Mâle Isabelle Bec Jaune (*Chloris chloris chloris*)

Mutation Isabelle Bec Jaune.



FIGURE 282 – Verdier d'Europe Mâle Isabelle Bec Jaune. Photo JM. Eytorff.

Remarque : Le mâle Isabelle Bec Jaune ne présente plus de blanc, donnant un aspect jaune doré intensif à l'oiseau. Le voile beige est moins visible chez les mâles adultes. En cas d'oiseau schimmel, le givrage blanc est remplacé par du jaune donnant un aspect intensif à l'oiseau.

205

205. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Jaune doré très lumineux.
Couronne. Joues. Moustaches.	Beiges sur fond jaune doré lumineux.
Gorge.	Jaune doré très lumineux.
Dos.	Jaune doré très lumineux avec léger voile beige bien réparti.
Poitrine. Flancs.	Jaune doré très lumineux avec un voile beige.
Ventre.	Jaune doré lumineux jusqu'à l'anus.
Ailes.	<u>Grandes rémiges</u> : Brunes avec vexille externe jaune lumineux et liseré jaune beige à l'extrémité. <u>Rémiges secondaires</u> : Brunes avec un large liseré jaune doré beige.
Couvertures.	<u>Grandes couvertures</u> : Beiges sur fond jaune doré. <u>Petites et moyennes couvertures</u> : Jaunes dorées.
Croupion.	Jaune doré très lumineux.
Queue.	Deux premiers tiers des rectrices jaunes dorés et dernier tiers brun avec liseré beige à l'extrémité.
Yeux.	Brun foncé (yeux isabelle).
Bec.	Couleur jaune doré.
Pattes. Doigts.	Couleur jaune doré. Jaune plus foncé sur la partie interne cornée.
Ongles.	Jaunes dorés.

17.8.25 Verdier d'Europe Femelle Isabelle Bec Jaune (*Chloris chloris chloris*)

Mutation Isabelle Bec Jaune.



FIGURE 283 – Verdier d'Europe Femelle Isabelle Bec Jaune. Photo JM. Eytorff.

Remarque : L'apparence de la femelle fait penser à un mâle. Phénotype très différent d'une femelle isabelle classique. L'apparence est celle d'un sujet intensif. Le givrage blanc est remplacé par du jaune.

206

206. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Jaune doré très lumineux avec incrustations beiges.
Couronne. Joues. Moustaches.	Beiges sur fond jaune doré lumineux
Gorge.	Jaune doré très lumineux.
Dos.	Jaune doré lumineux avec léger voile beige bien réparti et dessin striés.
Poitrine. Flancs.	Jaune doré lumineux avec un voile beige.
Ventre.	Jaune doré très lumineux.
Ailes.	<u>Grandes rémiges</u> : Brun beige avec vexille externe jaune doré et liseré beige clair à l'extrémité. <u>Rémiges secondaires</u> : Brun beige.
Couvertures.	<u>Grandes couvertures</u> : Brun beige sur fond jaune lumineux. <u>Petites et moyennes couvertures</u> : Jaunes dorées lavées de beige.
Croupion.	Jaune doré très lumineux.
Queue.	Deux premiers tiers des rectrices jaune doré et dernier tiers brun avec liseré beige à l'extrémité.
Yeux.	Brun foncé (yeux isabelle).
Bec.	Couleur jaune doré.
Pattes. Doigts.	Couleur jaune doré. Jaune plus foncé sur la partie interne cornée.
Ongles.	Jaunes dorés.

17.8.26 Verdier Maltais (Major) (*Chloris chloris chloris*)

Phénotype ancestral.



FIGURE 284 – Verdier Maltais (Major) Mâle et Femelle.

Taille du corps : Aussi grand que possible, minimum 16,5 cm.

Zone du plumage	Type et Généralités
Bec.	Le bec doit compléter la forme de la tête.
Tête.	Une tête large, bien arrondie et bien élevée, un front bien visible, un cou bien rempli.
Corps.	De profil, l'oiseau doit présenter une rondeur harmonieuse partant au-dessous de la gorge jusqu'au bas ventre. De même, on cherche une courbe convexe de la base du cou au croupion. Devrait se tenir bien relevé sur le perchoir à un angle de 45 degrés approximativement.
Cuisses.	Pas visible.
Ailes.	Serrées contre le corps, couvrant les sus-caudales. Ne doivent pas se croiser ou pendre.
Queue.	Relativement courte, serrée et distinctement fourchue.

Taille du corps : Aussi grand que possible, minimum 16,5 cm.

Zone du plumage	Mâles : Couleurs et Marques.
Bec.	Couleur chair claire.
Yeux.	Brun foncé.
Tête.	➤ Un front vert, les lores foncés. ➤ La raie sourcilière d'un vert plus clair. ➤ La calotte et la nuque brun-verdâtre. ➤ La moustache doit être plus foncée et bien évidente. ➤ La plage auriculaire grise.
Dos.	Brun verdâtre avec des marques brunes plus foncées.
Croupion.	Vert sans contraste avec le manteau. les sus-caudales doivent aller d'un vert olive à un brun grisâtre progressivement.
Bas-ventre.	➤ La gorge et la poitrine doivent être d'un vert riche et lumineux, aussi clair et solide que possible, se fondant dans le jaune du ventre, le blanc du bas-ventre restant au minimum. ➤ Les sous-caudales jaunes se fondent dans un vert olive progressivement.
Flancs.	Brun verdâtre.
Ailes.	<u>Les scapulaires</u> : Vert brun se mariant au manteau. <u>Les rémiges primaires</u> : Doivent montrer des barres jaune riche, formant une longue marque sur l'extrémité inférieure de l'aile repliée. <u>Les rémiges secondaires</u> : Noires avec des bordures grises, plus larges et brunâtres que les tertiaires. <u>Les petites sus-alaires</u> : Vertes. <u>Les moyennes sus-alaires</u> : Vert olive. <u>Les tectrices primaires</u> : Grises brunâtres. <u>L'allule</u> : Jaune vif.
Queue.	Noire montrant des tâches jaunes vif et une frange extérieure grise. Les plumes du centre de la queue seront noires avec une bordure verte.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair foncé.

Zone du plumage	Femelles : Couleurs et Marques.
Type.	Comme pour le mâle.
Couleur.	Des teintes brunâtres et verdâtres vifs. Le jaune des ailes et de la queue ne sera pas aussi étendue que pour le mâle.
Bec.	Couleur chair claire.
Yeux.	Brun foncé.
Tête.	➤ Le front teinté de vert. ➤ Le supercilium (sourcil) est plus clair. ➤ La calotte et la nuque sont brunes avec des marques plus foncées. ➤ La moustache, d'un brun plus foncé, doit être bien visible. ➤ La plage auriculaire est grise.
Dos.	Brun avec des marques plus foncées. Les marques sur le dos doivent être alignées, se rétrécissant vers la tête et allant jusqu' au croupion.
Croupion.	Vert, les sus-caudales vert olive tirant vers le brun.
Bas-ventre.	➤ La gorge brun grisâtre avec une teinte verte. ➤ La poitrine doit être de couleur brun clair avec une teinte verte et des marques plus foncées. ➤ Les marques sur la poitrine sont plus larges et moins évidentes. ➤ Le ventre est vert allant vers le blanc autour du bas ventre. ➤ Les sous caudales grises avec une légère teinte brune.
Flancs.	Bruns.
Ailes.	<u>Les scapulaires</u> : Brunes. <u>Les rémiges primaires</u> : Brun noirâtre. Une bordure jaune, plus mince et moins vive que chez le mâle. <u>Les rémiges secondaires</u> : Brun noirâtre avec des bordures brun grisâtres. <u>Les petites sus-alaires</u> : Vert olive. <u>Les moyennes sus-alaires</u> : Vert olive à brun. <u>Les tectrices primaires</u> : Noires avec une bordure verte. <u>L'allule</u> : Brun noirâtre avec une bordure jaune.
Queue.	Noire avec une bordure extérieure jaune. Les plumes du centre de la queue seront brun noirâtre.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair foncé.

Note	Généralités des Verdiers Maltais.
Taille.	Même si on préfère les exemplaires plus grands, la taille ne devrait jamais nuire à la qualité de la couleur et de la forme. Si le standard encourage la plus grande taille possible, la sélection pourrait mener à la présence de nombreux défauts : le plumage, une fertilité diminuée, une immunité affaiblie. Aucun aviculteur ne devrait encourager de tels défauts par l'élevage d'oiseaux portant ces traits.
Type.	La tête ne devrait pas être angulaire ou « en forme de boîte ». Le front doit être bien marqué, avec une bonne montée à partir de la mandibule supérieure donnant un front bien marqué. Le crâne devrait être large dans sa rondeur supérieure ainsi que vers le cou. Le corps doit être compact et rond donnant une apparence robuste et arrondie.
Mâles. Couleurs et Marques.	Des teintes brunâtres sur la tête, le dos et les flancs ne seront pas considérées fautives, mais l'oiseau qui présente un vert plus vif sera considéré supérieur. Les oiseaux schimmels montrent moins de couleur que les intensifs. Il est donc moins facile pour un schimmel de gagner par rapport aux meilleurs intensifs même si il s'avère que les schimmels gagnent à force de supériorité de type et de taille.
Femelles. Couleurs et Marques.	Le blanc autour du bas ventre est plus étendu par rapport à celui du mâle, s'étendant souvent sur le ventre. Les femelles bien jaunes montreront beaucoup de couleur sur le poitrail et ceci, associé à de bonnes performances sur le plan taille et type, devrait aboutir à des succès. Des femelles schimmels feront souvent mieux que des jaunes dans leur classe mais seront battues par un mâle jaune quand il s'agit d'un concours pour le meilleur verdier.
Notes Générales.	L'oiseau doit montrer une certaine fierté et se tenir bien positionné sur son perchoir, regardant fixement les visiteurs. Au cas où les intensifs et les schimmels sont jugés dans la même classe, le plus jaune gagnera. Si pourtant le schimmel déjà bien coloré est supérieur comme type, il prendra la tête.

Défauts	Défauts des Verdiers Maltais.
Type.	Un crâne étroit. Des yeux mal placés. Un bec trop grand ou trop petit. A éviter surtout un oiseau qui présente l'apparence d'une ligne droite du haut de la tête jusqu'à la queue, forme que l'on compare à « une piste de ski » ou l'oiseau est « long ». Cette ligne droite ne peut jamais permettre la forme arrondie que l'on recherche pour cet oiseau. <u>Pire encore</u> : Un dos creux. Difformité, oiseau en forme de poire, un surpoids au niveau de la poitrine ou au niveau du bas ventre résultant d'une mauvaise posture. L'oiseau ne devrait pas se tenir couché ou accroupi sur le perchoir. Mauvais port des ailes.
Mâles. Couleurs et Marques.	Inharmonie des couleurs : Une décoloration ou bien une présence trop forte de gris donnant une apparence trop foncée. Une présence de brun sur le poitrail et le ventre.
Femelles.	Un blanc trop étendu donnant l'impression d'un oiseau pâle.
Défauts Généraux.	Un oiseau qui se présente faiblement, peu dressé, pas confiant.




FIGURE 285 – Posture du Verdier Maltais (Major).

17.9 Bouvreuils

Bouvreuils

17.9.1 Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula europaea*)

Taille du corps : 15 cm.



FIGURE 286 – Bouvreuil pivoine Mâle. Sans trace de rouge sur le dos.
Photo H. Heinzel.



FIGURE 287 – Bouvreuil pivoine Femelle. Photo H. Heinzel.

17.9.2 Bouvreuil ponceau (*Pyrrhula pyrrhula pyrrhula*)

Taille du corps : 18 cm.

Remarques :

- Moins coloré que *europaea*.
- Sans trace de rouge sur le dos.
- Présence de lunules de queue.



FIGURE 288 – Bouvreuil ponceau Mâle. Photo H. Heinzel.

17.9.3 Bouvreuil pivoine ibérique (*Pyrrhula pyrrhula iberiae*)

Taille du corps : 13,5 cm.

Remarques :

- Plus coloré que les deux autres sous-espèces.
- Peut présenter des traces rouges sur le manteau.



FIGURE 289 – Bouvreuil pivoine ibérique Mâle. Photo H. Heinzel.



FIGURE 290 – Bouvreuil pivoine ibérique Mâle. Photo E. Gomez.



FIGURE 291 – Bouvreuil pivoine ibérique Femelle. Photo E. Gomez.

17.9.4 Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*)

Phénotype ancestral.



FIGURE 292 – Bouvreuil pivoine Mâle. Photo P. Rocher.



FIGURE 293 – Bouvreuil pivoine Femelle. Photo P. Rocher.

Taille du corps : 13,5 cm pour le Bouvreuil pivoine.
18 cm pour le Bouvreuil ponceau.

Remarque : Dimorphisme sexuel : Mêmes caractéristiques que le mâle avec les couleurs plus ternes. De plus, chez la femelle, le dos est gris brunâtre et la poitrine est gris brunâtre teinté de beige.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Calotte et contours du bec noirs. Nuque courte et bien remplie.
Dos. Épaules.	Gris bleuâtre. Sans trace de rouge, sauf ssp iberiae.
Gorge. Poitrine. Flancs.	Couleur rouge régulièrement répartie et délimitée par la calotte noire en-dessous des yeux.
Abdomen. Sous-caudales.	Blancs.
Rémiges.	Rémiges primaires et secondaires : Noires à reflets bleuâtres. Bande alaire gris blanc qui part du bord externe de l'aile et s'élargit vers le dos. Deux petites plumules rouges garnissent l'extrémité des rémiges tertiaires.
Croupion.	Blanc.
Queue.	Noir brillant.
Yeux.	Noirs.
Bec.	Noir, court et très bombé avec l'extrémité de la mandibule supérieure légèrement courbée.
Pattes. Doigts.	Noirs.
Ongles.	Noirs.

Défauts Généraux des Bouvreuils :

- 1) Calotte dentelée dans la nuque,
- 2) Bavette irrégulière sous le menton,
- 3) Reflets blanchâtres en dessous des yeux,
- 4) Couleur de la poitrine irrégulière,
- 5) Barre alaire n'allant pas jusqu'au bord de l'aile ou irrégulière,
- 6) Plumes rouges du dos absentes,
- 7) Creux dans la nuque,
- 8) Cassure à la nuque,
- 9) Trop étroit des épaules,
- 10) **Attention aux tailles intermédiaires.**

Couleur = Tête / Rémiges / Rectrices secondaires de la même couleur et présence de la flamme rouge chez les mâles et les femelles.

La présence de lunules de queue chez le Bouvreuil Ponceau n'est pas fautive.

17.9.5 Bouvreuil pivoine Mâle Brun (*Pyrrhula pyrrhula*)
Mutation Brune.



FIGURE 294 – Bouvreuil pivoine Mâle Brun. Photo P. Rocher.

Remarque : Les rectrices ont leur partie externe brun très foncé à reflets métalliques et leur partie interne brune, sauf pour les deux médianes entièrement brun foncé à reflets métalliques. Vue de dessous, la queue apparaît brune.

211

211. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 13,5 cm pour le Bouvreuil pivoine. 18 cm pour le ponceau.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Calotte brun très foncé tirant sur le noir.
Dos.	Gris clair avec reflets beiges.
Épaules.	Gris clair.
Poitrine. Gorge. Flancs.	Roses.
Ventre.	Tirant sur le blanc.
Rémiges.	<u>Rémiges primaires</u> : Brunes. <u>Rémiges secondaires</u> : Brun très foncé tirant sur le noir. Barre alaire gris clair.
Couvertures.	Brun très foncé tirant sur le noir.
Croupion.	Blanc.
Queue.	Brun très foncé avec reflets métalliques.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Mandibule supérieure brune. Mandibule inférieure couleur chair.
Pattes. Doigts.	Brun très clair.
Ongles.	Bruns.

Défauts rencontrés : Décoloration des rémiges et rectrices.

Défauts classiques des bouvreuils en mâles et femelles :

- Calotte dentelée dans la nuque,
- Bavette irrégulière sous le menton,
- Reflets blanchâtre en dessous des yeux,
- Couleur de la poitrine irrégulière,
- Barre alaire n'allant pas jusqu'au bord de l'aile ou irrégulière,
- Plumes rouges du dos absentes,
- Creux dans la nuque. Cassure à la nuque. Trop étroit des épaules.
- Attention à la différence de tonalité du bec car de plus en plus ont le bec foncé comme chez le pastel,

➤ Défauts habituels des bouvreuils : Si les femelles bouvreuils sont colorées elles seront sanctionnées (pas de rouge chez les femelles).

Attention à la sous espèce ibéricus qui a du rouge dans le dos, l'écaillage rouge dans le dos est normal pour cette espèce. Chez le blanc (pas de panachage plaques) sinon ils seront pénalisés (déclassés).

17.9.6 Bouvreuil pivoine Femelle Brune (*Pyrrhula pyrrhula*)
Mutation Brune.



FIGURE 295 – Bouvreuil pivoine Femelle Brune. Photo KBOF.

Taille du corps : 13,5 cm pour le Bouvreuil pivoine. 18 cm pour le ponceau.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Calotte brun foncé tirant sur le noir. Joues beige brun.
Dos.	Beige brun lavé de gris.
Épaules.	Beige brun lavé de gris.
Poitrine. Gorge. Flancs.	Roses. Beige brun très uniforme.
Ventre.	Clair, tirant sur le blanc.
Rémiges.	<u>Rémiges primaires</u> : Brunes. <u>Rémiges secondaires</u> : Brun très foncé tirant sur le noir. Barre alaire gris beige.
Couvertures.	Brun très foncé tirant sur le noir.
Croupion.	Blanc.
Queue.	Brun très foncé avec reflets métalliques.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Mandibule supérieure brune. Mandibule inférieure couleur chair.
Pattes. Doigts.	Brun très clair.
Ongles.	Bruns.

17.9.7 Bouvreuil pivoine pastel (*Pyrrhula pyrrhula*)

Mutation pastel.



FIGURE 296 – Bouvreuil pivoine Mâle Pastel. Photo D. Vettese.

Remarque : Dimorphisme sexuel : Pour les femelles, mêmes caractéristiques que le mâle avec les couleurs du manteau et de la poitrine beige clair.

213

213. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.



FIGURE 297 – Bouvreuil pivoine Femelle Pastel. Photo UOF Chartier.

Taille du corps : 13,5 cm pour le Bouvreuil pivoine. 18 cm pour le ponceau.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Calotte brun noirâtre. Joues de couleur rosée.
Dos. Épaules.	Gris pastel (gris beige).
Poitrine.	Rose.
Abdomen. Sous-caudales.	Blancs.
Rémiges.	<u>Rémiges primaires et secondaires</u> : Gris foncé. <u>Barre alaire</u> : Gris beige clair. Taches roses sur des rémiges tertiaires.
Croupion.	Blanc.
Queue.	Gris foncé avec sus-caudales plus claires.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Brun noirâtre.
Pattes. Doigts.	Brun foncé.
Ongles.	Foncés.

17.9.8 Bouvreuil pivoine Mâle Brun Pastel (*Pyrrhula pyrrhula*)
Mutation brun pastel.



FIGURE 298 – Bouvreuil pivoine Mâle Brun Pastel. Photo D. Vettese.



FIGURE 299 – Bouvreuil pivoine Mâle Brun Pastel. Photo D. Vettese.

Taille du corps : 13,5 cm pour le Bouvreuil pivoine. 18 cm pour le ponceau.

Zone du plumage	Couleur
Front. Calotte. Nuque. Lorums. Menton.	Brun noisette chaud. Léger voile rouge au vertex toléré.
Dos.	Gris beige très clair.
Poitrine. Gorge. Flancs.	Rouge rose.
Ventre.	Région anale blanche.
Rémiges.	Rémiges primaires : Beige clair. Rémiges secondaires et tertiaires : Brun beige. Bande alaire claire.
Croupion.	Blanc.
Queue.	Brun beige.
Yeux.	Bruns foncés.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Bruns.

17.9.9 Bouvreuil pivoine Femelle Brune Pastel (*Pyrrhula pyrrhula*)
Mutation brun pastel.



FIGURE 300 – Bouvreuil pivoine Femelle Brune Pastel. Photo UOF.

215

Taille du corps : 13,5 cm pour le Bouvreuil pivoine. 18 cm pour le ponceau.

Zone du plumage	Couleur
Front. Calotte. Nuque. Lorums. Menton.	Brun noisette chaud.
Dos.	Beige.
Poitrine. Gorge. Flancs.	Beige clair soutenu avec un peu de brun.
Ventre.	Région anale blanche.
Rémiges.	<u>Rémiges primaires</u> : Beige clair. <u>Rémiges secondaires et tertiaires</u> : Brun beige. Bande alaire claire.
Croupion.	Blanc.
Queue.	Brun beige.
Yeux.	Bruns foncés.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Bruns.

17.9.10 Bouvreuil pivoine blanc (*Pyrrhula pyrrhula*)

Mutation blanche.



FIGURE 301 – Bouvreuil pivoine Blanc. Photo KBOF.

Taille du corps : 13,5 cm pour le Bouvreuil pivoine. 18 cm pour le ponceau.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Blanche.
Dos. Épaules.	Blancs.
Poitrine. Gorge. Flancs.	Chez le mâle rose saumon clair. Chez la femelle blanche.
Ventre.	Blanc.
Abdomen. Sous-caudales.	Blancs.
Ailes.	Rémiges blanches deux couvertures rose saumon.
Croupion.	Blanc.
Queue.	Blanche.
Yeux.	Noirs.
Bec.	Couleur chair
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Blancs.

17.9.11 Bouvreuil pivoine jaune (*Pyrrhula pyrrhula*)

Mutation jaune.




FIGURE 302 – Bouvreuil pivoine Mâle Jaune. Photo R. Driesmans.

Dimorphisme sexuel : La femelle a les mêmes caractéristiques que le mâle mais les couleurs sont plus ternes.

Remarque : Cette mutation a été combinée aux autres variétés existantes.

217

217. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 13,5 cm pour le Bouvreuil pivoine. 18 cm pour le ponceau.

Zone du plumage	Couleur
Calotte. Tour du bec.	Noirs jusqu'en dessous des yeux.
Dos. Épaules.	Gris bleuâtre.
Poitrine. Gorge. Flancs.	Couleur jaune verdâtre régulièrement répartie.
Bas de l'abdomen. Sous-Caudales. Croupion.	Blancs.
Ailes.	Rémiges primaires et secondaires : Noires à reflets bleuâtres. Bande alaire gris blanc à partir du bord externe de l'aile en s'élargissant vers le dos. Deux plumules rouges à l'extrémité des rémiges tertiaires.
Queue.	Rectrices noir brillant.
Yeux.	Noirs.
Bec.	Noir, court et très bombé avec l'extrémité de la mandibule supérieure légèrement courbée.
Pattes. Doigts.	Noirs.
Ongles.	Noirs.

17.9.12 Bouvreuil pivoine Mâle brun pastel jaune (*Pyrrhula pyrrhula*)

Mutation brun pastel jaune.



FIGURE 303 – Bouvreuil pivoine Mâle brun pastel jaune.

Remarque : Même caractéristique que le brun pastel mais avec la face ventrale jaune.

218

218. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 13,5 cm pour le Bouvreuil pivoine. 18 cm pour le ponceau.

Zone du plumage	Couleur
Front. Calotte. Nuque. Lorums. Menton.	Brun noisette chaud. Léger voile rouge au vertex toléré.
Dos.	Gris beige très clair.
Poitrine. Gorge. Flancs.	Rouge rose.
Ventre.	Face ventrale jaune. Région anale blanche.
Rémiges.	<u>Rémiges primaires</u> : Beige clair. <u>Rémiges secondaires et tertiaires</u> : Brun beige. Bande alaire claire.
Croupion.	Blanc.
Queue.	Brun beige.
Yeux.	Bruns foncés.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Bruns.

17.9.13 Bouvreuil pivoine Mâle Topaze (*Pyrrhula pyrrhula*)
Mutation topaze.



FIGURE 304 – Bouvreuil pivoine Mâle Topaze. Photo KBOF.

219

Taille du corps : 13,5 cm pour le Bouvreuil pivoine. 18 cm pour le ponceau.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Couleur corne, court et massif.
Yeux.	Rouge foncé.
Tête.	<u>Calotte</u> : Gris foncé avec un minimum de rouge dans la calotte. <u>Joues</u> : orange rouge.
Dos.	Gris bleu clair sans voile rouge.
Poitrine. Flancs. Gorge.	Orange rouge.
Ventre.	Orange rouge, blanc dans la partie inférieure.
Ailes.	Gris foncé, bien réparti avec une barre alaire plus claire partant du bord de l'aile. Flamme sur la dernière rémige tertiaire.
Queue.	Gris foncé en harmonie avec les rémiges.
Croupion.	Blanc.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur corne.

17.9.14 Bouvreuil pivoine Femelle Topaze (*Pyrrhula pyrrhula*)
Mutation topaze.



FIGURE 305 – Bouvreuil pivoine Femelle Topaze. Photo D. Vettese.

Taille du corps : 13,5 cm pour le Bouvreuil pivoine. 18 cm pour le ponceau.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Couleur corne, court et massif.
Yeux.	Rouge foncé.
Tête.	<u>Calotte</u> : Gris foncé. <u>Joues</u> : Gris brun clair.
Dos.	Gris-brun foncé sans voile rouge.
Poitrine.	Gris brun clair.
Flancs.	De même couleur que la poitrine.
Ventre.	Gris brun clair, blanc dans la partie inférieure.
Ailes.	Gris foncé, bien réparti avec une barre alaire plus claire partant du bord de l'aile. Flamme sur la dernière rémige tertiaire.
Queue.	Gris en harmonie avec les rémiges.
Croupion.	Blanc.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur corne.

17.10 Gros bec casse-noyaux

Gros bec casse-noyaux

17.10.1 Gros bec casse-noyaux (*Coccothraustes coccothraustes*)



FIGURE 306 – Gros bec casse-noyaux. Mâle et Femelle. Photo H. Heinzel.

Défauts :

- 1) Bavette irrégulière,
- 2) Couvertures des ailes irrégulières et incomplètes,
- 3) Couleur de la poitrine marbrée,
- 4) Flancs trop clairs,
- 5) Bord du collier gris irrégulier,
- 6) Cercle oculaire incomplet,
- 7) Bec écaillé,
- 8) Faucilles à l'extrémité des rémiges irrégulières,
- 9) Blessures au front.

17.10.2 Gros bec casse-noyaux Mâle (*Coccothraustes coccothraustes*)
Phénotype ancestral



FIGURE 307 – Gros bec casse-noyaux. Mâle. Photo P. Rocher.



FIGURE 308 – Gros bec casse-noyaux. Mâle.

Taille du corps : 18 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	<u>En hiver</u> : De couleur corne pâle. <u>En été</u> : De couleur bleu acier.
Yeux.	Gris brunâtre. <u>Cercles oculaires</u> : Brun rougeâtre.
Tête.	Le dessus de la tête est brun. Clair sur le front et foncé sur l'occiput. Le liseré frontal, les lorums, le menton et le tour du bec sont noirs. La région auriculaire et les joues sont de couleur brun jaunâtre. Le bas des joues et les parties inférieures du cou sont de couleur gris clair.
Dos.	Le dos, le manteau et les scapulaires sont de couleur brun foncé. Le bas du dos est brun grisâtre. Le croupion et les sus caudaux sont de couleur brun jaunâtre.
Gorge.	<u>Menton et Gorge</u> : Noir avec un léger liseré très pâle autour de la bavette (le minimum sera le meilleur).
Poitrine.	Gris brunâtre, pâle lavé de rose.
Flancs.	Brun grisâtre, plus foncés que la poitrine.
Ventre.	Gris blanchâtre avec le sous caudale blanc.
Ailes.	<u>Les rémiges primaires et secondaires</u> sont noires avec des reflets métalliques. L'extrémité des rémiges primaires internes et des rémiges secondaires externes sont en forme de faucille. <u>Les grandes couvertures alaires</u> sont blanches et forment une barre alaire.
Queue.	Courte. Les rectrices médianes sont rousses et les rectrices externes sont noires avec une extrémité blanche. Ceci forme une bande blanche à l'extrémité de la queue.
Pattes. Doigts.	De couleur brun chair.
Ongles.	Brun foncé.

17.10.3 Gros bec casse-noyaux Femelle (*Coccothraustes coccothraustes*)
Phénotype ancestral



FIGURE 309 – Gros bec casse-noyaux. Femelle. Photo P. Malburet.

La femelle a les mêmes caractéristiques que le mâle, mais les teintes sont plus pâles et plus grises.

L'extrémité de la queue de la femelle est moins blanche que chez du mâle.

222

222. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

17.11 Roselin githagine

Roselin githagine

17.11.1 Roselin githagine (*Rhodopechys githaginea*)



FIGURE 310 – Roselin githagine Mâle Plumage Nuptial. Photo H. Heinzel.



FIGURE 311 – Roselin githagine Femelle Plumage Nuptial. Photo H. Heinzel.

17.11.2 Roselin githagine (*Rhodopechys githaginea*)

Phénotype ancestral



FIGURE 312 – Roselin githagine Mâle Plumage Hivernal. Photo E. Gomez.

Défauts :

- 1) Plumage désordonné,
- 2) Ailes croisées ou pendantes,
- 3) Queue étalée.

223

223. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 12,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Orangé, court, puissant, assez large à la base.
Yeux.	Noirs.
Tête.	Assez étroite, faiblement arrondie, de forme élégante. <u>Cou</u> : Assez long. <u>Nuque</u> : Marquée Couleur de la tête : Gris-argenté.
Dos.	Gris-brunâtre.
Poitrine.	Gris, avec léger reflet rose lie de vin.
Flancs.	Du même gris que la poitrine.
Ventre.	Comme la poitrine, sauf la zone anale est gris clair.
Ailes.	Longues et fines. <u>Rémiges primaires</u> : Gris foncé. <u>Rémiges secondaires</u> : Gris-brun. <u>Couvertures</u> : Gris-brun. Le vexille externe des rémiges et des couvertures porte un étroit liseré clair.
Queue.	De longueur moyenne, légèrement échancrée. <u>Rectrices</u> : Gris foncé, bordées d'un liseré clair.
Pattes.	Assez longues, fines et de couleur chair.
Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Gris-beige.
Forme Générale.	Oiseau de forme élégante et fine.



FIGURE 313 – Roselin githagine Femelle Plumage Hivernal. Photo E. Gomez.
Remarque : La femelle est plus terne et le bec est plus clair.

17.11.3 Roselin cramoisi Mâle (*Carpodacus erythrinus*)

Phénotype ancestral



FIGURE 314 – Roselin cramoisi Mâle. Photo H. Heinzel.

Taille du corps : 13-13,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Brun.
Yeux.	Bruns.
Tête.	<u>Couronne et Nuque</u> : Rouge carmin. <u>Joues</u> : Brunes avec un voile rose.
Dos.	Brun voilé de rose.
Gorge.	Rouge carmin.
Poitrine.	Rouge carmin se transformant en rouge rose vers le ventre.
Flancs.	De beige à rose.
Ventre.	beige.
Ailes.	<u>Grandes rémiges</u> : Brunes foncées. <u>Rémiges secondaires</u> : Brunes foncées. <u>Petites couvertures</u> : Brunes foncées.
Croupion.	Rouge carmin.
Queue.	Brunes foncées.
Pattes.	brunes.
Doigts.	Bruns.
Ongles.	Bruns.

17.11.4 Roselin cramoisi Femelle (*Carpodacus erythrinus*)

Phénotype ancestral



FIGURE 315 – Roselin cramoisi Femelle. Photo H. Heinzel.

225

225. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 13-13,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Brun.
Yeux.	Bruns.
Tête.	<u>Couronne et Nuque</u> : Brun tirant sur le beige et strié de brun. <u>Joues</u> : Brunes beiges.
Dos.	Brun et strié.
Gorge.	Beige.
Poitrine.	Beige strié de brun.
Flancs.	Beige strié de brun.
Ventre.	beige.
Ailes.	<u>Grandes rémiges</u> : Brunes foncées avec le vexille externe beige. <u>Rémiges secondaires</u> : Brunes foncées. <u>Petites couvertures</u> : Brunes foncées avec un liseré beige.
Croupion.	Jaune orangé.
Queue.	Brunes foncées avec le vexille externe beige.
Pattes.	brunes.
Doigts.	Bruns.
Ongles.	Bruns.

17.12 Durbec des sapins

Durbec

17.12.1 Durbec des sapins (*Pinicola enucleator*)



FIGURE 316 – Durbec des sapins Mâle et Femelle. Photo H. Heinzel.



FIGURE 317 – Durbec des sapins Mâle en 1ère année. Photo H. Heinzel.

17.12.2 Durbec des sapins Mâle (*Pinicola enucleator*)

Phénotype ancestral



FIGURE 318 – Durbec des sapins Mâle Adulte. Photo P. Rocher.

Taille du corps : 20 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Gris noir, puissant. Mandibule supérieure bombée. L'extrémité courbée vers le bas en forme de croc.
Yeux.	Noirs.
Tête.	Assez étroite et plate, rose carmin, reflets gris noirâtre sur la zone loreale et oculaire.
Cou.	Encolure large et puissante, nuque peu marquée, rose carmin.
Dos.	Large, rose carmin, marqué d'un écaillage gris noirâtre très régulier.
Gorge. Poitrine.	Entièrement rose carmin.
Flancs.	Étroite bande gris légère soulignant l'aile.
Ventre.	Le rose de la poitrine se dégrade en gris blanchâtre, plus clair sur la zone anale.
Ailes.	<u>Rémiges primaires</u> : Noirâtres, portant un fin liseré gris sur le vexille. <u>Rémiges secondaires</u> : Noirâtres, largement liserées de blanc, surtout vers l'extrémité. <u>Couvertures</u> : Noires avec bordure blanche, formant une double barre alaire très distincte.
Croupion.	Rose carmin.
Queue.	Assez longue et échancrée. <u>Rectrices</u> : Noirâtres, portant un très faible liseré gris brun.
Pattes. Doigts.	Gris-noir.
Ongles.	Gris-noir.

Remarque : La couleur rose carmin ne s'exprime qu'à partir de la 2^{ème} année.
En première année la couleur est orange plus ou moins intense.

17.13 Bec croisé

Bec croisé

17.13.1 Bec croisé des sapins (*Loxia curvirostra*)

Remarque : En première année la couleur des jeunes mâles peut être moins intensive.



FIGURE 319 – Bec croisé des sapins Mâle Adulte. Photo animalia.bio.

Défauts :

- 1) Couleur de la poitrine irrégulière,
- 2) Extrémité du bec cassé,
- 3) Dessin du sous-caudale irrégulier,
- 4) Dessin des joues irrégulier,
- 5) Couleur d'ensemble tachetée,
- 6) Stries entrecoupée surtout chez la femelle.

227

227. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

17.13.2 Bec croisé des sapins Mâle (*Loxia curvirostra*)

Phénotype ancestral



FIGURE 320 – Bec croisé des sapins Mâle. Photo UOF.



FIGURE 321 – Bec croisé des sapins Mâle. Photo animalia.bio.

Taille du corps : 16,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Brun gris foncé et croisé complètement. Racine de la mandibule inférieure plus claire. Les mandibules peuvent croisées d'un côté ou l'autre du bec.
Yeux.	Brun foncé.
Tête.	Front, vertex et nuque : Sont de couleur rouge plus ou moins intensif. Certains bec-croisé possèdent un dessin écaillé sur le vertex alors que d'autres ont le vertex de couleur uniforme (les deux sont valables). Dessin en forme de fer à cheval brunâtre sur les joues. <u>Lorums et régions auriculaires</u> : Brun foncé nuancé de rose. <u>Bas de la nuque</u> moins rouge et plutôt brunâtre.
Dos.	<u>Manteau et scapulaires</u> : Moins rouge que la poitrine mais plutôt rouge brunâtre.
Poitrine.	Brun rougeâtre.
Flancs.	Brun rougeâtre.
Ventre.	Blanc grisâtre ainsi que la région anale.
Ailes.	<u>Rémiges primaires</u> : De couleur noir brunâtre avec un étroit liseré rouge brunâtre le long du vexille externe. Le bout des rémiges possède un bord grisâtre. Couvertures sus alaires de couleur brun foncé. Les petites et les moyennes couvertures sus alaires ont un bord rougeâtre.
Queue.	<u>Rectrices</u> : De couleur noir brunâtre avec un étroit liseré rougeâtre. <u>Sous-caudale</u> : Grisâtre avec un dessin écaillé (forme de V).
Pattes. Doigts.	brun foncé.
Ongles.	Noirs.

17.13.3 Bec croisé des sapins Femelle (*Loxia curvirostra*)

Phénotype ancestral



FIGURE 322 – Bec croisé des sapins Femelle. Photo H. Heinzel.

Remarques : La femelle possède les mêmes marques que le mâle, mais la couleur de presque toutes les parties du corps est vert olive grisâtre.

La femelle est plus striée de brun dans l'ensemble que le mâle, notamment sur la tête, la poitrine, le dos et les flancs. Le croupion est jaune verdâtre.

La femelle possède un dessin frontal typiquement gris clair.

229

229. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

17.13.4 Bec croisé bifascié (*Loxia leucoptera*)



FIGURE 323 – Bec croisé bifascié Mâle. Photo H. Heinzel.



FIGURE 324 – Bec croisé bifascié Femelle. Photo H. Heinzel.

17.13.5 Bec croisé bifascié Mâle (*Loxia leucoptera*)

Phénotype ancestral



FIGURE 325 – Bec croisé bifascié Mâle. Photo M. Gottschling.

230

230. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 14,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Couleur corne, assez long. Les mandibules se croisent à l'extrémité de façon très distincte.
Yeux.	Noirs.
Tête.	Entièrement rouge carmin, légèrement écaillée avec la zone loreale et le dessin des joues gris. Le sommet du crâne et la nuque portent une légère suffusion grise.
Dos.	Rouge carmin, voilé de gris et faiblement écaillé.
Gorge. Poitrine.	Rouge carmin.
Flancs.	Rouge carmin indistinctement lavé de gris.
Ventre.	Rouge carmin, se dégradant en blanc sale sur la zone anale.
Ailes.	Rémiges : Noires, liserées de blanc. Les <u>rémiges secondaires externes</u> sont plus largement liserées, surtout à leur extrémité. <u>Couvertures</u> : Noires avec une nette bordure blanche, qui dessine une double barre alaire très nette.
Croupion.	Rouge carmin, légèrement écaillé sur son pourtour.
Sous-Caudales.	Porte un dessin écaillé typique, qui doit être régulier.
Queue.	Assez courte, légèrement échancrée. <u>Rectrices</u> : Noires, très finement liserées de grisâtre.
Pattes.	Gris brun. Robustes et assez courtes.
Doigts.	Gris brun.
Ongles.	Couleur corne.

17.13.6 Bec croisé bifascié Femelle (*Loxia leucoptera*)

Phénotype ancestral



FIGURE 326 – Bec croisé bifascié Femelle. Photo R. Balestra.

Remarques :

La femelle possède les mêmes marques que le mâle, mais la couleur de presque toutes les parties du corps est vert olive grisâtre.

La femelle est plus striée de brun dans l'ensemble que le mâle, notamment sur la tête, la poitrine, le dos et les flancs. Le croupion est jaune verdâtre.

La femelle possède un dessin frontal typiquement gris clair.

17.13.7 Bec croisé perroquet (*Loxia pytyopsittacus*)



FIGURE 327 – Bec croisé perroquet Mâle. Photo H. Heinzel.



FIGURE 328 – Bec croisé perroquet Mâle (*Loxia scotica*). Photo H. Heinzel.

17.13.8 Bec croisé perroquet Mâle (*Loxia pytyopsittacus*)

Phénotype ancestral



FIGURE 329 – Bec croisé perroquet Mâle. Photo P. Rocher.

Défauts :

- 1) Manque d'uniformité dans la couleur,
- 2) Bec défectueux,
- 3) Stries trop fondues ou irrégulières chez la femelle.

Taille du corps : 17 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Couleur corne, puissant, de forme assez lourde. Les extrémités des mandibules se croisent de façon plus courte que chez le bec croisé des sapins.
Yeux.	Noirs.
Tête.	Large, puissamment enchâssée dans les épaules. <u>Front et vertex</u> : De rouge carmin à rouge brique. <u>Lorums et nuque</u> : Voilés de brun. <u>Dessin des joues</u> : Brun.
Dos.	Rouge, fortement mêlé de brun et portant un léger dessin écaillé.
Gorge.	Rouge carmin à rouge brique uni.
Poitrine.	Rouge plus ou moins voilé de brun.
Flancs.	Rouge brunâtre.
Ventre.	Blanc grisâtre, légèrement strié sur les côtés.
Ailes.	<u>Rémiges</u> : Brun noirâtre, portant un étroit liseré plus clair. <u>Grandes couvertures</u> : Bordées de brun rougeâtre.
Croupion.	Rouge carmin à rouge brique.
Sous-Caudales.	Porte un dessin écaillé typique qui doit être régulier.
Queue.	Courte, échancrée. <u>Rectrices</u> : Brun noirâtre, étroitement bordées de brun.
Pattes.	Couleur corne, courtes et robustes.
Doigts.	Couleur corne.
Ongles.	Brun noir.

17.13.9 Bec croisé perroquet Femelle (*Loxia pytyopsittacus*)

Phénotype ancestral

Taille du corps : 17 cm.



FIGURE 330 – Bec croisé perroquet Femelle. Photo P. Rocher.

Remarques : La femelle présente le même dessin que le mâle.

Le rouge est remplacé par une teinte brun olive plus lumineuse à la poitrine et au croupion.

Les stries sont plus marquées.

232. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

18 16.Emberizidae

16.Emberizidae :

La majorité diffèrent de la plupart des fringilles et moineaux par : tête plus petite, bec conique, queue plus longue et peu fourchue. Chant plutôt médiocre.

18.1 Bruants

Bruants

18.1.1 Bruant fou (*Emberiza cia*)

Phénotype ancestral



FIGURE 331 – Bruant fou. Photo Internet.

Défauts classiques des mâles et des femelles :

- 1) Dessin de tête mal délimité,
- 2) Manque de netteté des stries,
- 3) Barres alaires irrégulières.

233

233. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 15.5 - 16 cm. assez long, bien proportionné. Poitrine bien arrondie.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Fine, elliptique.
Sourcils.	Blanc, délimité par un trait oculaire noir, qui s'arrondit derrière la joue et rejoint le trait moustachal partant de la commissure du bec.
Joues.	Grises.
Cou. Nuque.	Nuque peu marquée, grise marquée de deux traits longitudinaux noirs.
Gorge.	Grises.
Menton.	Blanc.
Dos.	Brun-roussâtre, strié de noir.
Poitrine. Gorge.	Grise, puis brun-roux s'éclaircissant graduellement sur le ventre.
Flancs.	Brun-roux, légèrement striés de noir.
Ventre. Région anale.	Beige clair, devenant blanchâtre sur la zone anale.
Ailes.	<u>Rémiges primaires</u> : Brun-noirâtre. <u>Rémiges secondaires</u> : Liserées de brun sur le vexille externe. <u>Grandes couvertures</u> : Noires, liserées de blanc. <u>Couvertures primaires</u> : Brun-noir, avec liseré beige à leur extrémité. L'ensemble formant deux barres alaires.
Croupion.	Brun-roux uni.
Queue.	<u>Rectrices</u> : Brun-noirâtre, liserées de brun à l'extrémité. Les deux <u>rectrices externes</u> sont blanches.
Bec.	Gris-noirâtre.
Yeux. Noirs.	
Pattes. Doigts.	Gris-brun, assez longues et fines.
Ongles.	Gris noir.

Remarques : La femelle ressemble au mâle en plus sombre. Teinte générale brune roussâtre largement striée de noir.

18.1.2 Bruant mélanocéphale (*Emberiza melanocephala*)

Phénotype ancestral



FIGURE 332 – Bruant mélanocéphale Mâle et Femelle. Photo Internet.

Défauts classiques :

- 1) Dessin mal délimité,
- 2) Manque d'intensité des couleurs,
- 3) Stries dorsales irrégulières ou floues chez la femelle.

234

Taille du corps : 16.5 - 17 cm. Oiseau svelte, de silhouette élégante et de couleurs bien tranchées.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Calotte crânienne : De la base du bec jusqu'à la nuque et les joues entièrement noir uni, nettement délimité du jaune-citron du menton et de la gorge.
Nuque.	Jaune, voilé de brun. Le voile brun déborde légèrement sur la poitrine à hauteur de l'épaule.
Dos.	Brun-roux uni.
Poitrine. Gorge.	Jaune-citron, lumineux et uniforme.
Flancs.	Jaune-citron, lumineux et uniforme.
Ventre. Région anale.	Jaune-citron, lumineux et uniforme.
Ailes.	Scapulaires, couvertures et rémiges secondaires : Gris-noirâtre, largement liserés de gris-beige clair sur tout leur pourtour. Grandes rémiges : Noirâtres, portant une fine marge claire sur le vexille externe.
Croupion.	Marron, lavé de jaunâtre.
Queue.	Assez longue. Légèrement échancrée. <u>Rectrices</u> : Noirâtres, légèrement plus claires sur leur pourtour sur la face externe. La face interne est gris foncé, lavé de jaunâtre.
Bec.	Brun-noirâtre.
Yeux.	Noirs.
Pattes. Doigts.	Gris beige.
Ongles.	Gris noir.

Remarque : La Femelle est de teinte générale gris-beige clair. La tête et le dos sont marqués de stries fines et irrégulières. Croupion brun. Sourcil clair, assez marqué qui tranche sur le dessin des joues. Gorge crème-jaunâtre, assez lumineux. Légère suffusion brune à hauteur de l'épaule. Face ventrale, gris-beige clair uni. Région anale jaunâtre. Le dessin de l'aile est identique à celui du mâle, mais de couleur plus terne.

18.1.3 Bruant ortolan (*Emberiza hortulanus*)

Phénotype ancestral



FIGURE 333 – Bruant ortolan. Photo KBOF.

Défauts classiques :

- 1) Dessin mal délimité à la tête, à la gorge et à la poitrine,
- 2) Stries irrégulières ou mal dessinées,
- 3) Taches blanches de la queue irrégulières.

235

235. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 15.5 - 16 cm. Forme très élégante, assez ronde.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Fine, élégante en gris-vert olive. <u>Zone loreale et cercle orbital</u> : Jaune, formant une lunette bien visible. <u>Moustache</u> : Jaune, délimitée de vert-olive.
Cou. Nuque.	Bavette : Jaune, s'étalant sur le menton et le haut de la gorge.
Dos.	Brun, strié de noir.
Poitrine. Gorge.	Plastron : Vert-olive, s'étalant sur le bas de la gorge et le haut de la poitrine vert-olive, puis brun-roux.
Flancs.	Brun-roux uni.
Ventre. Région anale.	Brun-roux, s'éclaircissant en brun-jaunâtre sur la zone anale.
Ailes.	<u>Rémiges</u> : Brun-noirâtre, liserées de brun-roux. <u>Couvertures</u> : Noirâtres, bordées de gris-blanchâtre, forment deux barres alaires indistinctes.
Croupion.	Brun, légèrement strié.
Queue.	<u>Rectrices</u> : Brun-noirâtre, avec liseré brun. De chaque côté, les deux rectrices externes portant une tache blanche, occupant environ la moitié de l'extrémité inférieure.
Bec.	Rose, légèrement grisâtre à la pointe.
Yeux.	Noirs.
Pattes. Doigts.	Couleur chair. assez longues.
Ongles.	Gris-brun.

Remarque : La femelle présente une livrée approchant celle du mâle avec des contours plus ternes et des stries plus marquées. Le vert-olive de la tête est remplacé par une teinte gris-brun strié. Toute la poitrine est roussâtre, striée de brun. La gorge est jaunâtre, finement striée de brun.



FIGURE 334 – Bruant ortolan Mâle et Femelle. Photo KBOF.

18.1.4 Bruant zizi (*Emberiza cirrus*)

Phénotype ancestral



FIGURE 335 – Bruant zizi. Photo Internet.

Défauts classiques :

- 1) Manque de netteté dans le dessin,
- 2) Manque d'intensité des couleurs chez le mâle,
- 3) Stries irrégulières ou indistinctes,
- 4) Manque d'éclat dans la couleur chez le mâle.

236

Taille du corps : 16 cm. Bien proportionné, à la fois élégant et puissant.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Élégante, bien proportionnée. Nuque : Peu marquée. Dessin du crâne : Gris-olive. Sourcils : Jaune. Trait lorel : Noirâtre, s'arrondissant derrière la joue et rejoignant le dessin de la gorge. Joues : Jaune.
Cou. Nuque.	Menton et partie supérieure de la gorge : Noirs, délimités par un demi collier jaune.
Dos.	Brun-roux, avec des stries noires bordées de franges plus claires.
Poitrine. Gorge.	Plastron vert-olive uni. <u>En hiver</u> : La gorge est frangée de schimmel gris.
Flancs.	Haut des flancs brun-roux, s'éclaircissant en brun légèrement strié de brun foncé.
Ventre. Région anale.	Jaune terne.
Ailes.	<u>Rémiges primaires</u> : Noirâtres. <u>Rémiges secondaires et couvertures primaires</u> : Noirâtres, largement striées de brun-roux. <u>Grandes couvertures</u> : Noires bordées de blanc-jaunâtre.
Croupion.	Brun-vert olive clair, légèrement strié.
Queue.	<u>Rectrices</u> : Brun-noirâtre, plus clair sur le vexille externe. <u>Rectrices médianes</u> : Blanches.
Bec.	Brun-noirâtre.
Yeux.	Noirs.
Pattes. Doigts.	Gris-beige.
Ongles.	Grisâtres.

Remarque : La femelle est d'une teinte générale gris-beige. La tête, le dos, la poitrine et les flancs sont striés de brun-noir. Tour des joues et moustaches gris brun. Une légère suffusion jaune apparaît sur la gorge et la face ventrale. Croupion brun-olive.

18.1.5 Bruant à tête rousse Mâle (*Emberiza bruniceps*)

Phénotype ancestral



FIGURE 336 – Bruant à tête rousse Mâle. Photo Internet.

Taille du corps : 17 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Brun noisette, depuis la base du bec jusqu'à la nuque, en passant par les joues, la gorge et le haut de la poitrine.
Cou. Nuque.	Jaune vert.
Dos.	Jaune vert, strié de brun foncé.
Poitrine.	Délimitation nette entre le haut de la poitrine qui est brun noisette et la partie inférieure qui est jaune.
Gorge.	Brun noisette très intense en forme de bavette.
Flanc.	Jaune.
Ventre. Région anale.	Jaune.
Ailes.	Noir brun. Les rémiges présentent un liseré blanc sale.
Croupion.	Jaune.
Queue.	Noir brun avec un liseré brun. Sous caudales jaunes.
Bec.	Noir brun variant jusqu'à la couleur corne.
Yeux.	Noir brun.
Pattes. Doigts.	Brun clair.
Ongles.	Couleur chair.

Défauts classiques en mâles et femelles :

- 1) Couleur trop terne,
- 2) Plumage en désordre.

18.1.6 Bruant à tête rousse Femelle (*Emberiza bruniceps*)

Phénotype ancestral



FIGURE 337 – Bruant à tête rousse Femelle. Photo Internet.

Taille du corps : 17 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Gris brun.
Cou.	
Nuque.	Gris brun.
Dos.	Gris brun.
Poitrine.	Gris brun.
Gorge.	Gris brun.
Flanc.	Gris brun.
Ventre. Région anale.	Gris brun.
Ailes.	Gris brun, les liserées des penne sont légèrement plus clairs.
Croupion.	Gris brun.
Queue.	Gris brun, les liserées des penne sont légèrement plus clairs.
Bec.	De couleur corne.
Yeux.	Noir brun.
Pattes.	
Doigts.	Brun clair.
Ongles.	Couleur corne.

18.1.7 Bruant des roseaux Mâle (*Emberiza schoeniclus*)

Phénotype ancestral



FIGURE 338 – Bruant des roseaux Mâle. Photo KBOF.

Défauts classiques :

- 1) Sourcils et moustaches irréguliers,
- 2) Stries du dos pas assez nettes,
- 3) Stries des flancs irrégulières,
- 4) Taches blanches des rectrices externes pas symétriques,
- 5) Barres alaires irrégulières.

239

239. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 15,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	<u>En été</u> : Front, vertex, occiput, côtés de la tête, menton, gorge et centre de la poitrine de couleur noire. <u>En hiver</u> : Les mêmes parties sont brunâtres. Un dessin de fer à cheval beige sur la région auriculaire. Ce dessin part de la base du bec et rejoint l'arrière de l'oeil. <u>Moustaches</u> : Blanches et collier blanchâtre entourant la nuque chez les mâles adultes. Double moustaches blanche et brune foncée sans collier blanchâtre chez les jeunes mâles.
Cou. Nuque.	Noire en été brunâtre en hiver.
Dos.	Noir brunâtre avec des larges stries rousses.
Poitrine. Gorge.	Le haut de la poitrine est noir brunâtre avec des stries foncées.
Flancs.	Couleur de fond blanchâtre avec des stries de couleur brun noirâtre.
Ventre. Région anale.	Blanchâtre, sous caudale grisâtre.
Ailes.	<u>Rémiges primaires</u> : Brun noirâtre, liserées de roux le long du vexille externe. <u>Rémiges secondaires</u> : Terminées par une extrémité plus claire. Deux bandes alaires roussâtres mais claires.
Croupion.	Brun grisâtre non strié.
Queue.	Rectrices de couleur noir brunâtre avec un bord étroit brun jaunâtre le long du vexille externe, excepté les deux rectrices médianes qui sont brunes. Les deux paires de rectrices externes sont marquées de taches blanches en forme de demi-lune.
Bec.	Noir à noir brunâtre, flammé de noir à la partie supérieure.
Yeux.	Brun foncé.
Pattes. Doigts.	De couleur brunâtre.
Ongles.	De couleur noire.

18.1.8 Bruant des roseaux Femelle (*Emberiza schoeniclus*)

Phénotype ancestral



FIGURE 339 – Bruant des roseaux Femelle. Photo KBOF.

240

240. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 5 avril 2024.

Taille du corps : 15,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	<u>Vertex</u> : Brun roux, strié de noir <u>Large sourcil</u> : Beige. <u>Menton et gorge</u> : Plus blanchâtre. <u>Double moustache</u> : Blanche et noire.
Cou. Nuque.	Noire en été brunâtre en hiver.
Dos.	Noir brunâtre avec des larges stries rousses.
Poitrine. Gorge.	Le haut de la poitrine est noir brunâtre avec des stries foncées.
Flancs.	Striés de larges raies noires.
Ventre. Région anale.	Plus beige que chez le mâle et strié de brun noir.
Ailes.	<u>Rémiges primaires</u> : Brun noirâtre, liserées de roux le long du vexille externe. <u>Rémiges secondaires</u> : Terminées par une extrémité plus claire. Deux bandes alaires roussâtres mais claires.
Croupion.	D'une couleur brune plus foncée.
Queue.	Rectrices de couleur noir brunâtre avec un bord étroit brun jaunâtre le long du vexille externe, excepté les deux rectrices médianes qui sont brunes. Les deux paires de rectrices externes sont marquées de taches blanches en forme de demilune.
Bec.	Noir à noir brunâtre, flammé de noir à la partie supérieure.
Yeux.	Brun foncé.
Pattes. Doigts.	brunâtre.
Ongles.	Noirs.

18.1.9 Bruant Jaune (*Emberiza citrinella*)

Phénotype ancestral



FIGURE 340 – Bruant Jaune. Photo KBOF.

Remarques : La femelle ressemble au mâle mais la couleur est plus pâle dans l'ensemble. Le jaune du mâle est remplacé par une couleur brun verdâtre. La tête, le dos, la poitrine et les flancs sont plus striés que chez la mâle. La femelle ne possède pas le dessin typique en V sur la tête.

Légère bande alaire formée par les couvertures moyennes liserées de jaune clair (ET PAS DE BLANC).

Taille du corps : 16 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Jaune citron avec un dessin en forme de V de couleur brunâtre sur le haut de la tête et se prolongeant vers la nuque. Région de la joue comportant un dessin en forme de fer à cheval brunâtre. Des moustaches de couleur brunâtre des deux côtés de la gorge et du cou.
Nuque.	Verdâtre.
Dos.	Le manteau et les scapulaires sont de couleur brun verdâtre avec des stries brun noir.
Poitrine. Gorge.	Haut de la poitrine : Brun avec un reflet verdâtre. Le milieu et les côtés ont un léger dessin strié de brun. Gorge de couleur jaune citron.
Ventre. Région anale.	Jaune citron.
Ailes.	Rémiges : Brun noirâtre avec un étroit liseré jaune clair le long du vexille externe. Légère bande alaire formée par les couvertures moyennes liserées de jaune clair (ET PAS DE BLANC).
Croupion.	Roux.
Queue.	Rectrices brun noirâtre avec les deux rectrices externes marquées d'une tache blanche sur l'extrémité inférieure des plumes. Les rectrices ont un étroit bord jaunâtre le long du vexille externe.
Bec.	Grisâtre.
Yeux.	Brun foncé.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Bruns.

Défauts classiques :

- 1) Dessin de tête (le V) irrégulier pour le mâle,
- 2) Stries des flancs découpées,
- 3) Dessin de la joue irrégulier (fer à cheval),
- 4) Dessin de la queue irrégulier (tache blanche sur les rectrices externes),
- 5) Barre alaire blanche surtout chez les sujets en classe A, cette barre alaire est fautive.



FIGURE 341 – Bruant Jaune. Photo Rafael De Rojas.

18.1.10 Bruant proyer (*Emberiza calandra*)
Phénotype ancestral



FIGURE 342 – Bruant proyer. Photo E. Gomez.

Défauts classiques :

- 1) Stries irrégulières,
- 2) Dessin des joues irrégulier,
- 3) Couleur de fond trop terne,
- 4) Trop petit de taille et forme pas assez massive,
- 5) Plumes décolorées autour des yeux.

Taille du corps : 17,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	De couleur brun grisâtre, légers sourcils beiges, striée de gris foncé.
Cou. Nuque.	Brun grisâtre, striés de gris foncé.
Dos.	Brun, strié de gris brun foncé.
Poitrine.	Beige, striée de gris foncé. Dessin beige à la base des joues (en forme de demi-lune).
Gorge.	Beige avec deux traits de barbe gris foncé.
Flancs.	De couleur beige et striés de gris foncé.
Ventre. Région anale.	Beige striés de gris foncé.
Ailes.	Brunes foncées avec un léger liseré beige le long du vexille externe et se prolongeant jusqu'à l'extrémité des rémiges primaires. Barre alaire visible sur les couvertures moyennes.
Croupion.	Brun et moins strié que le dos.
Queue.	Rectrices de couleur brun foncé avec liseré beige le long du vexille externe.
Bec.	Gros, jaunâtre avec l'extrémité grise.
Yeux.	Brun foncé.
Pattes. Doigts.	Jaunâtre.
Ongles.	Bruns.

Remarques : la femelle est légèrement plus petite que le mâle.



FIGURE 343 – Bruant proyer. Photo KBOF.