

Standard Fringillidés de la Faune Européenne d'Élevage.



Table des matières

1	Participations	8
2	Passereaux	9
3	1.Généralité et jugement	15
4	15.Fringillidae	21
4.1	Pinsons	21
4.1.1	Pinson des arbres Mâle (<i>Fringilla coelebs</i>)	21
4.1.2	Pinson des arbres Femelle (<i>Fringilla coelebs</i>)	24
4.1.3	Pinson des arbres Mâle Brun (<i>Fringilla coelebs</i>)	26
4.1.4	Pinson des arbres Femelle Brun (<i>Fringilla coelebs</i>)	28
4.1.5	Pinson des arbres Mâle Agate (<i>Fringilla coelebs</i>)	30
4.1.6	Pinson des arbres Femelle Agate (<i>Fringilla coelebs</i>)	32
4.1.7	Pinson des arbres Mâle Opale (<i>Fringilla coelebs</i>)	34
4.1.8	Pinson des arbres Femelle Opale (<i>Fringilla coelebs</i>)	36
4.1.9	Pinson des arbres Mâle et Femelle Brun-Opale (<i>Fringilla coelebs</i>)	38
4.1.10	Pinson du Nord (<i>Fringilla montifringilla</i>)	40
4.1.11	Pinson du Nord Mâle (<i>Fringilla montifringilla</i>)	42
4.1.12	Pinson du Nord Femelle (<i>Fringilla montifringilla</i>)	45
4.2	Venturons	47
4.2.1	Venturon montagnard (<i>Carduelis cintrinella</i>)	47
4.2.2	Venturon montagnard Mâle (<i>Carduelis cintrinella</i>)	48
4.2.3	Venturon montagnard Femelle (<i>Carduelis cintrinella</i>)	50
4.2.4	Venturon Corse Mâle (<i>Carduelis corsicana</i>)	51
4.2.5	Serin des canaris Mâle (<i>Serinus canaria</i>)	52
4.2.6	Serin des canaris Femelle (<i>Serinus canaria</i>)	55
4.3	Serins	58
4.3.1	Serin cini (<i>Serinus serinus</i>)	58
4.3.2	Serin cini Mâle (<i>Serinus serinus</i>)	59
4.3.3	Serin cini Femelle (<i>Serinus serinus</i>)	61
4.4	Sizerins	62
4.4.1	Sizerin flammé (<i>Acanthis flammea flammea</i>)	62
4.4.2	Sizerin cabaret (<i>Acanthis flammea cabaret</i>)	63
4.4.3	Sizerin flammé (<i>Acanthis flammea flammea</i>)	65
4.4.4	Sizerin flammé Brun (<i>Acanthis flammea flammea</i>)	66
4.4.5	Sizerin flammé Pastel (<i>Acanthis flammea flammea</i>)	68
4.4.6	Sizerin flammé Brun-Pastel (<i>Acanthis flammea flammea</i>)	70

4.4.7	Sizerin flammé Écaillé (<i>Acanthis flammea flammea</i>)	72
4.4.8	Sizerin flammé Brun-Écaillé (<i>Acanthis flammea flammea</i>) . .	74
4.4.9	Sizerin flammé Facteur Foncé (<i>Acanthis flammea flammea</i>) .	76
4.4.10	Sizerin flammé Pastel Facteur Foncé (<i>Acanthis flammea flammea</i>)	78
4.4.11	Sizerin flammé Brun Facteur Foncé (<i>Acanthis flammea flammea</i>)	80
4.4.12	Sizerin flammé Phéo (<i>Acanthis flammea flammea</i>)	82
4.4.13	Sizerin blanchâtre (<i>Acanthis hornemanni</i>)	84
4.5	Linottes	87
4.5.1	Linotte mélodieuse (<i>Linaria cannabina</i>)	87
4.5.2	Linotte mélodieuse Mâle (<i>Linaria cannabina</i>)	88
4.5.3	Linotte mélodieuse Femelle (<i>Linaria cannabina</i>)	91
4.5.4	Linotte à bec jaune (<i>Linaria flavirostris</i>)	92
4.5.5	Linotte à bec jaune (<i>Linaria flavirostris</i>)	93
4.6	Tarin des aulnes	95
4.6.1	Tarin des aulnes (<i>Spinus spinus</i>)	95
4.6.2	Tarin des aulnes Mâle (<i>Spinus spinus</i>)	96
4.6.3	Tarin des aulnes Femelle (<i>Spinus spinus</i>)	98
4.6.4	Tarin des aulnes Mâle Brun (<i>Spinus spinus</i>)	100
4.6.5	Tarin des aulnes Femelle Brune (<i>Spinus spinus</i>)	103
4.6.6	Tarin des aulnes Mâle Agate (<i>Spinus spinus</i>)	105
4.6.7	Tarin des aulnes Femelle Agate (<i>Spinus spinus</i>)	107
4.6.8	Tarin des aulnes Mâle Brun Dilué (<i>Spinus spinus</i>)	109
4.6.9	Tarin des aulnes Femelle Brun Dilué (<i>Spinus spinus</i>)	111
4.6.10	Tarin des aulnes Mâle Brun Double Dilué (<i>Spinus spinus</i>) .	113
4.6.11	Tarin des aulnes Femelle Brune Double Dilué (<i>Spinus spinus</i>)	116
4.6.12	Tarin des aulnes Mâle Vert Dilué (<i>Spinus spinus</i>)	118
4.6.13	Tarin des aulnes Femelle Verte Dilué (<i>Spinus spinus</i>)	120
4.6.14	Tarin des aulnes Mâle Vert Double Dilué (<i>Spinus spinus</i>) . .	122
4.6.15	Tarin des aulnes Femelle Verte Double Diluée (<i>Spinus spinus</i>)	124
4.6.16	Tarin des aulnes Mâle Pastel (<i>Spinus spinus</i>)	126
4.6.17	Tarin des aulnes Femelle Pastel (<i>Spinus spinus</i>)	129
4.6.18	Tarin des aulnes Mâle Pastel Dilué (<i>Spinus spinus</i>)	131
4.6.19	Tarin des aulnes Femelle Pastel Dilué (<i>Spinus spinus</i>)	133
4.6.20	Tarin des aulnes Mâle Brun Pastel (<i>Spinus spinus</i>)	135
4.6.21	Tarin des aulnes Femelle Brun Pastel (<i>Spinus spinus</i>)	138
4.6.22	Tarin des aulnes Mâle Brun Pastel Dilué (<i>Spinus spinus</i>) . .	140
4.6.23	Tarin des aulnes Femelle Brun Pastel Dilué (<i>Spinus spinus</i>)	142

4.6.24	Tarin des aulnes Mâle Ivoire (<i>Spinus spinus</i>)	144
4.6.25	Tarin des aulnes Femelle Ivoire (<i>Spinus spinus</i>)	146
4.6.26	Tarin des aulnes Mâle Pastel Ivoire (<i>Spinus spinus</i>)	148
4.6.27	Tarin des aulnes Femelle Pastel Ivoire (<i>Spinus spinus</i>)	150
4.7	Chardonnerets	152
4.7.1	Chardonneret élégant (<i>Carduelis carduelis carduelis</i>)	152
4.7.2	Chardonneret Frigoris (<i>Carduelis carduelis frigoris</i>)	154
4.7.3	Chardonneret Britannica (<i>Carduelis carduelis britannica</i>)	155
4.7.4	Chardonneret Parva (<i>Carduelis carduelis parva</i>)	156
4.7.5	Chardonneret Tschusii (<i>Carduelis carduelis tschusii</i>)	157
4.7.6	Chardonneret élégant (<i>Carduelis carduelis carduelis</i>)	158
4.7.7	Chardonneret élégant Brun (<i>Carduelis carduelis carduelis</i>)	160
4.7.8	Chardonneret élégant Agate (<i>Carduelis carduelis carduelis</i>)	163
4.7.9	Chardonneret élégant Pastel (<i>Carduelis carduelis carduelis</i>)	166
4.7.10	Chardonneret élégant Isabelle (<i>Carduelis carduelis carduelis</i>)	170
4.7.11	Chardonneret élégant Satiné (<i>Carduelis carduelis carduelis</i>)	172
4.7.12	Chardonneret élégant Blanc avec masque orange (<i>Carduelis carduelis carduelis</i>)	174
4.7.13	Chardonneret élégant Jaune (<i>Carduelis carduelis carduelis</i>)	176
4.7.14	Chardonneret élégant Aminet (<i>Carduelis carduelis carduelis</i>)	178
4.7.15	Chardonneret élégant Opale (<i>Carduelis carduelis carduelis</i>)	181
4.7.16	Chardonneret élégant Tête blanche Ancestral (<i>Carduelis carduelis carduelis</i>)	184
4.7.17	Chardonneret élégant Tête blanche Brun (<i>Carduelis carduelis carduelis</i>)	186
4.7.18	Chardonneret élégant Tête blanche Agate (<i>Carduelis carduelis carduelis</i>)	188
4.7.19	Chardonneret élégant Tête blanche Isabelle (<i>Carduelis carduelis carduelis</i>)	190
4.7.20	Chardonneret élégant Tête blanche Lutino (<i>Carduelis carduelis carduelis</i>)	192
4.7.21	Chardonneret élégant Tête blanche Satiné (<i>Carduelis carduelis carduelis</i>)	194
4.8	Verdiers	196
4.8.1	Verdier d'Europe (<i>Chloris chloris chloris</i>)	196
4.8.2	Verdier d'Europe (<i>Chloris chloris aurantiiventris</i>)	197
4.8.3	Verdier d'Europe Mâle (<i>Chloris chloris chloris</i>)	198
4.8.4	Verdier d'Europe Femelle (<i>Chloris chloris chloris</i>)	201
4.8.5	Verdier d'Europe Mâle Brun (<i>Chloris chloris chloris</i>)	203
4.8.6	Verdier d'Europe Femelle Brune (<i>Chloris chloris chloris</i>)	205

4.8.7	Verdier d'Europe Mâle Agate (<i>Chloris chloris chloris</i>)	207
4.8.8	Verdier d'Europe Femelle Agate (<i>Chloris chloris chloris</i>) . .	210
4.8.9	Verdier d'Europe Mâle Isabelle (<i>Chloris chloris chloris</i>) . . .	212
4.8.10	Verdier d'Europe Femelle Isabelle (<i>Chloris chloris chloris</i>) .	214
4.8.11	Verdier d'Europe Mâle Isabelle Satiné (<i>Chloris chloris chloris</i>)	216
4.8.12	Verdier d'Europe Femelle Isabelle Satiné (<i>Chloris chloris chloris</i>)	218
4.8.13	Verdier d'Europe Mâle Agate Satiné (<i>Chloris chloris chloris</i>)	220
4.8.14	Verdier d'Europe Femelle Agate Satiné (<i>Chloris chloris chloris</i>)	222
4.8.15	Verdier d'Europe Vert Pastel (<i>Chloris chloris chloris</i>)	224
4.8.16	Verdier d'Europe Mâle Agate Pastel (<i>Chloris chloris chloris</i>)	226
4.8.17	Verdier d'Europe Femelle Agate Pastel (<i>Chloris chloris chloris</i>)	228
4.8.18	Verdier d'Europe Mâle et Femelle Isabelle Pastel (<i>Chloris chloris chloris</i>)	230
4.8.19	Verdier d'Europe Mâle et Femelle Brun Pastel (<i>Chloris chloris chloris</i>)	232
4.8.20	Verdier d'Europe Ancestral Bec Jaune (<i>Chloris chloris chloris</i>)	234
4.8.21	Verdier d'Europe Brun Bec Jaune (<i>Chloris chloris chloris</i>) .	236
4.8.22	Verdier d'Europe Mâle Agate Bec Jaune (<i>Chloris chloris chloris</i>)	238
4.8.23	Verdier d'Europe Femelle Agate Bec Jaune (<i>Chloris chloris chloris</i>)	240
4.8.24	Verdier d'Europe Mâle Isabelle Bec Jaune (<i>Chloris chloris chloris</i>)	242
4.8.25	Verdier d'Europe Femelle Isabelle Bec Jaune (<i>Chloris chloris chloris</i>)	244
4.8.26	Verdier Maltais (Major) (<i>Chloris chloris chloris</i>)	246
4.9	Bouvreuils	252
4.9.1	Bouvreuil pivoine (<i>Pyrrhula pyrrhula europaea</i>)	252
4.9.2	Bouvreuil ponceau (<i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i>)	253
4.9.3	Bouvreuil pivoine ibérique (<i>Pyrrhula pyrrhula iberiae</i>) . . .	254
4.9.4	Bouvreuil pivoine (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	256
4.9.5	Bouvreuil pivoine Mâle Brun (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	259
4.9.6	Bouvreuil pivoine Femelle Brune (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	262
4.9.7	Bouvreuil pivoine pastel (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	264
4.9.8	Bouvreuil pivoine Mâle Brun Pastel (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>) . .	267

4.9.9	Bouvreuil pivoine Femelle Brune Pastel (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	269
4.9.10	Bouvreuil pivoine blanc (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	271
4.9.11	Bouvreuil pivoine jaune (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	273
4.9.12	Bouvreuil pivoine Mâle brun pastel jaune (<i>Pyrrhula pyr-</i> <i>rhula</i>)	275
4.9.13	Bouvreuil pivoine Mâle Topaze (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	277
4.9.14	Bouvreuil pivoine Femelle Topaze (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	279
4.10	Gros bec casse-noyaux	281
4.10.1	Gros bec casse-noyaux (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)	281
4.10.2	Gros bec casse-noyaux Mâle (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)	282
4.10.3	Gros bec casse-noyaux Femelle (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)	284
4.11	Roselin githagine	285
4.11.1	Roselin githagine (<i>Rhodopechys githaginea</i>)	285
4.11.2	Roselin githagine (<i>Rhodopechys githaginea</i>)	286
4.11.3	Roselin cramoisi Mâle (<i>Carpodacus erythrinus</i>)	289
4.11.4	Roselin cramoisi Femelle (<i>Carpodacus erythrinus</i>)	291
4.12	Durbec des sapins	293
4.12.1	Durbec des sapins (<i>Pinicola enucleator</i>)	293
4.12.2	Durbec des sapins Mâle (<i>Pinicola enucleator</i>)	294
4.13	Bec croisé	296
4.13.1	Bec croisé des sapins (<i>Loxia curvirostra</i>)	296
4.13.2	Bec croisé des sapins Mâle (<i>Loxia curvirostra</i>)	297
4.13.3	Bec croisé des sapins Femelle (<i>Loxia curvirostra</i>)	299
4.13.4	Bec croisé bifascié (<i>Loxia leucoptera</i>)	300
4.13.5	Bec croisé bifascié Mâle (<i>Loxia leucoptera</i>)	301
4.13.6	Bec croisé bifascié Femelle (<i>Loxia leucoptera</i>)	303
4.13.7	Bec croisé perroquet (<i>Loxia pytyopsittacus</i>)	304
4.13.8	Bec croisé perroquet Mâle (<i>Loxia pytyopsittacus</i>)	305
4.13.9	Bec croisé perroquet Femelle (<i>Loxia pytyopsittacus</i>)	307

1 Participations

Ont Participé à l'élaboration de ce standard :

Jacques FAIVRE, François VUILLAUME, Enrique GOMEZ,
Lionel DUROCHAT, Jean-Michel EYTORFF, David VETTESE,
Jean-Luc BERBUDEAU.

Documentations : UOF, FOI, FOA, KBOF.

Photographies : P. Rocher, E. Gomez, S. Chartier, R. Driesmans, J-M Eytorff,
J-L Berbudeau, B. Cormelieu, A. Cupido, Cazadilla, Mingeroot, P. Malburet,
J-P. Hennebique, Rafael Rios Arena, L. Durochat, R. Rojas, A. Van, D. Vettese.

Merçi aux auteurs de nous avoir permis la publication de leurs photos.
Un merçi tout particulier à Hermann Heinzl pour ses illustrations.

Terminé le 26 Mai 2014.

Modifié partiellement par la CNJF le 10 mars 2024.

**La reproduction et l'utilisation de ces
documents sont interdites sans
l'autorisation de leurs auteurs
ainsi que de la COM/OMJ.**

2 Passereaux

Ils font partie de l'ordre des Passériformes. Il s'agit d'oiseaux généralement petits sauf les corbeaux (Corvidae).

1. Généralité et Jugement

2. Motacillidae

Bergeronnettes

- Bergeronnette grise (*Motacilla alba*)
- Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*)
- Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*)

3. Bombycillidae : Bec assez court et épais.

Jaseurs

- Jaseur boréal (*Bombycilla garrulus*)

4. Prunellidae : Petits oiseaux terrestres ressemblant à des moineaux mais différents par un bec fin d'insectivore et par des flancs striés. Ils sautillent ou marchent comme s'ils se traînaient en entrouvrant souvent les ailes.

Accenteurs

- Accenteur mouchet (*Prunella modularis*)
- Accenteur alpin (*Prunella collaris*)

5. Turdidae : Vaste famille réunissant plusieurs milliers des meilleurs chanteurs européens. Tous sont insectivores et frugivores. Ils courent ou sautillent.

Rosignols

- Rossignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*)
- Rossignol progné *Luscinia luscinia*)

Rouge gorge

- Rouge gorge (*Erythacus rubecula*)

Calliopes

- Calliope sibérienne (*Luscinia calliope*)
- Gorge bleue à miroir (*Luscinia svecica*)

Tarriers

- Tarier pâle (*Saxicola torquata*)
- Tarier des prés (*Saxicola rubetra*)

Rouge queue

- Rouge queue noir (*Phoenicurus ochruros*)
- Rouge queue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*)

Monticules

- Merle bleu (*Monticola solitarius*)
- Merle de roche (*Monticola saxatilis*)

Merle

- Merle noir (*Turdus merula*)
- Merle à plastron (*Turdus torquatus alpestris*)

Grives

- Grive litorne (*Turdus pilaris*)
- Grive mauvis (*Turdus iliacus*)
- Grive musicienne (*Turdus philomelos*)
- Grive draine (*Turdus viscivorus*)

6. **Sylviidae** : Petits passereaux insectivores. Sexes généralement semblables, juvéniles comme adultes.

Fauvettes

- Fauvette des jardins (*Sylvia borin*)
- Fauvette grisette (*Sylvia communis*)
- Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*)

7. **Panurinae (Timallidae)** : ressemblent superficiellement aux « mésanges » à longue queue.

Panure à moustache

- Panure à moustache (*Panurus biarmicus*)

8. **Aegithalidae** : Petit oiseau au bec très court, longue queue étagée correspondant à plus de la moitié de la longueur totale.

Mésange à longue queue

- Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus*)

9. **Remizidae** : Allure de mésange, mais le bec est un peu plus long et fin. Oiseau actif et acrobate.

Mésange Rémiz

- Mésange Rémiz (*Remiz pendulinus*)

-
10. **Paridae** : Petits oiseaux insectivores très actifs, acrobates. Sexes semblables.

Mésanges

- Mésange huppée (*Parus cristatus*)
- Mésange nonnette (*Parus palustris*)
- Mésange boréale (*Parus montanus*)
- Mésange noire (*Parus ater*)
- Mésange charbonnière (*Parus major*)
- Mésange azurée (*Parus cyanus*)
- Mésange bleue (*Parus caeruleus*)

11. **Sittidae** : Passereau trapu, queue courte, sexes généralement semblables. très actives, les meilleurs oiseaux grimpeurs, se déplacent dans tous les sens sur les arbres. Ils se nourrissent d'invertébrés, de graines, de fruits secs et coincent les plus durs dans une fente pour les ouvrir à coup de bec.

Sittelle

- Sittelle torchepot (*Sitta europea*)

12. **Corvidae** : Grands passereaux souvent grégaires. Comportement très évolué. Ne chantent pas. Bec souvent robuste. Sexes semblables.

Geai

- Geai des chênes (*Garrulus glandarius*)

Pies

- Pie bavarde (*Pica pica*)
- Pie bleue (*Cyanopica cyanus*)

Corbeaux

- Corbeau freux (*Corvus frugilegus*)
- Corneille noire (*Corvus corone corone*)
- Corneille mantelée (*Corvus corone cornix*)
- Choucas des tours (*Coloeus monedula*)
- Grand corbeau (*Corvus corax*)

-
13. **Sturnidae** : Passereaux grégaires de taille moyenne. Plumage souvent noirâtre et irisé. Pattes plus ou moins courtes, bec robuste. Sexes semblables. Marchent à petits pas et courent.

Etourneaux

- Etourneaux sansonnet (*Sturnus vulgaris*)

Martins

- Martin roselin (*Sturnus roseus*)

14. **Passeridae** : Plumage dépourvu de couleurs vives. Bec court, épais, queue peu ou pas échancrée.

Niverolle

- Niverolle (*Montifringilla nivalis*)

Moineaux

- Moineau soulcy (*Petronia petronia*)
- Moineau espagnol (*Passer hispaniolensis*)
- Moineau cisalpin (*Passer italiae*)
- Moineau domestique (*Passer domesticus*)
- Moineau friquet (*Passer montanus*)

15. **Fringillidae** : Petits passereaux plus ou moins grégaires après la reproduction. Bec robuste de granivore. Chant souvent plus mélodieux que celui des bruants.

Pinsons

- Pinson du nord (*Fringilla Montifringilla*)
- Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*)

Venturons

- Venturon montagnard (*Serinus citrinella*)
- Venturon corse (*Serinus corsicana*)

Serins

- Serin cini (*Serinus serinus*)

Sizerins

- Sizerin flammé (*Acanthis flammea flammea*)
- Sizerin cabaret (*Acanthis flammea cabaret*)
- Sizerin blanchâtre (*Acanthis flammea hornemanni*)

Linottes

- Linotte à bec jaune (*Linaria flavirostris*)
- Linotte mélodieuse (*Linaria cannabina*)

Tarins

- Tarin des aulnes (*Spinus spinus*)

Chardonnerets

- Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis carduelis*)
- Chardonneret parva (*Carduelis carduelis parva*)
- Chardonneret major (*Carduelis carduelis frigoris*)
- Chardonneret britannique (*Carduelis carduelis britanica*)
- Chardonneret tschusii (*Carduelis carduelis tschusii*)

Verdier

- Verdier d'Europe (*Chloris chloris*)
- Verdier d'Europe (*Chloris aurantiiventris*)

Bouvreuils

- Bouvreuil ponceau (*Pyrrhula Pyrrhula Pyrrhula*)
- Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula Pyrrhula europea*)
- Bouvreuil pivoine ibérique (*Pyrrhula Pyrrhula iberiae*)

Gros bec

- Gros bec casse noyau (*Coccothrauste coccothrauste*)

Roselins

- Roselin githagine (*Rhodopechys githaginea*)
- Roselin cramoisi (*Carpodacus erythrinus*)

Dur-bec

- Dur bec des sapins (*Pinicola enucleator*)

Becs-coisés

- Bec croisé des sapins (*Loxia curvirostra*)
- Bec croisé bifascié (*Loxia leucoptera*)
- Bec croisé perroquet (*Loxia pythopsitacus*)

-
16. **Emberizidae** : La majorité diffère de la plupart des fringilles et des moineaux par une tête plus petite, un bec conique, une queue plus longue et peu fourchue. Le chant est plutôt médiocre.

Bruants

- Bruant proyer (*Emberiza calandra*)
- Bruant fou (*Emberiza cia*)
- Bruant jaune (*Emberiza citrinella*)
- Bruant zizi (*Emberiza cirlus*)
- Bruant à tête rousse (*Emberiza bruniceps*)
- Bruant mélanocéphale (*Emberiza melanocephala*)
- Bruant ortolan (*Emberiza hortulanus*)
- Bruant des roseaux (*Emberiza schoeniclus*)

17. **Mutations de la Faune Européenne homologuées par la COM/OMJ**

6

3 1.Généralité et jugement

1. Généralité et jugement.

Dessin

Caractéristiques

Dessin typique de la race selon le standard.

Points à disposition 30

Evaluations	Pénalisations	Points
EXCELLENT	➤ Dessin caractéristique de l'espèce. ➤ Sans dessin pour les mutations lipochromes	29
BON	➤ Léger manque de dessin ou dessin légèrement flou de l'espèce ➤ Dessin apparent chez les mutations lipochromes	27
SUFFISANT	➤ Manque de dessin ou flou	26-25
INSUFFISANT	➤ Sans dessin ou très flou	24 =>

Couleur

Caractéristiques

Couleur typique de la race selon le standard.

Points à disposition 30

Evaluations	Pénalisations	Points
EXCELLENT	➤ Aucun défaut	29
BON	➤ Un défaut	28
SUFFISANT	➤ Deux ou Trois défauts	27-26
INSUFFISANT	➤ Plus de trois défauts ou des défauts graves, plumage en mue sur le manteau	25 =>

7

7. Standard COM/OMJ Edition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

Forme & Grandeur

Caractéristiques

Forme et Grandeur typique de la race selon le standard.

Défauts pénalisants :

- Longueur : Inférieure ou supérieure au standard,
- Tête : Aplatie ou trop petite ou au contraire trop grande et pesante en proportion du corps,
- Dos : concave ou convexe,
- Poitrine : Plate ou étroite ou bien proéminente et massive,
- Tronc : Top fin ou trop massif,
- Jambes : Trop longues avec un tibia fin et cuisses visibles ou trop courtes ou bien recouvertes par le plumage de l'abdomen.

Points à disposition 20

Evaluations	Pénalisations	Points
EXCELLENT	➤ Aucun défaut	19
BON	➤ Un défaut	18
SUFFISANT	➤ Deux ou Trois défauts	17-16
INSUFFISANT	➤ Plus de trois défauts et/ou défauts graves	15 =>

8

Plumage

Caractéristiques :

Le plumage se compose de plumes et de pennes. Il devra être complet, intact, uniforme, lisse, compact, serré et brillant.

Les pennes et les plumes devront se chevaucher les unes sur les autres comme des tuiles bien ordonnées. La queue et les ailes devront être compactes, fermées et intactes.

Sont considérés comme défauts :

- Plumage trop long et abondant, qui rend le manteau moins compact,
- Plumage trop abondant sur les flancs, sourcils trop touffus et marqués,
- Coup de vent dans la gorge et sur la poitrine,
- Plumage lâche sur un ou les deux flancs, à l'abdomen ou sur la poitrine,
- Plumes de coq.
- Dos avec des plumes qui ont tendance à se séparer.
- Plumage court, rare et sec.
- Mue pas terminée.
- Rémiges et rectrices pas uniforme (avec des plumes en repousse).
- Rémiges et rectrices cassées.
- Rémiges non complètes et pas uniformément en ligne.
- Queue en éventail ou / et queue d'hirondelle.

Points à disposition 10

Evaluations	Pénalisations	Points
EXCELLENT	➤ Aucun défaut	9
BON	➤ Un défaut	8
SUFFISANT	➤ Deux ou Trois défauts ou des défaut graves	7-6
INSUFFISANT	➤ Plus de trois défauts et/ou de façon voyante, plumage en mue sur tout le manteau	5 =>

Sont considérés comme « défauts graves », ceux qui sont particulièrement accentués.

9

Maintien, Condition & Impression

Attitude et position de l'oiseau en mouvement, pas amorphe.

Condition de l'oiseau : bec court, ongles soignés.

Impression : Propreté de la cage, bien être de l'oiseau.

Caractéristiques : Par maintien, s'entend l'attitude du corps du sujet et comment il se présente sur le perchoir dans la cage.

Donc la forme et le maintien, souvent se comparent et s'influencent l'un l'autre, ils sont complémentaires. Un canari che qui la forme laisse à désirer aura difficilement un bon maintien et vice-versa.

Au repos, le sujet doit présenter à une ligne corps-queue droite et continue ; et avoir une position d'environ 45 degrés par rapport au perchoir.

Les défauts de pénalisations sont de deux types :

1. Caractère

- Sauvage ou inquiet,
- Timide et peureux.

2. Structurel

- Ailes portées trop basses avec une ligne corps queue concave ou convexe,
- Ailes croisées,
- Queue portée trop basse avec une ligne corps queue concave ou convexe,
- Membres raides sans la semi flexion normale de la cheville,
- Épaules saillantes,
- Bec : croissance anormale d'une mandibule.

Points à disposition 10

Evaluations	Pénalisations	Points
EXCELLENT	➤ Aucun défaut	9
BON	➤ Un défaut	8
SUFFISANT	➤ Deux ou Trois défauts ou des défaut graves	7-6
INSUFFISANT	➤ Plus de trois défauts ou des défaut graves	5 =>

10

10. Standard COM/OMJ Edition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

O.M.J.

FICHE DE JUGEMENT

Exposant				
Pays				
N° de l'éleveur				
FAUNE EUROPENNE				
Dénomination				
Bague				
Cage n°				
Dessin	30			
Couleur	30			
Forme et Grandeur	20			
Plumage	10			
Maintien, condition et impression	10			
Total	100			
Total pour le Stam				
Harmonie				
Total pour la collection				

Remarques :

Juges:

Date:

FIGURE 1 – Fiche de jugement COM/OMJ.




FIGURE 2 – Topographie d'un oiseau.

4 15.Fringillidae

15. Fringillidae :

Petits passereaux plus ou moins grégaires après la reproduction. Bec robuste de granivore. Chant souvent plus mélodieux que celui des bruants.

4.1 Pinsons

Pinsons

4.1.1 Pinson des arbres Mâle (*Fringilla coelebs*)

Phénotype ancestral



FIGURE 3 – Pinson des arbres. Photo H. Heinzel.

Défauts :

- 1) Dessin des joues irrégulier,
- 2) Barres alaires irrégulières ou incomplètes,
- 3) Miroir pas visible ou pas symétrique,
- 4) Flancs trop clair,
- 5) Couleur de la poitrine irrégulière.



FIGURE 4 – Pinson des arbres Mâle. Photo KBOF.

11

11. [Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.](#)

Taille du corps : 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Front.	Noir.
Couronne. Occiput. Nuque.	Gris bleuté.
Joues. Lorums. Menton. Sourcils. Régions auriculaires. Gorge. Poitrine. Flancs.	Passant du rose brun ou rouge brun.
Dos.	Brun marron.
Épaules.	Gris bleuté.
Ventre.	Région anale blanche.
Rémiges.	<u>Primaires</u> : Brun noir. <u>Secondaires</u> : Brun noir avec un liseré jaunâtre à la partie inférieure des rémiges. Sus-alaires et barre alaire blanches avec petit miroir blanc.
Croupion.	Vert olive teinté de jaune.
Queue.	<u>Rectrices</u> : Brun noirâtre étroitement liserées de vert le long du vexille externe. <u>Rectrices externes</u> : Avec grande tache blanche à leur partie inférieure.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Bleu acier en été, brun gris avec l'extrémité plus foncée en hiver.
Pattes. Doigts.	Brun clair.
Ongles.	Noirâtres.

4.1.2 Pinson des arbres Femelle (*Fringilla coelebs*)

Phénotype ancestral



FIGURE 5 – Pinson des arbres Femelle. Photo KBOF.

Défauts :

- 1) Dessin des joues irrégulier,
- 2) Barres alaires irrégulières ou incomplètes,
- 3) Miroir pas visible ou pas symétrique,
- 4) Flancs trop clair,
- 5) Couleur de la poitrine irrégulière.

Taille du corps : 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Front.	Noir.
Tête. Dos. Poitrine.	Gris brun.
Gorge.	Gris brun sans taches plus claires.
Épaules.	Brun beige.
Flancs.	Gris brun sans être délavés.
Ventre.	Région anale blanc sale.
Rémiges.	Comme le mâle mais plus brunes. La barre alaire est aussi moins blanche.
Croupion.	Vert lavé de jaunâtre.
Queue.	Comme le mâle mais plus brune.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Gris brun.
Pattes. Doigts.	Brun clair.
Ongles.	Noirâtres.

4.1.3 Pinson des arbres Mâle Brun (*Fringilla coelebs*)

Mutation Brune



FIGURE 6 – Pinson des arbres Mâle Brun.
Photo Alois Van Migeroot. Photo KBOF.

Taille du corps : 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Front.	Noir.
Tête.	Brune avec la bande frontale plus foncée.
Gorge. Poitrine.	Brune avec un voile lie de vin.
Dos.	Brun.
Flancs.	Bruns avec un voile lie de vin.
Ventre.	Brun clair.
Rémiges.	<u>Primaires</u> : Brunes avec un miroir blanc. <u>Secondaires</u> : Brunes.
Couvertures.	<u>Grandes couvertures</u> : Brunes avec une barre alaire crème. <u>Couvertures moyennes</u> : Brunes avec barre scapulaire blanche. <u>Petites couvertures</u> : Brunes.
Croupion.	Brun.
Queue.	Brune avec dessin blanc sous la queue.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Brun clair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

4.1.4 Pinson des arbres Femelle Brun (*Fringilla coelebs*)

Mutation Brune



FIGURE 7 – Pinson des arbres Femelle Brune.
Photo Alois Van Migeroot. Photo KBOF.

Taille du corps : 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête. Dos. Poitrine.	Brun chaud.
Gorge.	Brun chaud.
Flancs.	Brun chaud.
Ventre.	Région anale blanc crème.
Rémiges.	Rémiges primaires : Brun chaud avec un miroir blanc. Rémiges secondaires : Brun chaud.
Couvertures.	Grandes couvertures : Brun chaud avec un miroir blanc. Couvertures moyennes : Brun chaud avec barre scapulaire blanche. Petites couvertures : Brun chaud.
Croupion.	Brun chaud.
Queue.	Brun chaud avec dessin blanc sous la queue.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Brun clair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

4.1.5 Pinson des arbres Mâle Agate (*Fringilla coelebs*)

Mutation Agate



FIGURE 8 – Pinson des arbres Mâle Agate.



FIGURE 9 – Pinson des arbres Mâle Agate.
Photo Alois Van Migeroot. Photo KBOF.

Taille du corps : 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Front.	Noir.
Couronne. Occiput. Nuque.	Gris bleuté.
Joues. Lorums. Menton. Sourcils. Région auriculaires. Gorge. Poitrine. Flancs.	Rose brun.
Dos.	Gris brunâtre.
Ventre.	Région anale blanche.
Ailes.	Rémiges primaires : Noires. Rémiges secondaires : Noires avec un liseré jaunâtre à leur partie inférieure. Sus-alaires : (épaules) Blanches. Barre alaire blanche et petit miroir blanc.
Croupion.	Vert olive teinté de jaune.
Queue.	Rectrices noires étroitement liserées de vert le long du vexille externe. Les rectrices externes portent une grande tache blanche à leur partie inférieure.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Bleu acier en été, gris avec l'extrémité plus foncée en hiver.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Foncés.

4.1.6 Pinson des arbres Femelle Agate (*Fringilla coelebs*)
Mutation Agate



FIGURE 10 – Pinson des arbres Femelle Agate.



FIGURE 11 – Pinson des arbres Femelle Agate.
Photo Alois Van Migeroot. Photo KBOF.

Taille du corps : 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête. Dos.	Gris brun clair, avec deux raies gris foncé sur le vertex et descendant dans la nuque.
Gorge. Poitrine.	Gris clair.
Dos. Épaules.	Gris brun clair.
Flancs.	Gris brun clair.
Ventre.	Région anale gris blanc sale.
Ailes.	Rémiges primaires : Noires. Rémiges secondaires : Noires avec un liseré jaunâtre à leur partie inférieure. Sus-alaires : (épaules) Blanches. Barre alaire moins blanche que chez le mâle et petit miroir blanc.
Croupion.	Vert lavé de jaunâtre.
Queue.	Rectrices noires étroitement liserées de vert le long du vexille externe. Les rectrices externes portent une grande tache blanche à leur partie inférieure.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Brun clair légèrement flammé de gris.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Foncés.

4.1.7 Pinson des arbres Mâle Opale (*Fringilla coelebs*)

Mutation Opale



FIGURE 12 – Pinson des arbres Mâle Opale.
Photo Alois Van Mingeroet. Photo KBOF.

17

17. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

Taille du corps : 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Front.	Noir.
Couronne. Occiput. Nuque.	Gris foncé bleuté.
Joues. Lorums. Menton. Sourcils. Région auriculaires.	Couleur jaunâtre, voilée de chamois.
Épaules.	Gris foncé bleuté.
Gorge. Poitrine. Flancs.	Couleur lie de vin très clair avec un voile gris clair bleuté.
Dos. Croupion.	Jaune verdâtre. Dos avec des reflets bleutés.
Ventre.	Région anale sale blanc.
Ailes.	<u>Rémiges primaires</u> : Gris bleu. <u>Rémiges secondaires</u> : Gris bleu avec un liseré jaunâtre à leur partie inférieure. Sus-alaires (épaules) blanches. Barre alaire jaune verdâtre et petit miroir blanc.
Queue.	Rectrices gris bleuté étroitement liserées de jaune verdâtre le long du vexille externe. Les rectrices externes portent une grande tache blanche à leur partie inférieure.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Gris foncé bleuté en été, gris foncé en hiver.
Pattes. Doigts.	Couleur chair foncé.
Ongles.	Foncés.

4.1.8 Pinson des arbres Femelle Opale (*Fringilla coelebs*)

Mutation Opale



FIGURE 13 – Pinson des arbres Femelle Opale.
Photo Alois Van Mingeroot. Photo KBOF.

18

18. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

Taille du corps : 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Gris clair bleuté avec deux raies plus foncées sur le vertex et descendant dans la nuque.
Dos.	Jaune verdâtre avec un voile bleuté.
Épaules.	Gris clair bleuté.
Gorge. Poitrine. Flancs.	Gris clair lavé de jaunâtre.
Ventre.	Région anale gris blanc sale.
Ailes.	Comme la mâle mais d'un gris bleuté plus clair.
Croupion.	Jaune verdâtre.
Queue.	Comme la mâle mais d'un gris bleuté plus clair.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Couleur chair foncé légèrement flammé de gris.
Pattes. Doigts.	Couleur chair foncé.
Ongles.	Foncés.

4.1.9 Pinson des arbres Mâle et Femelle Brun-Opale (*Fringilla coelebs*)

Mutation Brun-Opale



FIGURE 14 – Pinson des arbres Mâle Brun-Opale. Photo Alois Van Mingerroet. Photo KBOF.



FIGURE 15 – Pinson des arbres Femelle Brun-Opale. Photo Alois Van Mingerroet. Photo KBOF.

Taille du corps : 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête. Dos. Épaules.	Le plumage est presque totalement dépourvu de pigmentation en eumélanine.
Gorge. Poitrine. Flancs.	Il subsiste un léger voile de phaéomélanine sur le dos, les rémiges et les rectrices.
Ventre. Ailes. Croupion.	Le dos et le poitrail et le croupion sont jaune crème chez le mâle, beige très clair chez la femelle.
Queue. Yeux.	Brun.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

4.1.10 Pinson du Nord (*Fringilla montifringilla*)

Phénotype ancestral



FIGURE 16 – Pinson du Nord Mâle en plumage Hivernal. Photo H. Heinzel.



FIGURE 17 – Pinson du Nord Femelle en plumage Hivernal. Photo H. Heinzel.



FIGURE 18 – Pinson du Nord Mâle en plumage Nuptial. Photo H. Heinzel.

4.1.11 Pinson du Nord Mâle (*Fringilla montifringilla*)

Phénotype ancestral



FIGURE 19 – Pinson du Nord Mâle en plumage Nuptial. Photo P. Rocher.

Défauts :

- 1) Cercle oculaire irrégulier,
- 2) Taches claires entre le bec et les yeux (lorum),
- 3) Couleur de la poitrine délavée,
- 4) Pattes bicolores,
- 5) Taches blanches ou noires sur le menton,
- 6) Spots trop groupés sur les flancs,
- 7) Ligne de séparation de la poitrine irrégulière,
- 8) Miroirs des ailes absents ou trop peu visibles,
- 9) Stries brunâtre de la tête de la femelle irrégulières.

Taille du corps : 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Jaunâtre avec pointe noire.
Yeux.	Brun foncé.
Tête. Front. Vertex. Nuque. Joues. Région auriculaire.	De couleur noirâtre, liserée de brun-gris. Cette couleur est uniformément répartie. En été, la tête est complètement noire.
Dos.	Noir écaillé de gris-brun (noir en été).
Croupion.	Blanc.
Gorge.	Brun noisette.
Poitrine.	De couleur brun noisette, sans voile, et uniformément répartie sur l'ensemble de la poitrine. La ligne qui sépare le brun de la poitrine et le blanc du ventre doit être régulière et légèrement arrondie.
Flancs.	La couleur des flancs est d'un brun clair avec de préférence deux rangées de spots noirs, le plus uniformément répartis. La première rangée sera souvent cachée par l'aile. Les spots des mâles sont plus larges et ont tendance à se grouper plus fort que chez la femelle.
Ventre.	Blanc pur.
Ailes.	Les scapulaires sont d'un brun noisette et sont bordées d'un étroit liseré clair. La barre alaire a la même couleur que la poitrine (brun noisette). Un petit miroir blanc est obligatoire. Les rémiges primaires sont d'un noir brunâtre foncé. Les rémiges secondaires sont noir brunâtre avec le vexille externe brun clair.
Queue.	Les rectrices sont noires. Les deux rectrices externes ont une grande tache blanche longitudinale sur le côté inférieur. Les sus-caudales médianes sont noirâtres avec un liseré brun à l'extrémité. L'extrémité de la queue est fourchue.
Pattes. Doigts.	Chair foncé.
Ongles.	Noirs.



FIGURE 20 – Pinson du Nord Mâle en plumage Hivernal. Photo P. Rocher.

4.1.12 Pinson du Nord Femelle (*Fringilla montifringilla*)

Phénotype ancestral



FIGURE 21 – Pinson du Nord Femelle en plumage Nuptial. Photo E. Gomez.

Taille du corps : 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Comme chez le mâle, mais les teintes sont brun gris dans l'ensemble. Les deux raies brunâtres partent du haut de la tête et descendent vers la nuque.
Dos.	Dessin écaillé typique de couleur gris brun.
Ailes.	Comme le mâle, mais d'une couleur plus terne.
Flancs.	Les spots doivent être bien répartis et réguliers sur deux rangées et sur un fond brun clair.
Poitrine. Ventre.	La couleur ne peut pas être délavée, mais d'un brun noisette, qui sera Blanc grisâtre.
Queue.	Brun foncé et fourchue.
Dos.	Dessin écaillé typique de couleur gris brun.
Pattes. Doigts.	Chair foncé.
Ongles.	Noirs.

4.2 Venturons

Venturons

4.2.1 Venturon montagnard (*Carduelis cintrina*)

Phénotype ancestral



FIGURE 22 – Venturon montagnard Mâle et Femelle. Photo H. Heinzl.

Défauts :

- 1) Manque de luminosité dans la couleur,
- 2) Dessins flous et mal délimités,
- 3) Barres alaires irrégulières,
- 4) Manque d'élégance dans la forme.

4.2.2 Venturon montagnard Mâle (*Carduelis cintrina*)

Phénotype ancestral



FIGURE 23 – Venturon montagnard Mâle.

Taille du corps : 12 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Pointu, fin, gris-noirâtre.
Yeux.	Brun-noir.
Tête.	Fine, dessus et côtés de la tête, nuque et côtés du cou gris-bleuté uni. Masque circulaire : jaune-vert lumineux couvrant le front, la région oculaire, le bas des joues et le menton.
Dos.	Vert-olive, marqué de stries gris-brun légères et assez floues.
Gorge. Poitrine.	Jaune-vert, lumineux comme le masque.
Flancs.	Verts, lavés de gris.
Ventre.	Zone anale et sous-caudales : jaunes.
Ailes.	Rémiges : Noir-verdâtre avec liseré externe gris-vert. Couvertures : Noirâtres avec large liseré verdâtre, dessinant une double barre alaire.
Croupion.	Jaune-vert uni.
Queue.	Rectrices : Noir-verdâtre, liserées de gris-vert.
Pattes. Doigts.	Gris-brun.
Ongles.	Brun-noir.
Forme Générale.	Fine et élégante.

4.2.3 Venturon montagnard Femelle (*Carduelis cintrina*)

Phénotype ancestral



FIGURE 24 – Venturon montagnard Femelle. Photo E. Gomez.

Taille du corps : 12 cm.

La femelle a la même livrée que le mâle avec des teintes un peu plus ternes, un masque moins étendu et des stries un peu plus marquées. Le gris-bleuté n'est pas interrompu à la gorge.

22

22. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

4.2.4 Venturon Corse Mâle (*Carduelis corsicana*)

Phénotype ancestral



FIGURE 25 – Venturon Corse Mâle. Photo R. Rojas.

Taille du corps : 12 cm.

Chez l'espèce *Carduelis corsicana* :

- 1) le manteau est brun-chaud et la poitrine vert-jaune plus vif.
- 2) La femelle est plus terne.

4.2.5 Serin des canaris Mâle (*Serinus canaria*)

Phénotype ancestral



FIGURE 26 – Serin des canaris Mâle. Photo : P. Rocher.

Taille du corps : 12-13,5 cm. Masse : 15-20 g.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Couleur corne grisâtre, mandibule supérieure souvent plus foncée.
Yeux.	Iris brun foncé ou noirâtre, cercle oculaire brun souligné de jaune sous l'oeil.
Couronne. Nuque.	Jaune verdâtre ou gris verdâtre finement strié de noirâtre.
Front.	Jaune prolongé par-dessus l'oeil et vers la nuque par un large « sourcil » jaune doré qui se poursuit en entourant toute la joue sur les côtés du cou.
Lores. Joues.	Les lores sont gris clair. Dans leur prolongement, derrière l'oeil part une petite ligne brune. Sous l'oeil, il y a 2 petites bandes courbes : la première est jaune et l'autre brun clair. La « moustache » olive foncé qui descend vers le cou est encadrée de 2 bandes jaunes. Le centre de la joue est gris clair mêlé de jaune olive.
Manteau. Dos. Scapulaires.	Gris cendré avec centre des plumes noirâtre et bords jaune verdâtre.
Couvertures alaires.	<u>Petites couvertures</u> : Jaune olive. <u>Moyennes et grandes couvertures</u> : Noires bordées de jaune verdâtre et terminées de jaune pour les premières et de chamois pâle pour les secondes (ce qui forme 2 barres alaires). Tectrices primaires noires.
Rémiges.	Brun-noir finement bordées de jaune pâle. Les tertiaires ont des extrémités internes plus larges blanchâtres ou chamois clair.
Croupion. Sus-caudales.	Le croupion est jaune verdâtre et les sus-caudales brun sombre avec extrémités grises.
Queue.	Les rectrices sont brun sombre largement bordées de vert pâle.
Menton. Gorge. Poitrine. Flancs. Haut du ventre.	Jaune doré terne délavé de vert olive avec un peu de gris verdâtre sur les côtés de la poitrine et les flancs (striés de vert foncé ou de noir).
Bas du ventre. Cuisses. Sous-caudales.	Blanchâtres.
Pattes. Doigts.	Brun-noir violacé.
Ongles.	Noirs.



FIGURE 27 – Serin des canaris Mâle. Photo : P. Rocher.

4.2.6 Serin des canaris Femelle (*Serinus canaria*)

Phénotype ancestral



FIGURE 28 – Serin des canaris Femelle. Photo : S. Chartier. Élevage M. Brau.

Taille du corps : 12-13,5 cm. Masse : 15-20 g.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Couleur corne grisâtre, mandibule supérieure souvent plus foncée.
Yeux.	Iris brun foncé, cercle oculaire gris clair plus blanc sous l'oeil.
Front. Couronne. Nuque.	Gris fortement strié de noir.
Lores. Sourcils. Tour de l'oeil.	Les lores sont gris clair. Partant de la base de la mandibule supérieure part un sourcil jaune mêlé de gris qui s'arrête peu après le dessus de l'oeil. Ce dernier est entouré de jaune blanchâtre.
Joues.	Grises avec quelques traces de jaune et une « moustache » brun verdâtre à peine marquée.
Manteau. Dos. Scapulaires.	Gris clair ou cendré avec centre des plumes noirâtre et bords beige brunâtre.
Couvertures.	<u>Petites couvertures</u> : Grises. <u>Moyennes et Grandes couvertures</u> : Noires bordées de jaune verdâtre et terminées de jaune pâle pour les premières et de chamois pâle pour les secondes (ce qui forme 2 barres alaires). <u>Tectrices primaires</u> : Noires.
Rémiges.	Brun-noir finement bordées de jaune pâle. Les tertiaires ont des extrémités internes plus larges blanchâtres ou chamois clair.
Queue.	Les rectrices sont brun sombre largement bordées de vert pâle.
Poitrine.	Gris clair mêlé de jaune clair et de quelques stries sur les côtés.
Région anale. Cuisses. Sous-caudales.	Blanches ou blanchâtres.
Pattes. Doigts.	Brun-noir violacé.
Ongles.	Noirs.



FIGURE 29 – Serin des canaris Femelle. Photo : JM. Fenerole.

4.3 Serins

Serins

4.3.1 Serin cini (*Serinus serinus*)



FIGURE 30 – Serin cini Mâle et Femelle. Photo : H. Heinzel.

Défauts :

- 1) Couleur terne et délavée chez le mâle,
- 2) Stries des flancs irrégulières,
- 3) Dessin de la tête irrégulier,
- 4) Barres alaires irrégulières.

26

26. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

4.3.2 Serin cini Mâle (*Serinus serinus*)

Phénotype ancestral



FIGURE 31 – Serin cini Mâle. Photo E. Gomez.

Taille du corps : 11 cm

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Petit, court, conique et gris foncé.
Yeux.	Brun foncé,
Tête.	Jaune vif partant de la base du bec jusqu'aux yeux passant par du gris vert, strié de brun gris sur la nuque et les joues. Certains vieux mâles ont une tache jaune sur les joues.
Cou.	Demi-collier jaunâtre.
Dos.	Gris brunâtre strié de noir.
Épaules.	Gris brunâtre.
Poitrine.	Jaune vif.
Gorge.	Jaune vif.
Flancs. Ventre.	Passant du jaune clair dans la région des épaules au gris clair près du gris clair.
Ailes.	Brun noir avec un liseré jaune verdâtre au bord extérieur des rémiges.
Croupion.	Jaune vif.
Queue.	Brun noir.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Brun foncé.

4.3.3 Serin cini Femelle (*Serinus serinus*)

Phénotype ancestral



FIGURE 32 – Serin cini Femelle. Photo A. Cazadilla.

Taille du corps : 11 cm

La femelle a les mêmes caractéristiques que le mâle, mais la couleur jaune vif du mâle est plus atténuée chez la femelle. La femelle est plus striée que le mâle, sur la gorge, la poitrine et les flancs. Les stries sont plus larges et plus distinctes.

28

28. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

4.4 Sizerins

Sizerins

4.4.1 Sizerin flammé (*Acanthis flammea flammea*)



FIGURE 33 – Sizerin cabaret 1 ière année et Adulte. Photo : H. Heinzel.

Défauts concernant les sizerins cabaret et flammé en mâles et femelles :

- 1) Trop culotté (peut être légèrement culotté),
- 2) Traits sourciliers irréguliers,
- 3) Tache de menton (bavette) trop grande ou dentelée,
- 4) Stries des flancs irrégulières,
- 5) Couleur de bec rougeâtre (cette couleur est anormale),
- 6) Bande alaire irrégulière ou incomplète.

4.4.2 Sizerin cabaret (*Acanthis flammea cabaret*)

Phénotype ancestral



FIGURE 34 – Sizerin cabaret.

Remarques : Sexes identiques.

29

29. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

Taille du corps : 11,5 cm

Zone du plumage	Couleur
Front.	Brunâtre. La moitié du vertex est rouge carmin ou jaune brun selon les spécimens.
Joues. Région auriculaire.	Brun foncé. Dessin en forme de demi-lune.
Traits sourciliers.	Couleur légèrement brunâtre. Étroits et réguliers. Du dessus des yeux à la nuque.
Cou. Dos. Épaules.	Bruns avec des stries étroites et régulières brun foncé.
Gorge.	Brun chaud. Petite bavette brun foncé.
Poitrine.	Haut et côtés rose carmin, parfois brun chaud.
Flancs. Ventre.	Blanc sale. Flancs régulièrement striés de fines raies brun foncé qui partent à la hauteur des épaules et qui descendent tout le long des flancs.
Ailes. Queue.	Grandes rémiges et rectrices brun très foncé, liserées de brun très pâle aux extrémités. Deux barres alaires beige léger.
Croupion.	Lavé de rose carmin ou brun chaud, strié de brun foncé.
Bec.	Fin et pointu. Mandibule supérieure brunâtre et inférieure jaunâtre.
Yeux.	Brun foncé.
Pattes. Doigts.	Brun foncé.
Ongles.	Noirs.

4.4.3 Sizerin flammé (*Acanthis flammea flammea*)

Phénotype ancestral



FIGURE 35 – Sizerin flammé 1^{ère} année. Photo H. Heinzel.

Remarques : Sexes identiques.



FIGURE 36 – Sizerin flammé. Photo UOF Pierre Malburet.

Défauts : Différence avec le sizerin cabaret :

- 1) Plus grand en taille (13 - 15 cm),
- 2) Couleur de fond plus pale, brun beige,
- 3) Stries brunes légèrement plus claires,
- 4) Barres alaires plus claires et plus visibles,
- 5) Bec rouge,
- 6) Tache plus claire dans le dos (caractéristique de l'espèce).

4.4.4 Sizerin flammé Brun (*Acanthis flammea flammea*)

Mutation Brune.



FIGURE 37 – Sizerin flammé Brun. Photo 1 FOI. Photo 2 UOF. S. Chartier.

Remarques : Chez le brun facteur foncé il n'y a pas de blanc sous la poitrine. Et le brun est plus chaud en couleur.

Dimorphisme sexuel : Teintes et marques identiques chez les femelles mise à part la poitrine et les flancs légèrement plus clairs. Pas de rose sur la poitrine et le croupion..

Taille du corps : 11,5 cm pour le Cabaret. Entre 13 et 15 cm pour le Flammé.

30

30. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

4.4.5 Sizerin flammé Pastel (*Acanthis flammea flammea*)

Mutation Pastel. (~~ex. Agate~~)




FIGURE 38 – Sizerin flammé Pastel. Photo 1 B. Cormelieu. Photo 2 FOI.

Taille du corps : 11,5 cm pour le Cabaret. Entre 13 et 15 cm pour le Flammé.

31. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

4.4.6 Sizerin flammé Brun-Pastel (*Acanthis flammea flammea*)
Mutation Brun-Pastel. (ex. Isabelle)



FIGURE 39 – Sizerin flammé Brun-Pastel. Photo 1 P. Rocher.
Photo 2 Y. Cornillon.

Taille du corps : 11,5 cm pour le Cabaret. Entre 13 et 15 cm pour le Flammé.

32

32. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

4.4.7 Sizerin flammé Écaillé (*Acanthis flammea flammea*)

Mutation Écaillé. (ex. Pastel)



FIGURE 40 – Sizerin flammé Écaillé. Photo R. Driesmans.

Taille du corps : 11,5 cm pour le Cabaret. Entre 13 et 15 cm pour le Flammé.

33. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

4.4.8 Sizerin flammé Brun-Écaillé (*Acanthis flammea flammea*)
Mutation Brun-Écaillé. (~~ex. Brun-Pastel~~)



FIGURE 41 – Sizerin flammé Brun-Écaillé. Photo BOF.

Taille du corps : 11,5 cm pour le Cabaret. Entre 13 et 15 cm pour le Flammé.

34. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

4.4.9 Sizerin flammé Facteur Foncé (*Acanthis flammea flammea*)
Mutation Facteur Foncé.



FIGURE 42 – Sizerin flammé Facteur Foncé. Photo P. Rocher.

Taille du corps : 11,5 cm pour le Cabaret. Entre 13 et 15 cm pour le Flammé.

35

35. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

4.4.10 Sizerin flammé Pastel Facteur Foncé (*Acanthis flammea flammea*)

Mutation Pastel Facteur Foncé. (~~ex-agate foncé~~)



FIGURE 43 – Sizerin flammé Pastel Facteur Foncé. Photo KBOF.

Taille du corps : 11,5 cm pour le Cabaret. Entre 13 et 15 cm pour le Flammé.

36

36. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

4.4.11 Sizerin flammé Brun Facteur Foncé (*Acanthis flammea flammea*)

Mutation Brun Facteur Foncé.



FIGURE 44 – Sizerin flammé Brun Facteur Foncé. Photo 1 R. Driesmans.

Taille du corps : 11,5 cm pour le Cabaret. Entre 13 et 15 cm pour le Flammé.

37. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

Zone du plumage	Couleur
Front.	Brun avec le vertex rouge foncé.
Joues.	Brun foncé.
Région auriculaire.	
Dos.	Brun foncé avec un léger dessin dorsal.
Gorge.	Brun foncé avec une très grande bavette plus foncée.
Poitrine.	Brun foncé avec des stries visibles sur le haut de la poitrine.
Flancs.	Bruns striés de fines raies brun foncé partant des épaules vers l'arrière.
Ventre.	Brun beige.
Ailes.	Grandes rémiges : Brun foncé avec un très petit liseré beige. Barre alaire pratiquement invisible.
Croupion.	Brun foncé strié.
Queue.	Rectrices brun foncé avec un très petit liseré beige.
Bec.	Jaunâtre flammé de brun.
Pattes.	
Doigts.	Bruns.
Ongles.	
Yeux.	Brun foncé.

4.4.12 Sizerin flammé Phéo (*Acanthis flammea flammea*)

Mutation Phéo.



FIGURE 45 – Sizerin flammé Phéo. Photo 1 R. Driesmans. Photo 2 P. Rocher.

Taille du corps : 11,5 cm pour le Cabaret. Entre 13 et 15 cm pour le Flammé.

38. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

Zone du plumage	Couleur
Front.	Brun clair non-strié, avec la calotte rouge ou orange.
Nuque.	Blanchâtre striée de brun.
Dos.	Blanchâtre écaillé de brun.
Gorge. Ventre.	Blanchâtre.
Poitrine.	Blanchâtre avec des écailles brunes sur le haut.
Flancs.	Blanchâtres écaillés de brun.
Ailes.	<u>Rémiges primaires</u> : Blanches avec léger liseré externe brun. <u>Rémiges secondaires</u> : Blanche avec un liseré brun plus large. <u>Couvertures blanchâtres</u> : Avec un large liseré brun à l'extrémité. Scapulaires blanchâtres avec des écailles brunes.
Croupion.	Blanc avec de larges liserés bruns.
Queue.	Rectrices blanches avec un liseré brun.
Bec.	Jaune à base blanchâtre (comme les contours des yeux et la bavette).
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur corne.
Yeux.	Rouges.

Défauts :

- 1) Couleur blanche pas assez lumineuse,
- 2) Liseré brun trop clair,
- 3) Dominante brune terne, brun pas assez chaud,
- 4) Interstries trop brunâtres ne faisant pas ressortir le dessin phaéo brun,
- 5) Coloration de la poitrine la première année pour les mâles.

4.4.13 Sizerin blanchâtre (*Acanthis hornemanni*)

Phénotype ancestral.



FIGURE 46 – Sizerin blanchâtre. Photo H. Heinzel.



FIGURE 47 – Sizerin blanchâtre. Photo P. Rocher.

Taille du corps : 14 cm.

Défauts :

- 1) Trop culotté (peut être légèrement culotté),
- 2) Traits sourciliers irréguliers,
- 3) Bavette irrégulière,
- 4) Stries des flancs irrégulières,
- 5) Couleur du bec rougeâtre,
- 6) Bande alaire irrégulière ou incomplète,
- 7) Excès de coloration rouge.

39

39. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Conique, fin et pointu de couleur de corne jaunâtre. La mandibule supérieure est plus foncée que l'inférieure.
Yeux.	Noirs.
Tête.	1) Ronde, bien enchâssée dans les épaules. 2) Fine bande frontale et lorums brun-noirâtre. 3) Tache rose carmin en forme de casque partant du front et couvrant la moitié du crâne. 4) Ligne oculaire gris-brun surmontée d'un fin sourcil gris-beige. 5) Arrière du crâne et nuque : Gris-beige, striés de noirâtre. 6) Dessin des joues légèrement marqué.
Dos.	Beige-grisâtre marqué régulièrement de stries brun noir, avec une zone plus claire au centre.
Gorge.	Petite bavette noir-brun au menton. Gorge blanchâtre, un très léger reflet rose peut parfois apparaître,
Poitrine.	Blanchâtre comme la gorge, peut être aussi légèrement rose.
Flancs.	Beige-grisâtre très clair, striés de brun-noir.
Ventre.	Blanc.
Ailes.	Grandes rémiges : Noirâtres, finement liserées de brun clair. <u>Rémiges secondaires</u> : Noirâtres, portant un liseré gris-beige plus large. <u>Couvertures</u> : Noirâtres, bordées de blanc sale formant une double barre alaire.
Croupion.	Blanchâtre, légèrement strié ou lavé de rose accepté.
Queue.	<u>Rectrices</u> : Noirâtres, portant un liseré gris-beige.
Pattes. Doigts.	Brun-noir.
Ongles.	Noir.
Forme Générale.	Assez ronde, trapue et élégante.



FIGURE 48 – Sizerin blanchâtre.

4.5 Linottes

Linottes

4.5.1 Linotte mélodieuse (*Linaria cannabina*)



FIGURE 49 – Linotte mélodieuse en Mâle et Femelle. Plumage Nuptial.
Photo : H. Heinzl.

Défauts :

- 1) Dessin de tête, de la gorge et des joues irréguliers,
- 2) Stries des flancs irrégulières,
- 3) Le vexille blanc des rémiges et des rectrices non visibles
- 4) Dessin de la poitrine irrégulier chez la femelle.

4.5.2 Linotte mélodieuse Mâle (*Linaria cannabina*)

Phénotype ancestral.



FIGURE 50 – Linotte mélodieuse. Photo E. Gomez.

Taille du corps : 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Gris-brun clair en hiver avec la mandibule inférieure plus claire.
Yeux.	Brun foncé.
Tête.	<u>Front et couronne</u> : Brun cannelle avec sourcils crème et une tache crème sur chaque joue.
Dos.	Brun marron.
Épaules.	Brun marron.
Poitrine.	De couleur beige striée de brun noir.
Gorge. Menton.	Blanchâtre avec stries brun foncé.
Flancs.	Brun clair avec des fines stries brun foncé.
Ventre.	Blanchâtre.
Ailes.	<u>Grandes rémiges primaires</u> : Noires avec un liseré externe blanc. <u>Rémiges secondaires</u> : Brun marron.
Croupion.	Cannelle clair, légèrement strié de raies interrompues.
Queue.	Rectrices noires avec un liseré blanc le long du vexille externe.
Pattes. Doigts.	Brunâtre.
Ongles.	Noirs.
Bec.	Gris-brun clair en hiver avec la mandibule inférieure plus claire.



FIGURE 51 – Linotte mélodieuse Mâle. Photo Internet.

4.5.3 Linotte mélodieuse Femelle (*Linaria cannabina*)

Phénotype ancestral.



FIGURE 52 – Linotte mélodieuse Femelle. Photo E. Gomez.

Mêmes caractéristiques que le mâle mais la poitrine, la tête et les flancs sont plus striés que chez le mâle et non coloré.

41

41. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

4.5.4 Linotte à bec jaune (*Linaria flavirostris*)

Phénotype ancestral.



FIGURE 53 – Linotte à bec jaune. Photo H. Heinzel.

Défauts :

- 1) Liseré blanc des rémiges pas visible,
- 2) Dessin irrégulier des flancs et de la poitrine,
- 3) Tête plate,
- 4) Pattes trop claires.

4.5.5 Linotte à bec jaune (*Linaria flavirostris*)

Phénotype ancestral.



FIGURE 54 – Linotte à bec jaune. Photo FOI.

La femelle ressemble au mâle mais est de couleur plus pâle. Le croupion n'est jamais carmin mais brun gris léger avec des stries noires et étroites.

42

42. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

Taille du corps : 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Petit, jaune avec pointe noirâtre.
Yeux.	Brun foncé.
Tête.	Petite et ronde. Front, couronne, joues et nuque : Brun ocre, striés de noir. <u>Lorums</u> : De couleur rouille.
Dos.	Brun ocre, strié de brun noirâtre.
Épaules.	Jaune ocre.
Poitrine.	Brun ocre avec des stries brun foncé, partant du milieu de la poitrine vers les flancs.
Gorge.	Brun ocre, légèrement strié.
Flancs.	Brun ocre avec des stries brun foncé et bien régulières.
Ventre.	Blanc sale.
Ailes.	Brun noirâtre avec un étroit liseré blanc le long du vexille externe des rémiges
Croupion.	Rose carmin dans la nature mais ocre roux n'est pas fautif.
Queue.	Brun noirâtre avec liseré blanchâtre le long du vexille externe, l'extrémité de la queue fourchue.
Pattes. Doigts.	Brun noirâtre.
Ongles.	Noirs.
Bec.	Gris-brun clair en hiver avec la mandibule inférieure plus claire.

4.6 Tarin des aulnes

Tarins

4.6.1 Tarin des aulnes (*Spinus spinus*)



FIGURE 55 – Tarin des aulnes en Mâle et Femelle. Photo : H. Heinzel.

Défauts :

- 1) Lunettes : les 2 petites tâches jaune (mâle) ou grise (femelle) sur le front,
- 2) Traits sourciliers qui dépassent l'oeil en direction du front,
- 3) Traits sourciliers trop larges,
- 4) Bavette grande ou irrégulière,
- 5) Barres alaires irrégulière,
- 6) Absence du petit miroir,
- 7) Stries des flancs irrégulières,
- 8) Couleur de fond trop jaune pour les femelles,
- 9) Poitrine du mâle jaune intense au lieu de verdâtre.

4.6.2 Tarin des aulnes Mâle (*Spinus spinus*)

Phénotype ancestral.



FIGURE 56 – Tarin des aulnes Mâle. Photo P. Rocher.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Front. Vertex. Occiput. Calotte.	Noirs avec la calotte légèrement pointillé de gris.
Joues. Région auriculaire.	Jaune grisâtre légèrement voilé.
Traits sourciliers.	Jaunâtres partant de derrière l'oeil et s'élargissant vers le cou.
Cou. Nuque. Scapulaires. Dos.	Verdâtres avec de fines stries foncées.
Poitrine. Gorge.	Vert jaunâtre. Certains mâles ont une petite bavette (nullement obligatoire) noire sur le haut de la gorge, elle doit être petite et régulière.
Flancs.	Gris verdâtre avec des stries noirâtres qui doivent être bien régulières de chaque côté du corps.
Ventre. Région anale.	Légèrement grisâtre.
Ailes.	Grandes Rémiges : Noir brunâtre avec le vexille externe jaune. Rémiges Secondaires : Liserées de grisâtre à leur extrémité. Barre alaire jaune et petit miroir jaune.
Croupion.	Jaune verdâtre.
Queue.	Deux premiers tiers jaunes et extrémité noire. Rectrices médianes noires.
Bec.	Fin, pointu, de couleur corne claire, flammé de noir.
Yeux.	Brun foncé.
Pattes. Doigts.	Chair foncé.
Ongles.	Noirs.

4.6.3 Tarin des aulnes Femelle (*Spinus spinus*)

Phénotype ancestral.



FIGURE 57 – Tarin des aulnes Femelle.

Les femelles doivent avoir une couleur de fond la plus grise possible.

44

44. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Front. Vertex. Occiput.	Grisâtres avec de fines stries entrecoupées.
Joues. Région auriculaire.	Brunâtres voilés jaune.
Traits sourciliers.	Beaucoup moins jaunes que chez le mâle mais plutôt de couleur brun grisâtre.
Cou. Dos. Épaules.	Grisâtres finement striés de brun noirâtre.
Poitrine. Gorge. Flancs.	Grisâtres dans l'ensemble. Les côtés de la poitrine et surtout les flancs ont un beau dessin strié, bien régulier, net, de couleur gris foncé.
Ventre. Région anale.	Grisâtres.
Ailes.	Gris foncé avec les mêmes marques que le mâle.
Croupion.	Jaune verdâtre, légèrement strié de gris foncé.
Queue.	Deux premiers tiers jaune, le reste est noir-gris. Rectrices médianes noir-gris.
Sous-Caudales.	Présence d'un dessin écaillé.
Bec.	Fin, pointu, de couleur corne claire, flammé de noir.
Yeux.	Brun foncé.
Pattes. Doigts.	Chair foncé.
Ongles.	Noirs.

4.6.4 Tarin des aulnes Mâle Brun (*Spinus spinus*)
Mutation Brune.



FIGURE 58 – Tarin des aulnes Mâle Brun. Photo P. Rocher.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Front. Vertex.	Brun très foncé. La calotte est nuancée et pointillée de beige.
Occiput.	
Joues.	Jaune verdâtre lavées de brun.
Traits sourciliers.	Jaunes.
Gorge.	Bavette brun foncé si elle est présente.
Poitrine.	Verdâtre lavée de beige.
Croupion.	Jaune verdâtre.
Queue.	Deux premiers tiers jaunes et extrémité brun très foncé. Rectrices médianes brunes, très foncées.
Ailes.	Grandes rémiges brun foncé avec un léger liseré jaune le long du vexille externe. Épaules jaune verdâtre lorsqu'elles sont visibles.
Flancs.	Couleur de fond blanc jaunâtre avec stries brun foncé.
Dos.	Manteau couleur verdâtre strié de brun avec un voile brun clair sur le dos.
Bec.	Couleur corne à la base avec l'extrémité de la mandibule supérieure brun noir.
Yeux.	Brun foncé.
Pattes. Doigts.	Bruns.
Ongles.	Foncés.



FIGURE 59 – Tarin des aulnes Mâle Brun.

4.6.5 Tarin des aulnes Femelle Brune (*Spinus spinus*)

Mutation Brune.



FIGURE 60 – Tarin des aulnes Femelle Brune.

Défauts :

- 1) Manteau trop verdâtre,
- 2) Poitrine trop lipochrome,
- 3) Joues grisâtres pas assez brunes,
- 4) Ongles clairs,
- 5) Queue : Deux derniers tiers trop clairs, idem pour les rectrices médianes (normalement brun foncé).

46

46. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Front. Vertex. Occiput.	Brun verdâtre striés de brun foncé.
Joues.	Grisâtres lavées de brun.
Traits sourciliers.	Jaunâtres.
Croupion.	Jaune verdâtre légèrement strié de brun.
Queue.	Premier tiers jaune et deux derniers tiers brun foncé. Rec- trices médianes brunes, très foncées.
Ailes.	Grandes rémiges : Brun foncé avec un léger liseré jaune le long du vexille externe. Rémiges secondaires : Au liseré jaunâtre avec barre alaire chamois et miroir jaune pâle.
Épaules.	Jaune verdâtre lorsqu'elles sont visibles.
Poitrine.	Blanc sale striée de brun.
Flancs.	Couleur de fond beige avec stries brun foncé.
Dos.	Manteau verdâtre lavé de brun assez foncé strié de brun foncé.
Bec.	Couleur corne à la base avec l'extrémité de la mandibule supérieure brun noir.
Yeux.	Brun foncé.
Pattes. Doigts.	Bruns.
Ongles.	Foncés.

4.6.6 Tarin des aulnes Mâle Agate (*Spinus spinus*)

Mutation Agate.



FIGURE 61 – Tarin des aulnes Mâle Agate. Photo Guy Doumergue

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Front. Vertex. Occiput.	
Joues.	
Traits sourciliers.	
Gorge.	
Poitrine.	
Croupion.	
Queue.	
Ailes.	
Flancs.	
Dos.	
Bec.	
Yeux.	
Pattes. Doigts.	
Ongles.	

4.6.7 Tarin des aulnes Femelle Agate (*Spinus spinus*)

Mutation Agate.



FIGURE 62 – Tarin des aulnes Femelle Agate. Élevage Paolo Gregorutti.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Front. Vertex. Occiput.	
Joues.	
Traits sourciliers.	
Gorge.	
Poitrine.	
Croupion.	
Queue.	
Ailes.	
Flancs.	
Dos.	
Bec.	
Yeux.	
Pattes. Doigts.	
Ongles.	

4.6.8 Tarin des aulnes Mâle Brun Dilué (*Spinus spinus*)

Mutation Brune Diluée.



FIGURE 63 – Tarin des aulnes Mâle Brun Dilué. Photo JP. Hennbique.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Front. Vertex. Occiput.	Bruns, lavés de vert. Vertex écaillé de beige.
Trait oculaire.	Jaune.
Joues.	Jaunâtres, lavées de brun.
Dos.	Vert brunâtre strié de brun foncé.
Gorge. Poitrine.	Jaune clair avec un léger voile beige. Bavette brun foncé. Poitrine plus claire.
Flancs.	Jaunâtres lavés de beige à l'avant et grisâtre lavé de beige à l'arrière. Stries brunes.
Ailes.	<u>Rémiges</u> : Diluées en gris brun avec bord du vexille externe jaune brunâtre. <u>Couvertures</u> : Terminées par du jaune verdâtre, bordées de brun clair, d'où une bande alaire jaune verdâtre bordée de brun clair.
Croupion.	Jaune verdâtre strié de brun foncé.
Queue.	Deux premiers tiers jaunâtres et extrémité gris brun. Rectrices médianes gris brun, très foncées. Sous-caudales jaune verdâtre striées de brun foncé.
Bec.	Brunâtre, flammé de brun foncé à la mandibule supérieure.
Pattes. Doigts.	Chair.
Yeux.	Brun foncé.
Ongles.	Brun foncé.

4.6.9 Tarin des aulnes Femelle Brun Dilué (*Spinus spinus*)

Mutation Brune Diluée.



FIGURE 64 – Tarin des aulnes Femelle Brune Dilué. Photo P. Rocher.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Front. Vertex. Occiput.	Bruns striés de brun foncé.
Trait oculaire.	Jaune clair.
Joues.	Jaunâtres lavées de brun foncé.
Poitrine. Gorge.	Gris clair légèrement striée de brun.
Flancs.	Gris clair lavé de beige. Stries brun foncé.
Croupion.	Jaune verdâtre strié de brun foncé.
Dos.	Brun verdâtre strié de brun foncé.
Ailes.	<u>Rémiges</u> : Diluées en gris brun avec bord du vexille externe jaune brunâtre. <u>Couvertures</u> : Terminées par du jaunâtre, bordées de brun clair, d'où une bande alaire jaunâtre bordée de brun clair.
Queue.	Premier tiers jaunâtre et deux derniers tiers bruns. Rectrices médianes brun gris. Sous-caudales gris beige striées de brun.
Bec.	Brunâtre flammé de brun foncé à la mandibule supérieure.
Yeux.	Brun foncé.
Pattes. Doigts.	Chair.
Ongles.	Brun foncé.

4.6.10 Tarin des aulnes Mâle Brun Double Dilué (*Spinus spinus*)
Mutation Brune Double Diluée.



FIGURE 65 – Tarin des aulnes Mâle Brun Double Dilué.

Défauts :

- 1) Manteau pas assez brun,
- 2) Poitrine trop lipochrome,
- 3) Lipochrome pas assez lumineux,
- 4) Ongles foncés,
- 5) Queue pas assez grise (doit être gris clair) et tirant sur le brun.

51

51. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Vertex. Occiput. Dos.	Brun beige. Manteau sans stries.
Traits sourciliers.	Jaunes.
Joues.	Brunes striées de blanc.
Gorge. Poitrine. Flancs.	Bavette pratiquement devenue invisible. Jaunâtre légèrement striée de brun beige.
Ventre.	Blanc sale.
Couvertures.	<u>Petites</u> : Brun beige. <u>Moyennes et Grandes</u> : Jaune pâle bordées de jaune foncé.
Rémiges.	<u>Secondaires</u> : Gris très clair avec vexille externe jaune et portant une bande alaire jaune intense. <u>Primaires</u> : Gris très clair avec vexille externe jaune. Pas de miroir visible.
Croupion.	Jaune strié de brun.
Queue.	Deux premiers tiers jaunes et extrémité gris très clair avec vexille externe jaune. Rectrices médianes gris très clair.
Bec.	Chair flammé à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux.	Brun foncé.
Pattes. Doigts.	Chair.
Ongles.	Corne claire.



FIGURE 66 – Tarin des aulnes Mâle Brun Double Dilué.

4.6.11 Tarin des aulnes Femelle Brune Double Dilué (*Spinus spinus*)
Mutation Brune Double Diluée.



FIGURE 67 – Tarin des aulnes Femelle Brun Double Dilué. Photo P. Rocher.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Vertex. Occiput. Manteau.	Brun beige avec un dessin strié léger. Manteau sans stries.
Traits sourciliers.	Jaune clair.
Joues.	Brunes, striées de blanc.
Gorge. Poitrine.	Gris très clair. Poitrine striée de brun beige.
Flancs.	Beiges, striés de brun.
Croupion.	Jaune strié de brun.
Ventre.	Blanc sale.
Queue.	Premier tiers jaunâtre et deux derniers tiers beiges avec vexille externe jaunâtre. Rectrices médianes beiges.
Couvertures.	<u>Petites</u> : Brun beige. <u>Moyennes et Grandes</u> : Jaunâtres bordée de jaune foncé.
Rémiges.	<u>Secondaires</u> : Beige avec vexille externe jaune pâle et portant une bande alaire jaune. <u>Primaires</u> : Beiges avec vexille externe jaune pâle. Pas de miroir visible.
Bec.	Chair flammé à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux.	Brun foncé.
Pattes. Doigts.	Chair.
Ongles.	Corne claire.

4.6.12 Tarin des aulnes Mâle Vert Dilué (*Spinus spinus*)
Mutation Vert Dilué.



FIGURE 68 – Tarin des aulnes Mâle Vert Dilué.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Vertex. Occiput. Dos.	Gris très foncé lavé de vert.
Traits sourciliers.	Jaune.
Joues.	Verdâtres lavées de gris.
Gorge. Poitrine.	Vert jaunâtre lavée de gris clair. Bavette gris foncé si elle existe.
Flancs.	Gris clair à l'arrière et gris clair lavé de verdâtre à l'avant. Stries gris foncé.
Ventre.	Blanc sale.
Couvertures.	Se terminent par du vert clair très lumineux qui donne une bande alaire verte avec des épaules vertes. Miroir jaune pâle.
Rémiges. Rectrices médianes.	Gris verdâtre. Rémiges avec bord du vexille externe jaunâtre.
Croupion. Sous-caudales.	Jaune verdâtre légèrement strié de gris.
Queue.	Deux premiers tiers jaunes et extrémité gris verdâtre.
Bec.	Brunâtre flammé de noir à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux.	Brun foncé.
Pattes. Doigts.	Chair foncée.
Ongles.	Foncés.

4.6.13 Tarin des aulnes Femelle Verte Dilué (*Spinus spinus*)
Mutation Vert Dilué.



FIGURE 69 – Tarin des aulnes Femelle Vert Dilué.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Vertex. Occiput. Front.	Gris striés de gris foncé.
Traits sourciliers.	Jaunâtres.
Joues.	Gris brun, légèrement striées.
Gorge.	Gris très clair légèrement striée de gris.
Poitrine.	Gris très clair striée de gris foncé.
Dos.	Gris brun, lavé de vert et strié de gris foncé.
Flancs.	Gris clair striés de gris foncé avec un voile brun léger.
Croupion.	Jaune verdâtre strié de gris.
Queue.	Premier tiers jaunâtre et deux derniers tiers gris verdâtre. Rectrices médianes entièrement gris verdâtre. Sous-caudales gris clair striées de gris.
Ailes.	Rémiges gris verdâtre avec le bord du vexille externe jau- nâtre. Couvertures primaires et secondaires terminées par un bord vert lavé de chamois avec miroir jaune très pâle.
Bec.	Brunâtre.
Yeux.	Brun foncé.
Pattes. Doigts.	Chair foncé.
Ongles.	Foncés.

4.6.14 Tarin des aulnes Mâle Vert Double Dilué (*Spinus spinus*)
 Mutation Vert Double Dilué.



FIGURE 70 – Tarin des aulnes Mâle Vert Double Dilué.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Vertex. Occiput.	Gris brun clair. Vertex avec un léger dessin.
Traits sourciliers.	Jaunes.
Joues.	Gris verdâtre striées de clair.
Gorge.	Jaunâtre légèrement striée de brun. Bavette pratiquement invisible.
Poitrine. Flancs.	Jaunâtre légèrement striée de gris brunâtre.
Ventre.	Blanc sale.
Dos.	Manteau gris brun jusqu'aux épaules, sans stries.
Croupion.	Jaune strié de gris brun.
Queue.	Deux premiers tiers jaunes et extrémité gris clair avec vexille externe jaune. Rectrices médianes gris clair.
Couvertures alaires.	<u>Petites</u> : Gris brun. <u>Grandes</u> : Jaune pâle bordées de jaune intense.
Rémiges.	<u>Secondaires</u> : Gris clair avec vexille jaune et portant une bande alaire jaune intense. <u>Primaires</u> : Gris clair avec vexille externe jaune. Pas de miroir.
Bec.	Chair, flammé à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux.	Brun foncé.
Pattes. Doigts.	Chair.
Ongles.	Couleur corne.

4.6.15 Tarin des aulnes Femelle Verte Double Diluée (*Spinus spinus*)
Mutation Verte Double Diluée.



FIGURE 71 – Tarin des aulnes Femelle Verte Double Diluée. Photo P. Rocher.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Vertex. Occiput.	Gris brun clair avec un dessin strié très léger.
Traits sourciliers.	Jaune clair.
Joues.	Gris brun clair, striées de clair.
Gorge. Poitrine.	Gris clair. Poitrine légèrement striée de gris brun.
Dos.	Manteau gris brun jusqu'aux épaules, sans stries.
Flancs.	Brun clair, striés de gris brun.
Croupion.	Jaune, strié de gris brun.
Queue.	Premier tiers jaune et deux derniers tiers gris clair avec vexille externe jaunâtre. Rectrices médianes entièrement gris clair.
Couvertures alaires.	<u>Petites</u> : Gris brun. <u>Moyenne</u> : Gris verdâtre bordées de jaune intense. <u>Grandes</u> : Gris verdâtre bordées de jaune intense.
Rémiges.	<u>Secondaires</u> : Gris clair avec vexille jaune pâle et portant une bande alaire jaune. <u>Primaires</u> : Gris clair avec vexille externe jaune pâle. Pas de miroir.
Bec.	Chair flammé à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux.	Brun foncé.
Pattes. Doigts.	Chair.
Ongles.	Couleur corne.

4.6.16 Tarin des aulnes Mâle Pastel (*Spinus spinus*)

Mutation Pastel.



FIGURE 72 – Tarin des aulnes Mâle Pastel.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Vertex. Occiput. Front.	Gris foncé. Nuance de couleur dans la calotte pointillée de gris.
Traits sourciliers.	Jaune.
Joues. Régions auriculaires.	Vertes lavées de gris.
Gorge.	Bavette gris foncé si elle est présente.
Poitrine. Flancs.	Vert jaunâtre. Flancs striés de gris très foncé.
Dos.	Manteau verdâtre voilé de gris avec des stries noires.
Croupion.	Verdâtre.
Queue.	Deux premiers tiers jaunes et extrémité gris très foncé. Rectrices médianes entièrement gris foncé.
Rémiges.	<u>Grandes</u> : Gris foncé avec bords externes liserés de jaune. <u>Secondaires</u> : Avec liseré grisâtre. Barre alaire et miroir jaune clair.
Bec.	Couleur chair flammé.
Yeux.	Noirs.
Pattes. Doigts.	Chair foncée.
Ongles.	Foncés.



FIGURE 73 – Tarin des aulnes Mâle Pastel.

4.6.17 Tarin des aulnes Femelle Pastel (*Spinus spinus*)

Mutation Pastel.



FIGURE 74 – Tarin des aulnes Femelle Pastel.

Défauts :

- 1) Manteau avec incrustations brunes,
- 2) Poitrine avec trop de lipochrome et pas assez grise,
- 3) Joues brunâtres,
- 4) Ongles clairs,
- 5) Queue délavée et pas assez noire. Pas en harmonie avec le manteau.

58

58. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Vertex. Occiput. Front.	Gris clair striés de noir.
Traits sourciliers.	Gris clair.
Joues. Régions auriculaires.	Grisâtres.
Poitrine.	Gris clair striée de noir dilué.
Dos.	Manteau grisâtre de noir dilué.
Flancs.	Gris clair avec des tries d'un gris très foncé.
Croupion.	Grisâtre légèrement strié de gris foncé.
Queue.	Premier tiers jaune et deux derniers tiers gris très foncé. Rectrices médianes entièrement gris très foncé.
Rémiges.	<u>Grandes</u> : Gris foncé avec bords externes liserés de jaune. Le liseré des rémiges secondaires est grisâtre. Barre alaire et miroir jaune clair.
Bec.	Couleur chair flammé.
Yeux.	Noirs.
Pattes. Doigts.	Chair foncée.
Ongles.	Foncés.

4.6.18 Tarin des aulnes Mâle Pastel Dilué (*Spinus spinus*)

Mutation Pastel Dilué.



FIGURE 75 – Tarin des aulnes Mâle Pastel Dilué. Photo JM. Eytorff.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Calotte.	Gris foncé.
Traits sourciliers. Croupion.	Jaunes.
Joues.	Jaune verdâtre bien dessinées de gris foncé. Légère décoloration autour du bec.
Gorge.	Bavette gris foncé si elle est présente.
Poitrine.	Jaune verdâtre voilé de gris.
Flancs.	Jaunâtres, plus clairs que la poitrine, avec stries gris foncé.
Dos.	Vert jaunâtre avec stries gris foncé bien visibles.
Queue.	Partie supérieure : Gris foncé. Partie inférieure : Les deux premiers tiers jaunes et extrémités grises foncées.
Rémiges.	Grandes : Gris foncé avec liseré jaune pour le vexille externe. Secondaires : Gris foncé avec liseré jaune à l'extrémité.
Couvertures alaires.	Gris foncé. Barre alaire jaune bien visible.
Bec.	Couleur chair flammé à la mandibule supérieure.
Yeux.	Noirs.
Pattes. Doigts.	Chair.
Ongles.	Couleur corne.

4.6.19 **Tarin des aulnes Femelle Pastel Dilué (*Spinus spinus*)**
 Mutation Pastel Dilué.



FIGURE 76 – Tarin des aulnes Femelle Pastel Dilué. Photo KBOF.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Calotte.	Jaune verdâtre claire, striée de gris foncé.
Joues.	Jaunes verdâtre lavées de gris.
Gorge.	Grisâtre.
Poitrine.	Grisâtre avec légères stries gris foncé.
Dos.	Vert jaunâtre pâle avec stries dorsales gris foncé bien visibles.
Flancs.	Grisâtres, très clairs, striés de gris foncé.
Croupion.	Jaunâtre.
Queue.	<u>Partie supérieure</u> : Gris foncé. <u>Partie inférieure</u> : Le premier tiers est jaunâtre et le reste est gris foncé.
Rémiges.	<u>Grandes</u> : Gris foncé avec liseré jaune le long du vexille externe. <u>Secondaires</u> : Gris foncé avec un liseré jaune à l'extrémité.
Couvertures.	Gris foncé. Barre alaire jaunâtre.
Bec.	Couleur chair flammé à la mandibule supérieure.
Yeux.	Noirs.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur corne.

4.6.20 Tarin des aulnes Mâle Brun Pastel (*Spinus spinus*)

Mutation Brun Pastel.



FIGURE 77 – Tarin des aulnes Mâle Brun Pastel. Photo FOI.

Défauts :

- 1) Manteau présentant trop de brun (intermédiaire brun-pastel),
- 2) Poitrine jaunâtre (trop terne),
- 3) Joues brunes foncées,
- 4) Ongles foncés,
- 5) Queue trop foncée pour un brun-pastel.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Vertex. Occiput.	Brun clair.
Traits sourciliers.	Jaunes.
Joues.	Brun clair lavées de jaune.
Gorge. Poitrine.	Jaunes. Bavette brun claire si elle existe.
Flancs.	Jaunâtres avec stries brun clair.
Dos.	Manteau brun clair très légèrement strié.
Ventre.	Blanc sale.
Croupion.	Jaune.
Queue.	Deux premiers tiers jaunes et le reste est brun clair. Rectrices médianes entièrement brunes.
Rémiges.	<u>Grandes</u> : Brun clair avec liseré jaune. Bandes alaires et miroir jaune.
Couvertures alaires.	<u>Petites</u> : Brun clair. <u>Moyennes</u> : Brun clair avec liseré jaune (bande alaire). <u>Grandes</u> : Brun clair avec liseré jaune.
Bec.	Chair, flammé de brun à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux.	Bruns.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.



FIGURE 78 – Tarin des aulnes Mâle Brun Pastel. Photo JM. Eytorff.

4.6.21 Tarin des aulnes Femelle Brun Pastel (*Spinus spinus*)
Mutation Brun Pastel.



FIGURE 79 – Tarin des aulnes Femelle Brun Pastel. Photo KBOF.

-
61. [Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.](#)
62. [Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.](#)

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Vertex. Occiput. Dos. Front.	Blanc sale lavées de jaune et striés de brun clair.
Traits sourciliers.	Jaune clair et peu visibles.
Joues.	Jaunâtres striées de brun clair.
Gorge.	Blanc sale.
Poitrine.	Blanc sale lavée de jaune pâle avec stries brun clair sur le haut de la poitrine.
Flancs.	Blanc sale striés de brun clair.
Ventre.	Blanc sale.
Croupion.	Blanc sale lavé de jaune.
Queue.	Premier tiers jaune et deux derniers tiers brun clair. Rectrices médianes entièrement brunes.
Ailes.	Identiques aux ailes des mâles mais avec un jaune moins intense.
Bec.	Chair, flammé de brun à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux.	Bruns.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

4.6.22 Tarin des aulnes Mâle Brun Pastel Dilué (*Spinus spinus*)
 Mutation Brun Pastel Dilué.



FIGURE 80 – Tarin des aulnes Mâle Brun Pastel Dilué. Photo JM. Eytorff.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Vertex. Occiput. Joues.	Jaunes, voilés de beige.
Traits sourciliers.	Jaunes mais peu visibles.
Gorge. Poitrine. Dos. Croupion.	Jaunes, voilés de beige. Pas de stries.
Flancs.	Jaunes légèrement striés de beige.
Ventre.	Blanc sale.
Queue.	Deux premiers tiers jaunes et le reste est beige clair. Rectrices médianes entièrement beiges.
Rémiges.	Beige clair avec liserés jaunes.
Couvertures alaires.	Jaunes avec liserés et extrémités beige clair. Barre alaire visible.
Bec.	Chair, flammé de brun à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux.	Bruns.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

4.6.23 Tarin des aulnes Femelle Brun Pastel Dilué (*Spinus spinus*)
Mutation Brun Pastel Dilué.



FIGURE 81 – Tarin des aulnes Femelle Brun Pastel Dilué. Photo JM. Eytorff.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Vertex. Occiput. Front.	Beige clair lavés de jeune.
Traits sourciliers.	Jaune clair.
Gorge. Poitrine.	Blanc sale avec le moins de jaune possible.
Dos.	Manteau jaune lavé de beige et légèrement strié.
Flancs.	Blanc sale striés de beige clair.
Ventre.	Blanc sale.
Croupion.	Jaune lavé de beige clair.
Queue.	Premier tiers jaune et deux derniers tiers beiges. Rectrices médianes entièrement beiges.
Couvertures.	Jaunes avec liserés et extrémités beiges.
Rémiges.	Beiges avec liseré jaune.
Bec.	Chair, flammé de brun à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux.	Bruns.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

4.6.24 Tarin des aulnes Mâle Ivoire (*Spinus spinus*)
Mutation Ivoire.



FIGURE 82 – Tarin des aulnes Mâle Ivoire.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Vertex. Occiput. Front. Calotte.	Noirs. Calotte légèrement pointillée de gris.
Joues. Région auriculaire.	Jaune ivoire grisâtre légèrement voilé.
Traits sourciliers.	Jaune ivoire, partant de derrière l'oeil et s'élargissant vers le cou.
Cou. Dos.	Nuque gris verdâtre avec de fines stries très foncées.
Gorge. Poitrine. Épaules.	Vert gris. Certains mâles ont une petite bavette noire et régulière sur le haut de la gorge.
Flancs.	Gris vert avec des stries noires bien régulières. La couleur devient plus claire vers l'arrière des flancs.
Ventre.	Région anale légèrement grisâtre.
Croupion.	Gris vert.
Queue.	Deux premiers tiers des rectrices jaune ivoire et extrémité noire. Deux rectrices médianes noires.
Rémiges.	Grandes rémiges noir brunâtre avec vexille externe jaune ivoire. Barre alaire et petit miroir jaune ivoire.
Bec.	Couleur corne claire flammé de noir.
Yeux.	Brun foncé.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Noirs.

4.6.25 Tarin des aulnes Femelle Ivoire (*Spinus spinus*)

Mutation Ivoire.



FIGURE 83 – Tarin des aulnes Femelle Ivoire. Photo JM. Eytorff.

Défauts :

- 1) Manteau trop brun et trop terne,
- 2) Poitrine trop lipochrome,
- 3) Joues verdâtres,
- 4) Ongles clairs,
- 5) Mirroirs alaires trop jaune (mâles et femelles).

66

66. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Vertex. Occiput. Front.	Grisâtres avec de fines stries.
Joues. Région auriculaire.	Brunâtres, voilées de jaune ivoire.
Traits sourciliers.	Beaucoup moins jaunes que chez le mâle et plutôt brun grisâtre.
Cou. Dos. Épaules.	Grisâtres finement striés de noir brunâtre.
Gorge. Poitrine. Flancs.	Grisâtre dans l'ensemble. Côtés de la poitrine et flancs avec un beau dessin strié régulier et net de couleur gris foncé.
Ventre.	Grisâtre.
Croupion.	Gris vert légèrement strié de gris foncé.
Queue.	Premier tiers des rectrices jaune ivoire, le reste est noir gris. Deux rectrices médianes noir gris. Sous-caudales avec dessin écaillé.
Ailes.	Gris foncé avec les mêmes marques que les mâles.
Bec.	Couleur corne claire flammé de noir.
Yeux.	Brun foncé.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Noirs.

4.6.26 Tarin des aulnes Mâle Pastel Ivoire (*Spinus spinus*)

Mutation Pastel Ivoire.



FIGURE 84 – Tarin des aulnes Mâle Pastel Ivoire. Photo JM. Eytorff.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Vertex. Occiput. Front. Calotte.	Gris foncé. Calotte pointillée de gris.
Joues. Région auriculaire.	Vertes lavées de gris.
Traits sourciliers.	Jaune ivoire.
Dos.	Manteau verdâtre voilé de gris avec des stries noires.
Gorge. Poitrine.	Vert jaunâtre ivoire. Gorge avec parfois une bavette gris foncé.
Flancs.	Flancs à stries grises très foncées.
Croupion.	Verdâtre.
Queue.	Deux premiers tiers des rectrices jaune ivoire et extrémité gris très foncé. Deux rectrices médianes entièrement gris foncé.
Ailes.	Grandes rémiges : Gris foncé avec bords externes liserés de jaune ivoire. Rémiges secondaires : Avec liseré grisâtre. Barre alaire et miroir jaune ivoire clair.
Bec.	Couleur chair flammé.
Yeux.	Noirs.
Pattes. Doigts.	Chair foncé.
Ongles.	Foncés.

4.6.27 Tarin des aulnes Femelle Pastel Ivoire (*Spinus spinus*)
Mutation Pastel Ivoire.



FIGURE 85 – Tarin des aulnes Femelle Pastel Ivoire. Photo JM. Eytorff.

Taille du corps : 11 cm.

Zone du plumage	Couleur
Vertex. Occiput. Front. Calotte.	Gris clair striés de noir.
Joues. Région auriculaire.	Grisâtres.
Traits sourciliers.	Gris clair.
Dos.	Manteau grisâtre strié de noir dilué.
Poitrine.	Gris clair strié de noir dilué.
Flancs.	Couleur de fond gris clair avec des stries d'un gris très foncé.
Croupion.	Grisâtre, légèrement strié de gris foncé.
Queue.	Le premier tiers des rectrices jaune ivoire et le reste est gris très foncé. Deux rectrices médianes entièrement gris très foncé.
Ailes.	<u>Grandes Rémiges</u> : Gris foncé avec bords externes liserés de jaune ivoire. <u>Rémiges Secondaires</u> : Avec liseré grisâtre. Barre alaire et miroir jaune ivoire clair.
Bec.	Couleur chair flammé.
Yeux.	Noirs.
Pattes. Doigts.	Chair foncé.
Ongles.	Foncés.

4.7 Chardonnerets

Chardonnerets

4.7.1 Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis carduelis*)



FIGURE 86 – Chardonneret élégant. Mâle à gauche. Femelle à droite.
Photo H. Heinzl.

Attention aux tailles intermédiaires.

Tailles	
Carduelis carduelis	—> 13/14 cm
Carduelis britannica	——> 13 cm
Carduelis parva	——> 11 cm
Carduelis tschusii	——> 11 cm
Carduelis frigoris	——> 16 cm
Carduelis balcanica	——> 13 cm
Carduelis niediecki	——> 12/14 cm
Carduelis brevirostris	——> 12,5 cm

Défauts
1) Dessin du masque irrégulier, 2) Couleur du masque irrégulière, (points noirs ou blancs dans le masque bicolore), 3) Calotte noire, bande alaire et champignon irrégulier, 4) Dessin de la nuque et des ailes pas symétrique.

4.7.2 Chardonneret Frigoris (*Carduelis carduelis frigoris*)



FIGURE 87 – Chardonneret frigoris. Photo H. Heinzl.

Attention aux tailles intermédiaires.

~~Anciennement Major.~~

Taille 16 cm

Caractéristiques :

- 1) Marque de nuque blanche et importante.
- 2) Joues, gorge, champignons blancs.
- 3) Brides du casque larges, très noires contournant l'arrière de la joue.
- 4) Dessin pectoral chamois intense et présentant souvent des traces noirâtres et jaunes. Les limites du champignon sont larges et bien nettes.
- 5) Flancs chamois bien marqués, croupion blanc lavé de beige.

4.7.3 Chardonneret Britannica (*Carduelis carduelis britannica*)



FIGURE 88 – Chardonneret britannica. Photo H. Heinzel.

Attention aux tailles intermédiaires.

Taille 13 cm

Caractéristiques :

- 1) Marque de nuque étroite, blanc sale.
- 2) Gorge et joues, fortement lavées de beige.
- 3) Champignons et ventre blancs et ternes.
- 4) Flancs et dessin pectoral brun,
- 5) Manteau brun foncé.
- 6) Croupion blanc sale fortement lavé de brun.

4.7.4 Chardonneret Parva (*Carduelis carduelis parva*)



FIGURE 89 – Chardonneret parva. Photo H. Heinzel.

Attention aux tailles intermédiaires.

Taille 11 / 12 cm

Caractéristiques :

- 1) Joues brun-grisâtres,
- 2) Gorge, champignons et ventre blancs,
- 3) Dessin pectoral et flancs chamois,
- 4) Croupion blanc lavé de beige,
- 5) Marque de nuque blanche et étroite,
- 6) Bec long, fort et pointu qui peut parfois paraître disproportionné avec la taille de l'oiseau.

4.7.5 Chardonneret Tschusii (*Carduelis carduelis tschusii*)



FIGURE 90 – Chardonneret tschusii. Photo. Heinzl.

Attention aux tailles intermédiaires.

Taille 11 / 12 cm

Caractéristiques :

- 1) Marque de nuque quasiment inexistante,
- 2) Joues lavées de brun,
- 3) Gorge, champignons et ventre blancs,
- 4) Dessin pectoral et flancs chamois,
- 5) Manteau brun jusqu'à la base du casque.
- 6) Croupion blanc lavé de beige,
- 7) Bec long, fort et pointu (moins long que chez le parva)

4.7.6 Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis carduelis*)

Phénotype ancestral.



FIGURE 91 – Chardonneret élégant.

Attention aux tailles intermédiaires.

Dimorphisme sexuel : Chez la femelle la couverture des épaules est brun verdâtre et non noire comme chez les mâles.

69

69. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

Taille du corps : 13 / 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Masque rouge écarlate englobant le front, le menton et la moitié des joues jusqu'à l'œil. Derrière le masque, large tache blanche (parfois brune selon les sous-espèces) sur les côtés de la tête et la gorge.
Cou.	Collier blanc dans la nuque séparant le noir de la nuque et le brun du dos.
Dos.	Brun foncé.
Calotte. Nuque. Lorum. Épaules. Ailes.	Noirs. Large barre alaire jaune vif. Points blancs à l'extrémité de chaque rémige.
Poitrine.	Brune sur les côtés avec un champignon blanc au centre.
Flancs.	Brunâtre en s'éclaircissant vers le ventre.
Ventre.	Blanc.
Croupion.	Blanchâtre.
Queue.	Noire. Points blancs à l'extrémité de chaque rectrice. Grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices externes.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Couleur chair. Extrémité noire et effilée.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Foncés.

4.7.7 Chardonneret élégant Brun (*Carduelis carduelis carduelis*)
Mutation brune.



FIGURE 92 – Chardonneret élégant brun. Photo UOF P. Malburet.

Dimorphisme sexuel : Chez la femelle, couverture des épaules brun verdâtre et non noire comme chez les mâles.

70

70. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

Attention aux tailles intermédiaires.

Taille du corps : 13 / 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Masque rouge orange englobant le front, le menton, et la moitié des joues jusqu'à l'oeil. Derrière le masque, large tache blanche (parfois brune selon les sous-espèces) sur les côtés de la tête et la gorge.
Calotte. Nuque. Épaules. Lorum.	Brun foncé.
Cou.	Collier blanc dans la nuque séparant le brun de la nuque et le brun du dos.
Dos.	Brun chaud uniforme.
Poitrine.	Brun chaud avec champignon blanc au centre.
Flancs.	Brun en s'éclaircissant vers l'arrière.
Ventre.	Blanc sale.
Ailes.	Brun foncé avec large barre alaire jaune vif. Points blancs à l'extrémité de chaque rémige.
Croupion.	Blanchâtre lavé de brun.
Queue.	Brun foncé, avec pointillés blancs à l'extrémité des rectrices. Grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices externes.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.



FIGURE 93 – Chardonneret élégant brun. Photo L. Poullard.

4.7.8 Chardonneret élégant Agate (*Carduelis carduelis carduelis*)

Mutation agate.



FIGURE 94 – Chardonneret élégant agate. Photo JA. Abellan.

Dimorphisme sexuel : Chez la femelle la couverture des épaules est brune verdâtre et non noire comme chez les mâles.

71

71. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

Attention aux tailles intermédiaires.

Taille du corps : 13 / 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Masque rouge écarlate. Derrière le masque, large tache blanche sur les côtés de la tête et la gorge.
Calotte. Nuque. Épaules. Lorums.	Noirs.
Cou.	Collier blanc dans la nuque séparant le noir de la nuque et le gris beige du manteau.
Dos.	Gris soutenu uniforme.
Poitrine.	Gris avec champignon blanc au centre.
Flancs.	Gris en s'éclaircissant vers l'arrière.
Ventre.	Blanc sale.
Ailes.	Noires avec large barre alaire jaune vif. Points blancs à l'extrémité de chaque rémige.
Croupion.	Blanchâtre lavé de gris beige.
Queue.	Noire, avec pointillés blancs à l'extrémité des rectrices. Grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices externes.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Extrémité du bec flammée de gris.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair (un peu grisâtre).



FIGURE 95 – Chardonneret élégant agate. Photo L. Poullard.

4.7.9 Chardonneret élégant Pastel (*Carduelis carduelis carduelis*)

Mutation pastel.



FIGURE 96 – Chardonneret élégant pastel. Photo R. Driesmans.

Dimorphisme sexuel : Chez la femelle, couverture des épaules brun verdâtre et non noire comme chez les mâles.

72

72. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

Attention aux tailles intermédiaires.

Taille du corps : 13 / 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Masque rouge orange avec dessin gris sur le crâne et la nuque.
Joues.	Blanc sale.
Gorge.	Blanc sale sous le masque.
Dos. Flancs.	Gris brun clair.
Poitrine.	Gris brun clair avec champignon blanc au centre.
Ailes.	Rémiges primaires et secondaires gris foncé le plus égal possible avec extrémités blanches. Miroir jaune.
Couvertures.	Gris foncé.
Croupion.	Gris brun clair se transformant en blanc sale vers la queue.
Queue.	Rectrices grises avec taches blanches sur les deux rectrices externes.
Yeux.	Noirs.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.



FIGURE 97 – Chardonneret élégant pastel.



FIGURE 98 – Chardonneret élégant pastel. Différence entre Pastel et Ancestral.
Photo M. Natale.

4.7.10 Chardonneret élégant Isabelle (*Carduelis carduelis carduelis*)
Mutation isabelle.



FIGURE 99 – Chardonneret élégant isabelle. Photo UOF P. Malburet.

Dimorphisme sexuel : Chez la femelle, couverture des épaules brun verdâtre et non noire comme chez les mâles.

73

73. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

Attention aux tailles intermédiaires.

Taille du corps : 13 / 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Masque rouge orange englobant le front, le menton, et la moitié des joues jusqu'à l'oeil. Derrière le masque, large tache blanche (parfois brune selon les sous-espèces) sur les côtés de la tête et la gorge.
Calotte. Nuque. Lorums.	Brun beige.
Cou.	Collier blanc séparant le brun beige de la nuque et le brun beige du manteau.
Dos. Flancs.	Brun beige. Les flancs s'éclaircissent vers l'arrière.
Épaules.	Brunes.
Poitrine.	Brun beige avec champignon blanc au centre.
Ventre.	Blanc sale.
Ailes.	Brun beige avec large barre alaire jaune vif. Points blancs à l'extrémité de chaque rémige.
Croupion.	Blanchâtre lavé de gris.
Queue.	Brun beige, avec pointillés blancs à l'extrémité des rectrices. Grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices externes.
Yeux.	Bruns.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

4.7.11 Chardonneret élégant Satiné (*Carduelis carduelis carduelis*)
Mutation Satiné.



FIGURE 100 – Chardonneret élégant Satiné. Photo JM. Eytorff.

Attention aux tailles intermédiaires.

Taille du corps : 13 / 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Masque rouge orange englobant le front, le menton, et la moitié des joues jusqu'à l'oeil. Derrière le masque, large tache blanche (parfois brune selon les sous-espèces) sur les côtés de la tête et la gorge.
Calotte. Nuque. Lorums.	Beiges.
Cou. Gorge.	Blancs. Collier blanc séparant le beige de la nuque et le beige du dos.
Dos.	Blanc voilé de beige.
Épaules.	Beiges.
Poitrine.	Blanc sale voilé de beige avec champignon blanc visible au centre.
Flancs.	Blanc sale légèrement voilé de beige.
Ventre.	Blanc sale.
Ailes.	Beiges, avec large barre alaire jaune vif. Points blancs à l'extrémité de chaque rémige.
Croupion.	Blanchâtre lavé de beige.
Queue.	Beige, avec pointillés blancs à l'extrémité des rectrices. Grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices externes.
Yeux.	Rouges.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

4.7.12 Chardonneret élégant Blanc avec masque orange (*Carduelis carduelis carduelis*)

Mutation blanc avec masque orange.

Photo en

Attente

FIGURE 101 – Chardonneret élégant blanc avec masque orange.

75

75. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

Attention aux tailles intermédiaires.

Taille du corps : 13 / 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Blanche. Masque orange qui ne va pas jusqu'à la base du bec.
Dos.	Blanc.
Poitrine.	Blanche.
Flancs.	Blancs.
Rémiges.	<u>Rémiges primaires</u> : Blanches avec un liseré jaune dans leur partie médiane. <u>Rémiges secondaires</u> : Blanches.
Couvertures.	<u>Couvertures primaires</u> : Blanches avec quelques plumes jaunes. <u>Couvertures secondaires et tertiaires</u> : Blanches.
Croupion.	Blanc.
Queue.	Blanche avec un léger liseré jaune.
Bec.	Couleur chair, légèrement flammé à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux.	Noirs.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Blancs.

4.7.13 Chardonneret élégant Jaune (*Carduelis carduelis carduelis*)
Mutation jaune.



FIGURE 102 – Chardonneret élégant jaune.

Attention aux tailles intermédiaires.

Taille du corps : 13 / 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête. Dos.	L'ensemble du plumage présente une suffusion jaune, visible surtout sur les parties dépourvues de pigments mélaniques : joues, nuque, poitrail, croupion.
Poitrine. Flancs.	
Rémiges. Croupion.	La couleur jaune doit être pure, intense, le plus uniforme possible.
Queue. Bec.	Le masque facial est très lumineux, plus étendu et plus diffus que chez les sujets présentant le patron classique.
Yeux. Pattes. Doigts. Ongles.	Cette mutation à hérédité dominante a été transposée à toutes les variétés existantes.

4.7.14 Chardonneret élégant Aminet (*Carduelis carduelis carduelis*)
Mutation aminet. (~~ex-Eumo~~)



FIGURE 103 – Chardonneret élégant aminet.

Attention aux tailles intermédiaires.

Taille du corps : 13 / 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Masque rouge écarlate englobant le front, le menton, et la moitié des joues jusqu'à l'oeil. Derrière le masque, large tache blanche (parfois brune selon les sous-espèces) sur les côtés de la tête et la gorge.
Calotte. Lorums. Nuque.	calotte et lorums le plus noir possible. Nuque blanche.
Cou. Gorge.	Collier blanc formant une séparation entre le noir de la nuque et le manteau beige-rosé.
Dos.	De couleur beige-rosé.
Épaules.	Marbrées brun-noir chez le mâle et brun verdâtre chez la femelle.
Poitrine.	Beige avec voile jaunâtre le champignon est quasiment invisible.
Flancs.	Beige très clair voilé de blanc.
Ventre.	Blanc.
Ailes.	Rémiges noires, avec large barre alaire jaune vif. Points blancs à l'extrémité de chaque rémige.
Croupion.	Le plus blanc possible.
Queue.	noire, avec points blancs à l'extrémité des rectrices. Grande tache blanche à la partie intérieure des rectrices externes.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.



FIGURE 104 – Chardonneret élégant aminet. Différence entre Aminet et Agate.
Photo KBOF.

4.7.15 Chardonneret élégant Opale (*Carduelis carduelis carduelis*)

Mutation Opale.

Standard en attente de validation par la COM/OMJ



FIGURE 105 – Chardonneret élégant Opale. Photo M. Natale.

Défauts :

Réduction phéomélanique excessive. Couleur grise trop claire.

Croix noire trop fine et irrégulière

Attention aux tailles intermédiaires.

Taille du corps : 13 / 14 cm.

Cette mutation a une hérédité récessive autosomale et particulièrement rare encore en élevage. C'est grâce à un éleveur italien réputé, Paolo GREGORUTTI que cette formidable mutation a été fixée. L'ensemble du plumage est à dominante gris blanc sale, les rémiges et les rectrices sont gris cendré. Le masque rouge subsiste avec des incrustations grises noires. Les miroirs alaires jaunes subsistent.

Texte de JM. Eytorff.

Effets phénotypiques : Le gène mutant provoque une réduction spectaculaire de la phéomélanine et de l'eumélanine. Le dos est de couleur gris. La réduction n'est pas homogène. et il est possible d'apprécier dans cette partie une alternance de zones plus claires et plus foncées, surtout chez les femelles. probablement en raison de la plus grande quantité de phéomélanine qui caractérise ce sexe. La poitrine est très claire, voilée de gris. Les flancs et les joues sont blancs. Les parties eumélaniques (zones noires de l'ancestrale) ont une émission opale intéressante, typique de la pierre Opale. d'où la mutation tire son nom. Notez une tendance inégale dans ces zones, typique de cette mutation.

Caractéristiques fondamentales : La caractéristique la plus typique est le reflet bleu gris des zones eumélaniques. ailes et queue, tandis que la croix sur la tête est gris anthracite.

La non-uniformité des parties mélaniques est l'une des caractéristiques typiques, évidente à la fois sur le dos (surtout chez les femelles, plus riches en phéo) et sur les ailes et la queue, où il est possible de reconnaître des traits avec un dégradé de pigmentation plus faible. Comme déjà étudié chez le Canari de couleur, la mutation s'accompagne d'une certaine « difficulté » du plumage, plus sec et plus morcelé.

D'un point de vue sélectif, il est bon de garder une certaine patine phéo sur le dos et la poitrine. Une attention particulière doit être accordée à la structure et à la conception de la croix et du masque.



FIGURE 106 – Chardonneret élégant Opale. Photo M. Natale.

4.7.16 Chardonneret élégant Tête blanche Ancestral (*Carduelis carduelis carduelis*)

Mutation Tête blanche ancestrale.



FIGURE 107 – Chardonneret élégant Tête blanche Ancestral. Photo M. Natale.

Défauts : Débordement excessif du rouge du masque en direction nucale. Phaéomélanine dorsale non uniforme. Présence parfois de traces noires sur la zone correspondante à la calotte, qui par contre pourrait disparaître totalement.

78. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

Attention aux tailles intermédiaires.

Taille du corps : 13 / 14 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Absence de casque noir remplacé par une couleur blanche la plus uniforme possible (crâne, lorums, nuque). Seules subsistent de chaque côté de la tête les traces des brides du casque, de forme triangulaire et de couleur rouge ou orange.
Masque.	Rouge lumineux, qui peut-être plus étendu sur la face et le front.
Dos. Poitrine. Flancs. Rémiges. Couvertures. Croupion. Queue. Bec. Yeux. Pattes. Doigts. Ongles.	Mêmes caractéristiques que le phénotype sauvage, avec des miroirs alaires qui s'étendent aux grandes couvertures et pouvant remonter à la pliure de l'épaule (il est aussi visible à l'envers de l'aile). Cette mutation récessive autosomale a été transposée aux autres mutations existantes (brun, agate, etc.)

4.7.17 Chardonneret élégant Tête blanche Brun (*Carduelis carduelis carduelis*)

Mutation Tête blanche Brun.

Standard en attente de validation par la COM/OMJ



FIGURE 108 – Chardonneret élégant Tête blanche Brun. Photo M. Natale.

Attention aux tailles intermédiaires.

Taille du corps : 13 / 14 cm.

Génétique : Le facteur Tête Blanche a une transmission autosomique récessive. Le facteur Brun est une mutation récessive liée au sexe.

Effets phénotypiques : Aux classiques effets de la mutation Tête Blanche (perte de la Calotte Noire, dépigmentation de la phaéomélanine apicale, réduction importante de l'eumélanine) s'ajoute à l'effet de la mutation du Brun. Ainsi, le résultat de ce chevauchement apparaît phénotypiquement comme Tête Blanche caractérisée par la transformation du noir des ailes et de la queue en un brun foncé (tête de maure). Le poitrail est taché de phaéomélanine. Les flancs et la poitrine sont blancs, les pattes de couleur chair, les yeux noirs. Même dans ce cas, l'existence d'un sous plumage blanc donne au sujet muté une vue d'ensemble assez claire, et particulière.

Caractéristiques fondamentales : La superposition est très intéressante. Le Brun confère une tonalité très chaude à la zone dorsale, laissant intact le reste des schémas typiques du Tête Blanche. Encore une fois, la disparition de la calotte noire, provoque le débordement du rouge presque à la région de la nuque, surtout chez les mâles. Défaut inévitable qui ne peut être supprimé que par la sélection.

Le jaune des ailes est plus pâle chez le Brun Tête Blanche que chez l'Agate Tête Blanche. Le noir des ailes et de la queue est de couleur anthracite (moins noir que chez l'Agate Tête Blanche).

Pour obtenir le premier Brun Tête Blanche, il est nécessaire d'accoupler deux sujets homozygotes. Préférant le mâle (car la mutation est liée au sexe), c'est à dire un mâle et une femelle Brun Tête Blanche non consanguins.

Les accouplements conseillés : Le mâle phénotype sauvage / Tête Blanche / Brun X Femelle brun / Tête Blanche.

En couples, il est préférable d'utiliser au moins un porteur Brun Tête Blanche, afin d'optimiser l'oxydation requis pour la mutation Brune.

4.7.18 Chardonneret élégant Tête blanche Agate (*Carduelis carduelis carduelis*)

Mutation Tête blanche Agate.

Standard en attente de validation par la COM/OMJ



FIGURE 109 – Chardonneret élégant Tête blanche Agate. Photo M. Natale.

Attention aux tailles intermédiaires.

Taille du corps : 13 / 14 cm.

Génétique : Le facteur Tête Blanche a une transmission autosomique récessive. Le facteur Agate est une mutation récessive liée au sexe.

Effets phénotypiques : Aux classiques effets de la mutation Tête Blanche (perte de la Calotte Noire, dépigmentation de la phaéomélanine apicale, réduction quantitative de l'eumélanine) s'ajoute à l'effet de la mutation Agate, qui consiste surtout dans l'importance de la réduction de la phaéomélanine. Ainsi, le résultat de cette superposition apparaît phénotypiquement comme Tête Blanche caractérisée par une réduction importante de la phaéomélanine, surtout sur le dos, qui se présente d'un beau gris aluminium avec une dépigmentation des pointes. Même la poitrine perd de la phaéomélanine, apparaissant presque blanche avec des effets jaune. Les flancs et la poitrine sont blancs, les pattes de couleur chair, les yeux noirs. La persistance d'un sous plumage blanc confère au sujet muté un aspect général assez clair et particulier.

Caractéristiques fondamentales : La superposition est très intéressante car la couleur contraste entre les zones noires et grises. Le dos est gris foncé tandis que la poitrine est blanche. Dans ce cas, la disparition de la calotte noire provoque le débordement du rouge jusqu'à la région de la nuque, surtout chez les mâles. Défaut inévitable qui ne peut être supprimé que par la sélection.

Le jaune des ailes est plus vif que chez le Brun Tête Blanche. Le noir des ailes et de la queue est plus foncé que chez le Brun Tête Blanche.

Pour obtenir l'Agate Tête Blanche, il est évidemment nécessaire d'accoupler deux sujets homozygotes, préférant un mâle Agate (car la mutation est liée au sexe), c'est à dire un mâle et une femelle Agate Tête Blanche, éventuellement non consanguines.

4.7.19 Chardonneret élégant Tête blanche Isabelle (*Carduelis carduelis*)

Mutation Tête blanche Isabelle.

Standard en attente de validation par la COM/OMJ



FIGURE 110 – Chardonneret élégant Tête blanche Isabelle. Photo M. Natale.

Attention aux tailles intermédiaires.

Taille du corps : 13 / 14 cm.

Génétique : Le facteur Tête Blanche a une transmission autosomique récessive. Le facteur Isabelle est une mutation récessive liée au sexe.

Effets phénotypiques : Aux classiques effets de la mutation Tête Blanche (perte de la Calotte Noire, dépigmentation de la phaéomélanine apicale, réduction quantitative de l'eumélanine) s'ajoute à l'effet des deux mutations Agate et Brune qui sont caractéristiques du croisement isabelle (l'Agate amène une importante réduction de la phaéomélanine et le Brun transforme le noir en marron). Ainsi le Tête Blanche Isabelle se présente phénotypiquement comme un Tête Blanche caractérisé par une importante réduction de la phaéomélanine et de l'eumélanine, le noir se présente d'un marron légèrement plus réduit par rapport à un brun classique, de plus le dos se présente en un beau beige sable avec une dépigmentation des pointes des rémiges tertiaires. Même la poitrine perd de la phaéomélanine apparaissant presque blanche avec des effets jaune. Les flancs et les joues sont blancs, les pattes de couleur chair, les yeux rougeâtres.

Caractéristiques fondamentales : La superposition est très importante car les dessins même fortement réduits demeurent bien visibles. Même dans ce cas la disparition de la calotte noire provoque le débordement du rouge jusqu'à la région de la nuque surtout chez les mâles. Défaut inévitable qui ne peut être supprimé que par la sélection.

4.7.20 Chardonneret élégant Tête blanche Lutino (*Carduelis carduelis carduelis*)

Mutation Tête blanche Lutino.

Standard en attente de validation par la COM/OMJ



FIGURE 111 – Chardonneret élégant Tête blanche Lutino. Photo M. Natale.

Attention aux tailles intermédiaires.

Taille du corps : 13 / 14 cm.

Génétique : Le facteur Tête Blanche a une transmission autosomique récessive. Le facteur Lutino est une mutation récessive liée au sexe.

Effets phénotypiques : Le Lutino enlève complètement la phaéomélanine et réduit fortement l'eumélanine noire. Le Tête Blanche dans cette superposition devient visible surtout au niveau de la tête par la disparition du dessin de la calotte. La réduction apicale de la phaéomélanine est liée à la totale perte de ce pigment. L'effet général est beaucoup plus clair par rapport à un Lutino ((Agate Satiné) classique par la présence d'un sous-plumage blanc, ainsi le résultat de cette superposition se présente phénotypiquement comme un Lutino sans dessin au niveau de la tête. La poitrine est blanche avec quelques effets jaunes. Les flancs et les joues blancs. Les pattes de couleur chair. Les yeux rouges.

Caractéristiques fondamentales : La superposition est extrême, spectaculaire mais techniquement moins intéressante par rapport à un Tête Blanche Agate (les contrastes sont bien plus marqués pour l'Agate). Même dans ce cas, la disparition de la calotte noire provoque le débordement du rouge jusqu'à la région de la nuque, surtout chez les mâles. Défaut inévitable qui ne peut être supprimé que par sélection.

4.7.21 Chardonneret élégant Tête blanche Satiné (*Carduelis carduelis*)

Mutation Tête blanche Satiné.

Standard en attente de validation par la COM/OMJ



FIGURE 112 – Chardonneret élégant Tête blanche Satiné. Photo M. Natale.

Taille du corps : 13 / 14 cm.

Génétique : Le facteur Tête Blanche a une transmission autosomique récessive. Le facteur Satiné est une mutation récessives liée au sexe.

Effets phénotypiques : Le Brun transforme l'eumélanine noire en Brun, le Lutino abolit la phaéomélanine et réduit fortement l'eumélanine noire. Il ressort donc des dessins moins marqués quand l'eumélanine est transformée en Brun. Pour cette raison, le Satiné par rapport au Lutino présente un dessin plus marqué avec des tendances Brune au niveau des ailes et de la queue. Le Tête Blanche dans cette superposition devient reconnaissable surtout au niveau de la tête par la disparition du dessin de la calotte. La réduction apicale de la phaéomélanine est liée à la totale disparition de ce pigment. Ainsi, le résultat de cette superposition se présente phénotypiquement comme un Satiné Brun à savoir les ailes et la queue d'un Brun noisette plus marqué que chez un Lutino mais sans dessin au niveau de la tête. La poitrine est blanche avec des traces jaune. Les flancs et les joues blancs. Les pattes de couleur chair et les yeux rouges.

Caractéristiques fondamentales : La superposition est extrême et spectaculaire même si techniquement elle est moins intéressante par rapport à un Tête Blanche Agate qui a des contrastes bien plus marqués. Même dans ce cas, la disparition de la calotte noire amène le débordement du rouge presque jusqu'à la région de la nuque, surtout chez les mâles. Défaut inévitable qui ne peut être supprimé que par sélection.

Il est important de distinguer le Tête Blanche Lutino qui a la terminaison des plumes alaires et les rectrices plus marquées et à tendances Brune par rapport au Tête Blanche Satiné qui lui a les rectrices et les alaires de couleur noisette.

Attention aux tailles intermédiaires.

4.8 Verdiers

Verdiers

4.8.1 Verdier d'Europe (*Chloris chloris chloris*)



FIGURE 113 – Verdier d'Europe. Mâle à gauche. Femelle à droite.
Photo H. Heinz.

Défauts des verdiers en général :

- 1) Tête trop plate et trop petite,
- 2) Bosse à la nuque,
- 3) Dessins des joues pas assez visibles,
- 4) Corps pas assez trapu,
- 5) Liseré jaune pas assez vif chez le mâle,
- 6) Dos creux,
- 7) Tache jaune sur le front,
- 8) Couleur trop brune chez les mâles.

4.8.2 Verdier d'Europe (*Chloris chloris aurantiiventris*)



FIGURE 114 – Verdier d'Europe. Photo : Gauche H. Heinzel. Droite E. Gomez.

Taille de 14 à 16 cm selon la sous-espèce.

Caractéristiques concernant aurantiiventris :

- 1) Couleur verte plus lumineuse que chez chloris chloris,
- 2) Gorge et face ventrale fortement lavées de jaune,
- 3) Bec et pattes plus clairs que chez chloris chloris,
- 4) Plus grand et plus coloré que chloris chloris.

4.8.3 Verdier d'Europe Mâle (*Chloris chloris chloris*)

Phénotype ancestral.



FIGURE 115 – Verdier d'Europe Mâle.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Large, massive, avec le cou bien rempli. Front vert lumineux. Zone loreale et moustache gris-vert.
Joues.	Gris cendré.
Gorge. Épaules.	Vert jaunâtre.
Dos.	Vert olive avec reflets brunâtres.
Poitrine. Flancs.	Vert olive.
Ventre.	Gris blanchâtre.
Ailes.	Grandes rémiges : Noir brunâtre avec vexille externe jaune vif. Rémiges secondaires : Grises avec un liseré noir brunâtre à l'extrémité.
Queue.	Rectrices jaunes à la base et noir brunâtre à l'extrémité avec un liseré gris le long du vexille externe. Les deux rectrices médianes sont noir brunâtre. Queue courte avec l'extrémité fourchue.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Couleur chair, flammé de brun. Gros et conique.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair foncé.



FIGURE 116 – Verdier d'Europe Mâle. Photo M. Chrisostome.

4.8.4 Verdier d'Europe Femelle (*Chloris chloris chloris*)

Phénotype ancestral.



FIGURE 117 – Verdier d'Europe Femelle.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Brun grisâtre. Large, massive, avec le cou bien rempli.
Joues.	Gris cendré.
Gorge. Épaules.	Gris-vert.
Dos.	Brun grisâtre marqué de stries plus foncées.
Poitrine. Flancs.	Brun grisâtre strié.
Ventre.	Gris blanchâtre.
Ailes.	Grandes <u>ré</u> miges : Noir brunâtre avec vexille externe jaune. Rémiges secondaires : Grises avec un liseré noir brunâtre à l'extrémité. Liseré moins large que chez le mâle.
Queue.	Rectrices jaunes à la base et noir brunâtre à l'extrémité avec un liseré gris le long du vexille externe. Les deux rectrices médianes sont noir brunâtre. Queue courte avec l'extrémité fourchue. Miroir moins large que chez le mâle.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Couleur chair, flammé de brun. Gros et conique..
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair foncé.

4.8.5 Verdier d'Europe Mâle Brun (*Chloris chloris chloris*)

Mutation brune.



FIGURE 118 – Verdier Mâle Brun. Photo P. Rocher.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Brun jaunâtre avec un voile gris brun sur les joues. Moustaches plus foncées que les joues. Sourcils plus clairs.
Dos.	Brun jaunâtre.
Poitrine.	Jaune brun.
Flancs.	Bruns jaunâtres.
Ventre.	Jaunâtre.
Ailes.	Grandes rémiges : Brunes avec vexille externe jaune et liseré beige à l'extrémité. Rémiges secondaires : Brun grisâtre.
Couvertures.	Grandes couvertures brun grisâtre. Petites et moyennes couvertures brun jaunâtre.
Croupion.	Olive.
Queue.	Deux premiers tiers des rectrices jaunes et dernier tiers brun avec liseré beige sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux.	Bruns.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

4.8.6 Verdier d'Europe Femelle Brune (*Chloris chloris chloris*)

Mutation brune.



FIGURE 119 – Verdier Femelle Brune. Photo UOF P. Malburet.

Défauts :

- 1) Manteau brun grisâtre,
- 2) Tonalité terne,
- 3) Trop de lipochrome à la poitrine,
- 4) Couleur intermédiaire brun/isabelle,
- 5) Bec : Mandibule inférieure jaune (porteur bec jaune).

87

87. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Brun jaunâtre avec un voile gris brun sur les joues. Moustaches plus foncées que les joues. Sourcils plus clairs.
Dos.	Brun jaunâtre.
Poitrine.	Jaune brun.
Flancs.	Bruns jaunâtres.
Ventre.	Jaunâtre.
Ailes.	Grandes rémiges : Brunes avec vexille externe jaune et liseré beige à l'extrémité. Rémiges secondaires : Brun grisâtre.
Couvertures.	Grandes couvertures brun grisâtre. Petites et moyennes couvertures brun jaunâtre.
Croupion.	Olive.
Queue.	Deux premiers tiers des rectrices jaunes et dernier tiers brun avec liseré beige sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux.	Bruns.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

4.8.7 Verdier d'Europe Mâle Agate (*Chloris chloris chloris*)

Mutation Agate.



FIGURE 120 – Verdier Mâle Agate.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Vert jaunâtre.
Couronne. Joues. Moustaches.	Gris.
Gorge.	Vert jaunâtre.
Dos.	Vert avec léger voile gris bien régulier.
Poitrine. Flancs.	Vert jaunâtre avec un voile gris.
Ventre.	Vert jaunâtre.
Ailes.	Grandes rémiges : Gris foncé avec vexille externe jaune et liseré gris clair à l'extrémité. <u>Rémiges secondaires</u> : Gris foncé avec un large liseré gris clair.
Couvertures.	Grandes couvertures gris argenté. Petites et moyennes couvertures vert jaunâtre.
Croupion.	Vert jaunâtre.
Queue.	Deux premiers tiers des rectrices jaunes et dernier tiers gris foncé avec liseré gris clair sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux.	Noirs.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

Remarque : Le voile gris est moins visible chez les mâles adultes.



FIGURE 121 – Verdier Mâle Agate.

4.8.8 Verdier d'Europe Femelle Agate (*Chloris chloris chloris*)
Mutation Agate.



FIGURE 122 – Verdier Femelle Agate.

Défauts :

- 1) Manteau trop brun,
- 2) Interstries brunes,
- 3) Rémiges secondaires brunâtres,
- 4) Trop de lipochrome à la poitrine,
- 5) Bec : Mandibule inférieure jaune (porteur bec jaune).

89

89. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Couronne vert jaunâtre striée de gris. Joues vert jaunâtre lavées de gris. Moustaches grises.
Gorge.	Gris clair.
Dos.	Vert avec dessin strié gris bien visible.
Poitrine. Flancs.	Gris clair. Poitrine avec dessin strié gris sur les côtés.
Ventre.	Gris clair.
Ailes.	<u>Grandes rémiges</u> : Gris foncé avec vexille externe jaune clair et liseré gris clair à l'extrémité. <u>Rémiges secondaires</u> : Gris foncé avec un large liseré gris brun.
Couvertures.	Grandes couvertures gris brun. Petites et moyennes couvertures vert lavé de gris.
Croupion.	Vert jaunâtre voilé de gris
Queue.	Deux premiers tiers des rectrices jaune clair et dernier tiers gris foncé avec liseré gris clair à l'extrémité sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux.	Noirs.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

Remarque : La couleur de fond jaune est plus visible chez les adultes.

4.8.9 Verdier d'Europe Mâle Isabelle (*Chloris chloris chloris*)
Mutation Isabelle.



FIGURE 123 – Verdier d'Europe Mâle Isabelle. Photo UOF. P. Malburet.



FIGURE 124 – Verdier d'Europe Mâle Isabelle. Photo UOF. P. Malburet.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Jaunâtre.
Couronne. Joues. Moustaches.	Beiges.
Gorge.	Jaune.
Dos.	Jaune avec léger voile beige bien réparti.
Poitrine. Flancs.	Jaune avec un voile beige.
Ventre.	Jaune devenant blanc vers l'anus.
Ailes.	Grandes rémiges : Brunes avec vexille externe jaune et liseré beige à l'extrémité. Rémiges secondaires : Brunes avec un large liseré beige.
Couvertures.	Grandes couvertures beiges. Petites et moyennes couvertures jaunes.
Croupion.	Jaune.
Queue.	Deux premiers tiers des rectrices jaunes et dernier tiers brun avec liseré beige à l'extrémité sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux.	Brun foncé (yeux isabelle).
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

Remarque : Le voile beige est moins visible chez les mâles adultes.

4.8.10 Verdier d'Europe Femelle Isabelle (*Chloris chloris chloris*)
Mutation Isabelle.



FIGURE 125 – Verdier d'Europe Femelle Isabelle. Photo KBOF.

Défauts :

- 1) Manteau trop brun,
- 2) Rémiges trop brunes,
- 3) Rectrices trop brunes,
- 4) Trop de lipochrome à la poitrine,
- 5) Bec : Mandibule inférieure jaune (porteur bec jaune).

91

91. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Jaunâtre.
Couronne. Joues. Moustaches.	Beiges.
Gorge.	Vert jaunâtre.
Dos.	Vert jaunâtre avec léger voile beige bien réparti.
Poitrine. Flancs.	Vert jaunâtre avec un voile beige.
Ventre.	Beige clair.
Ailes.	Grandes rémiges : Brun beige avec vexille externe jaune clair et liseré beige clair à l'extrémité. Rémiges secondaires : Brun beige.
Couvertures.	Grandes couvertures brun beige. Petites et moyennes couvertures vert jaunâtre lavé de beige.
Croupion.	Vert jaunâtre.
Queue.	Deux premiers tiers des rectrices jaune pâle et dernier tiers brun avec liseré beige à l'extrémité sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux.	Brun foncé (yeux isabelle).
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

Remarque : La couleur de fond jaune est plus visible chez les adultes.

4.8.11 Verdier d'Europe Mâle Isabelle Satiné (*Chloris chloris chloris*)

Mutation Isabelle Satiné.



FIGURE 126 – Verdier d'Europe Mâle Isabelle Satiné. Photo FOI.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Jaune.
Couronne. Joues.	Beige très clair.
Gorge. Croupion.	Jaune.
Dos.	Jaune avec un voile beige très clair, sans stries.
Poitrine.	Jaune avec un voile beige très clair sur les côtés.
Flancs.	Jaune avec un voile beige très clair.
Ventre.	Blanc sale.
Ailes.	<u>Grandes rémiges</u> : Beiges avec vexille externe jaune et liseré beige très clair à l'extrémité. <u>Rémiges secondaires</u> : Beige clair.
Couvertures.	<u>Grandes couvertures</u> : Beige clair. <u>Petites et moyennes couvertures</u> : Jaunes.
Queue.	Deux premiers tiers des rectrices jaune doré et dernier tiers beige sans liseré sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux.	Rouges.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

Remarque : Les mâles adultes ont une couleur de fond est plus jaune sur la poitrine.

4.8.12 Verdier d'Europe Femelle Isabelle Satiné (*Chloris chloris chloris*)

Mutation Isabelle Satiné.



FIGURE 127 – Verdier d'Europe Femelle Isabelle Satiné.
Photo UOF. P. Malburet.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Jaune clair.
Couronne.	Beige très clair.
Joues.	
Gorge.	Jaune clair.
Dos.	Jaune clair avec un voile beige très clair. Présence d'un léger dessin de stries beiges.
Poitrine. Flancs.	Jaune clair avec un voile beige très clair.
Ventre.	Blanc sale.
Ailes.	Grandes rémiges : Beiges avec vexille externe jaune et liseré beige très clair à l'extrémité. Rémiges secondaires : Beige clair.
Couvertures.	Grandes couvertures : Beige clair avec un voile gris. Petites et moyennes couvertures : Jaunes voilées de beige.
Croupion.	Jaune.
Queue.	Deux premiers tiers des rectrices jaunes et dernier tiers beige sans liseré sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux.	Rouges.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles. Couleur chair.	

4.8.13 Verdier d'Europe Mâle Agate Satiné (*Chloris chloris chloris*)
Mutation Agate Satiné (Lutino).



FIGURE 128 – Verdier d'Europe Mâle Agate Satiné. Photo UOF. P. Malburet.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête. Gorge. Poitrine. Dos. Flancs.	Jaune.
Ventre.	Blanc jaunâtre.
Ailes.	Grandes rémiges : Jaunes avec vexille externe jaune doré et liseré beige très clair à l'extrémité. Rémiges secondaires : Jaunes.
Couvertures.	Jaunes.
Croupion.	Jaune doré.
Queue.	Jaune avec liseré externe jaune doré.
Yeux.	Rouges.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

4.8.14 Verdier d'Europe Femelle Agate Satiné (*Chloris chloris chloris*)

Mutation Agate Satiné (Lutino).



FIGURE 129 – Verdier d'Europe Femelle Agate Satiné.
Photo UOF. P. Malburet.

Défauts :

- 1) Présence de brun dans la queue,
- 2) Présence de reflets brunâtre dans le manteau,
- 3) Traces de brun dans les rémiges,
- 4) Couleur terne,
- 5) Bec : Mandibule inférieure jaune (porteur bec jaune).

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête. Gorge. Poitrine. Dos. Flancs.	Blanc jaunâtre.
Ventre.	Blanchâtre.
Ailes.	Grandes rémiges : Blanchâtres avec vexille externe jaune. Rémiges secondaires : Blanchâtres. Epaules jaunes.
Couvertures.	Grandes couvertures : Jaune blanchâtre. Petites et moyennes couvertures : Blanchâtres.
Croupion.	Jaune.
Queue.	Blanchâtre avec petit liseré jaune.
Yeux.	Rouges.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

4.8.15 Verdier d'Europe Vert Pastel (*Chloris chloris chloris*)

Mutation Vert Pastel.



FIGURE 130 – Verdier d'Europe Femelle Vert Pastel. Photo R. Driesmans.

Dimorphisme sexuel : Mêmes caractéristiques que les mâles mais le pigment est plus foncé. Les liserés jaunes des rémiges et des rectrices sont moins larges et plus ternes. Très léger dessin dorsal visible.

Remarque : Il faut tenir compte qu'il existe des spécimens schimmel et intensifs. Cette différence est bien marquée.

96

96. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Gris vert avec les moustaches et les joues grisâtres.
Dos. Flancs. Poitrine.	Vert olive avec des reflets gris.
Épaules. Gorge.	Jaune verdâtre.
Ventre.	Gris blanchâtre.
Ailes.	<u>Rémiges primaires</u> : Gris foncé avec vexille externe jaune vif. <u>Rémiges secondaires</u> : Gris clair avec un liseré gris foncé.
Croupion.	Vert olive
Queue.	Jaune à la base avec l'extrémité gris clair lavée de jaune. un liseré gris plus foncé entoure les rectrices.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Couleur chair, flammé de brun clair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur corne.

4.8.16 Verdier d'Europe Mâle Agate Pastel (*Chloris chloris chloris*)
Mutation Agate Pastel.



FIGURE 131 – Verdier d'Europe Mâle Agate Pastel. Photo JM. Eytorff.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Couronne. Joes. Moustaches.	Gris clair. Le reste de la tête est vert jaunâtre.
Dos.	Vert olive. Voile gris clair bien régulier.
Gorge. Poitrine. Flancs. Croupion.	Jaune verdâtre. Poitrine et flancs avec un léger voile gris.
Ventre.	Jaune verdâtre plus clair que la poitrine.
Ailes.	<u>Rémiges primaires</u> : Grises, et jaunes le long du vexille externe avec un liseré gris clair à l'extrémité. <u>Rémiges secondaires</u> : Grises, avec un large liseré gris très clair.
Couvertures.	<u>Grandes couvertures</u> : Gris argenté clair. Petites et moyennes couvertures : Jaune verdâtre.
Queue.	Deux premiers tiers des rectrices jaunes et dernier tiers gris avec un liseré gris clair sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
yeux.	Noirs.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur corne.

4.8.17 Verdier d'Europe Femelle Agate Pastel (*Chloris chloris chloris*)

Mutation Agate Pastel.



FIGURE 132 – Verdier d'Europe Femelle Agate Pastel. Photo JM. Eytorff.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Couronne.	Jaune verdâtre avec des stries gris clair.
Joues.	Jaune verdâtre lavées de gris clair.
Moustache.	Gris clair.
Dos.	Gris avec un dessin strié de gris clair bien visible.
Gorge. Poitrine.	Jaune verdâtre pâle avec un voile gris argenté léger.
Flancs.	Jaune verdâtre pâle avec un voile gris clair et un léger dessin.
Croupion.	Jaune verdâtre.
Ventre.	Légèrement plus clair que la poitrine.
Ailes.	<u>Rémiges primaires</u> : Grises, et jaunes le long du vexille externe avec un liseré gris clair à l'extrémité. <u>Rémiges secondaires</u> : Grises, avec un large liseré gris très clair.
Couvertures.	<u>Grandes couvertures</u> : Gris argenté clair. <u>Petites et moyennes couvertures</u> : Jaune verdâtre.
Queue.	Deux premiers tiers des rectrices jaunes et dernier tiers gris avec un liseré gris clair sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux.	Noirs.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur corne.

4.8.18 Verdier d'Europe Mâle et Femelle Isabelle Pastel (*Chloris chloris chloris*)

Mutation Isabelle Pastel.



FIGURE 133 – Verdier d'Europe Mâle Isabelle Pastel. Photo JM. Eytorff.

Dimorphisme sexuel : Mêmes caractéristiques que les mâles mais le pigment est moins lumineux. Les liserés jaunes des rémiges et des rectrices sont moins larges et plus ternes.

ATTENTION : Risque de confusion avec la variété Isabelle Satiné.

99

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Front. Lorums. Menton. Contours des yeux.	Masque jaune.
Région auriculaire. Vertex.	Jaunes avec un léger voile beige clair jusque dans la nuque.
Dos.	Jaunes avec un léger voile beige.
Poitrine. Flancs. Croupion.	Jaunes.
Ventre.	Blanc sale.
Ailes.	<u>Rémiges primaires</u> : Beiges avec un liseré jaune. <u>Rémiges secondaires</u> : Beige clair avec un liseré jaune. <u>Couvertures</u> : Jaunes.
Queue.	Beige avec les deux premiers tiers jaunes.
Yeux.	Isabelle.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

4.8.19 Verdier d'Europe Mâle et Femelle Brun Pastel (*Chloris chloris chloris*)

Mutation Brun Pastel.




FIGURE 134 – Verdier d'Europe Brun Pastel. Photo JM. Eytorff.

Dimorphisme sexuel : Mêmes caractéristiques que les mâles mais le pigment est plus foncé. Les liserés jaunes des rémiges et des rectrices sont moins larges et plus ternes.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Brun très clair.
Région auriculaire. Vertex. Front. Nuque.	Brun clair. Masque et sourcils jaune clair chez le mâle.
Dos.	Jaune clair voilé de brun léger.
Gorge. Poitrine. Flancs.	Jaune clair voilé de brun léger.
Ventre.	Beige crème.
Ailes.	Brun clair avec miroir jaune.
Couvertures.	Jaune voilé de brun clair.
Croupion.	Jaune.
Queue.	Brun clair liseré jaune.
Yeux.	Brun.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair.

ATTENTION : Risque de confusion avec la variété Isabelle.

100

4.8.20 Verdier d'Europe Ancestral Bec Jaune (*Chloris chloris chloris*)

Phénotype Ancestral Bec Jaune.



FIGURE 135 – Verdier d'Europe Ancestral Bec Jaune. Photo JM. Eytorff.

Aspect général de l'oiseau très lumineux. Donne une impression de douceur au plumage comme chez le Bouvreuil Githagines (*Bucanetes githagineus*)

En cas d'oiseau schimmel, le givrage blanc est remplacé par du jaune.

101

101. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Large, massive, avec le cou bien rempli. Front vert lumineux. Zone loreale et moustache gris-vert.
Joues.	Gris cendré avec incrustations vertes jaunâtres lumineuses.
Gorge. Épaules.	Vert jaunâtre très lumineux.
Dos.	Vert olive avec reflets brunâtres très lumineux.
Poitrine. Flancs.	Vert olive lumineux.
Ventre.	Jaune lumineux.
Ailes.	Grandes rémiges : Noir brunâtre avec vexille externe jaune vif. Rémiges secondaires : Grises avec un liseré noir brunâtre à l'extrémité.
Queue.	Rectrices jaunes à la base et noir brunâtre à l'extrémité avec un liseré gris le long du vexille externe. Les deux rectrices médianes sont noir brunâtre. Queue courte avec l'extrémité fourchue.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Couleur jaune doré, flammé de brun. Gros et conique.
Pattes. Doigts.	Couleur jaune doré. Jaune doré plus foncé sur la partie interne cornée.
Ongles.	Jaunes dorés.

4.8.21 Verdier d'Europe Brun Bec Jaune (*Chloris chloris chloris*)

Mutation Brun Bec Jaune.

Photo en

Attente

FIGURE 136 – Verdier d'Europe Brun Bec Jaune. Photo

102

102. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Large, massive, avec le cou bien rempli. Front brun lumineux. Zone lorale et moustache gris-brun.
Joues.	Gris cendré avec incrustations brunes jaunâtres lumineuses.
Gorge. Épaules.	Brun jaunâtre très lumineux.
Dos.	Brun très lumineux.
Poitrine. Flancs.	Brun lumineux.
Ventre.	Jaune lumineux.
Ailes.	Grandes rémiges : Noir brunâtre avec vexille externe jaune vif. Rémiges secondaires : Grises avec un liseré noir brunâtre à l'extrémité.
Queue.	Rectrices jaunes à la base et noir brunâtre à l'extrémité avec un liseré gris le long du vexille externe. Les deux rectrices médianes sont noir brunâtre. Queue courte avec l'extrémité fourchue.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Couleur jaune doré, flammé de brun. Gros et conique.
Pattes. Doigts.	Couleur jaune doré. Jaune doré plus foncé sur la partie interne cornée.
Ongles.	Jaunes dorés.

4.8.22 Verdier d'Europe Mâle Agate Bec Jaune (*Chloris chloris chloris*)

Mutation Agate Bec Jaune.



FIGURE 137 – Verdier d'Europe Mâle Agate Bec Jaune. Photo JM. Eytorff.

Remarque : Le mâle Agate bec jaune à l'apparence d'un oiseau intensif. Plus de traces de blanc remplacées par du jaune verdâtre ou du jaune gris est moins visible chez les mâles adultes.

103

103. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Vert jaune très lumineux.
Couronne. Joues. Moustaches.	Gris sur fond vert jaune très lumineux.
Gorge.	Vert jaune très lumineux.
Dos.	Vert jaune très lumineux avec léger voile gris bien régulier.
Poitrine. Flancs.	Vert jaune très lumineux avec un voile gris.
Ventre.	Vert jaune très lumineux.
Ailes.	<u>Grandes rémiges</u> : Gris foncé avec vexille externe jaune lumineux et liseré gris clair à l'extrémité. <u>Rémiges secondaires</u> : Gris foncé avec un large liseré gris clair.
Couvertures.	<u>Grandes couvertures</u> : Vert jaune. <u>Petites et moyennes couvertures</u> : Vert jaune lumineux.
Croupion.	Vert jaune lumineux.
Queue.	Deux premiers tiers des rectrices jaunes intense et dernier tiers gris foncé avec liseré gris clair.
Yeux.	Noirs.
Bec.	Jaune doré.
Pattes. Doigts.	Couleur jaune doré. Jaune plus foncé sur la partie cornée.
Ongles.	Jaune doré.

4.8.23 Verdier d'Europe Femelle Agate Bec Jaune (*Chloris chloris chloris*)

Mutation Agate Bec Jaune.

Photo en

Attente

FIGURE 138 – Verdier d'Europe Femelle Agate Bec Jaune.

Remarque : L'apparence de la femelle fait penser à un mâle. Phénotype très différent d'une femelle Agate classique. L'apparence est celle d'un sujet intensif. le givrage blanc est remplacé par du jaune

Défauts :

- 1) Présence de brun dans le manteau (le facteur bec jaune fait ressortir le brun si il est présent),
- 2) Rémiges secondaires brunes,
- 3) Ongles couleur chair (si bec mandibule supérieure jaune = porteur bec jaune),
- 4) Pattes de couleur chair (si bec mandibule supérieure jaune = porteur bec jaune),
- 5) Couleur du bec pas assez jaune.

104

104. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Couronne vert jaune lumineux striée de gris. Joes vert jaune très lumineux lavées de gris. Moustaches grises sur fond vert jaune très lumineux.
Gorge.	Vert jaune très lumineux.
Dos.	Vert jaune lumineux avec dessin strié gris bien visible.
Poitrine. Flancs.	Vert jaune très lumineux avec un voile gris.
Ventre.	Vert jaune très lumineux.
Ailes.	<u>Grandes rémiges</u> : Gris foncé avec vexille externe jaune et liseré gris clair à l'extrémité. <u>Rémiges secondaires</u> : Gris foncé avec un large liseré gris brun.
Couvertures.	<u>Grandes couvertures</u> : Gris brun. <u>Petites et moyennes couvertures</u> : Vert jaune lumineux lavé de gris.
Croupion.	Vert jaune lumineux voilé de gris.
Queue.	Deux premiers tiers des rectrices jaune intense et dernier tiers gris foncé avec liseré gris clair.
Yeux.	Noirs.
Bec.	Jaune doré.
Pattes. Doigts.	Couleur jaune doré. Jaune plus foncé sur la partie cor- née.
Ongles.	Jaune doré.

4.8.24 Verdier d'Europe Mâle Isabelle Bec Jaune (*Chloris chloris chloris*)

Mutation Isabelle Bec Jaune.



FIGURE 139 – Verdier d'Europe Mâle Isabelle Bec Jaune. Photo JM. Eytorff.

Remarque : Le mâle Isabelle Bec Jaune ne présente plus de blanc, donnant un aspect jaune doré intensif à l'oiseau. Le voile beige est moins visible chez les mâles adultes. En cas d'oiseau schimmel, le givrage blanc est remplacé par du jaune donnant un aspect intensif à l'oiseau.

105

105. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Jaune doré très lumineux.
Couronne. Joues. Moustaches.	Beiges sur fond jaune doré lumineux.
Gorge.	Jaune doré très lumineux.
Dos.	Jaune doré très lumineux avec léger voile beige bien réparti.
Poitrine. Flancs.	Jaune doré très lumineux avec un voile beige.
Ventre.	Jaune doré lumineux jusqu'à l'anus.
Ailes.	<u>Grandes rémiges</u> : Brunes avec vexille externe jaune lumineux et liseré jaune beige à l'extrémité. <u>Rémiges secondaires</u> : Brunes avec un large liseré jaune doré beige.
Couvertures.	<u>Grandes couvertures</u> : Beiges sur fond jaune doré. <u>Petites et moyennes couvertures</u> : Jaunes dorées.
Croupion.	Jaune doré très lumineux.
Queue.	Deux premiers tiers des rectrices jaunes dorés et dernier tiers brun avec liseré beige à l'extrémité.
Yeux.	Brun foncé (yeux isabelle).
Bec.	Couleur jaune doré.
Pattes. Doigts.	Couleur jaune doré. Jaune plus foncé sur la partie interne cornée.
Ongles.	Jaunes dorés.

4.8.25 Verdier d'Europe Femelle Isabelle Bec Jaune (*Chloris chloris chloris*)

Mutation Isabelle Bec Jaune.



FIGURE 140 – Verdier d'Europe Femelle Isabelle Bec Jaune. Photo JM. Eytorff.

Remarque : L'apparence de la femelle fait penser à un mâle. Phénotype très différent d'une femelle isabelle classique. L'apparence est celle d'un sujet intensif. Le givrage blanc est remplacé par du jaune.

106

106. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

Taille du corps : 13 / 15 cm.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Jaune doré très lumineux avec incrustations beiges.
Couronne. Joues. Moustaches.	Beiges sur fond jaune doré lumineux
Gorge.	Jaune doré très lumineux.
Dos.	Jaune doré lumineux avec léger voile beige bien réparti et dessin striés.
Poitrine. Flancs.	Jaune doré lumineux avec un voile beige.
Ventre.	Jaune doré très lumineux.
Ailes.	<u>Grandes rémiges</u> : Brun beige avec vexille externe jaune doré et liseré beige clair à l'extrémité. <u>Rémiges secondaires</u> : Brun beige.
Couvertures.	<u>Grandes couvertures</u> : Brun beige sur fond jaune lumineux. <u>Petites et moyennes couvertures</u> : Jaunes dorées lavées de beige.
Croupion.	Jaune doré très lumineux.
Queue.	Deux premiers tiers des rectrices jaune doré et dernier tiers brun avec liseré beige à l'extrémité.
Yeux.	Brun foncé (yeux isabelle).
Bec.	Couleur jaune doré.
Pattes. Doigts.	Couleur jaune doré. Jaune plus foncé sur la partie interne cornée.
Ongles.	Jaunes dorés.

4.8.26 Verdier Maltais (Major) (*Chloris chloris chloris*)

Phénotpe ancestral.



FIGURE 141 – Verdier Maltais (Major) Mâle et Femelle.

Taille du corps : Aussi grand que possible, minimum 16,5 cm.

Zone du plumage	Type et Généralités
Bec.	Le bec doit compléter la forme de la tête.
Tête.	Une tête large, bien arrondie et bien élevée, un front bien visible, un cou bien rempli.
Corps.	De profil, l'oiseau doit présenter une rondeur harmonieuse partant au-dessous de la gorge jusqu'au bas ventre. De même, on cherche une courbe convexe de la base du cou au croupion. Devrait se tenir bien relevé sur le perchoir à un angle de 45 degrés approximativement.
Cuisses.	Pas visible.
Ailes.	Serrées contre le corps, couvrant les sus-caudales. Ne doivent pas se croiser ou pendre.
Queue.	Relativement courte, serrée et distinctement fourchue.

Taille du corps : Aussi grand que possible, minimum 16,5 cm.

Zone du plumage	Mâles : Couleurs et Marques.
Bec.	Couleur chair claire.
Yeux.	Brun foncé.
Tête.	➤ Un front vert, les lores foncés. ➤ La raie sourcilière d'un vert plus clair. ➤ La calotte et la nuque brun-verdâtre. ➤ La moustache doit être plus foncée et bien évidente. ➤ La plage auriculaire grise.
Dos.	Brun verdâtre avec des marques brunes plus foncées.
Croupion.	Vert sans contraste avec le manteau. les sus-caudales doivent aller d'un vert olive à un brun grisâtre progressivement.
Bas-ventre.	➤ La gorge et la poitrine doivent être d'un vert riche et lumineux, aussi clair et solide que possible, se fondant dans le jaune du ventre, le blanc du bas-ventre restant au minimum. ➤ Les sous-caudales jaunes se fondent dans un vert olive progressivement.
Flancs.	Brun verdâtre.
Ailes.	<u>Les scapulaires</u> : Vert brun se mariant au manteau. <u>Les rémiges primaires</u> : Doivent montrer des barres jaune riche, formant une longue marque sur l'extrémité inférieure de l'aile repliée. <u>Les rémiges secondaires</u> : Noires avec des bordures grises, plus larges et brunâtres que les tertiaires. <u>Les petites sus-alaires</u> : Vertes. <u>Les moyennes sus-alaires</u> : Vert olive. <u>Les tectrices primaires</u> : Grises brunâtres. <u>L'allule</u> : Jaune vif.
Queue.	Noire montrant des tâches jaunes vif et une frange extérieure grise. Les plumes du centre de la queue seront noires avec une bordure verte.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair foncé.

Zone du plumage	Femelles : Couleurs et Marques.
Type.	Comme pour le mâle.
Couleur.	Des teintes brunâtres et verdâtres vifs. Le jaune des ailes et de la queue ne sera pas aussi étendue que pour le mâle.
Bec.	Couleur chair claire.
Yeux.	Brun foncé.
Tête.	➤ Le front teinté de vert. ➤ Le supercilium (sourcil) est plus clair. ➤ La calotte et la nuque sont brunes avec des marques plus foncées. ➤ La moustache, d'un brun plus foncé, doit être bien visible. ➤ La plage auriculaire est grise.
Dos.	Brun avec des marques plus foncées. Les marques sur le dos doivent être alignées, se rétrécissant vers la tête et allant jusqu' au croupion.
Croupion.	Vert, les sus-caudales vert olive tirant vers le brun.
Bas-ventre.	➤ La gorge brun grisâtre avec une teinte verte. ➤ La poitrine doit être de couleur brun clair avec une teinte verte et des marques plus foncées. ➤ Les marques sur la poitrine sont plus larges et moins évidentes. ➤ Le ventre est vert allant vers le blanc autour du bas ventre. ➤ Les sous caudales grises avec une légère teinte brune.
Flancs.	Bruns.
Ailes.	<u>Les scapulaires</u> : Brunes. <u>Les rémiges primaires</u> : Brun noirâtre. Une bordure jaune, plus mince et moins vive que chez le mâle. <u>Les rémiges secondaires</u> : Brun noirâtre avec des bordures brun grisâtres. <u>Les petites sus-alaires</u> : Vert olive. <u>Les moyennes sus-alaires</u> : Vert olive à brun. <u>Les tectrices primaires</u> : Noires avec une bordure verte. <u>L'allule</u> : Brun noirâtre avec une bordure jaune.
Queue.	Noire avec une bordure extérieure jaune. Les plumes du centre de la queue seront brun noirâtre.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur chair foncé.

Note	Généralités des Verdiers Maltais.
Taille.	Même si on préfère les exemplaires plus grands, la taille ne devrait jamais nuire à la qualité de la couleur et de la forme. Si le standard encourage la plus grande taille possible, la sélection pourrait mener à la présence de nombreux défauts : le plumage, une fertilité diminuée, une immunité affaiblie. Aucun aviculteur ne devrait encourager de tels défauts par l'élevage d'oiseaux portant ces traits.
Type.	La tête ne devrait pas être angulaire ou « en forme de boîte ». Le front doit être bien marqué, avec une bonne montée à partir de la mandibule supérieure donnant un front bien marqué. Le crâne devrait être large dans sa rondeur supérieure ainsi que vers le cou. Le corps doit être compact et rond donnant une apparence robuste et arrondie.
Mâles. Couleurs et Marques.	Des teintes brunâtres sur la tête, le dos et les flancs ne seront pas considérées fautives, mais l'oiseau qui présente un vert plus vif sera considéré supérieur. Les oiseaux schimmels montrent moins de couleur que les intensifs. Il est donc moins facile pour un schimmel de gagner par rapport aux meilleurs intensifs même si il s'avère que les schimmels gagnent à force de supériorité de type et de taille.
Femelles. Couleurs et Marques.	Le blanc autour du bas ventre est plus étendu par rapport à celui du mâle, s'étendant souvent sur le ventre. Les femelles bien jaunes montreront beaucoup de couleur sur le poitrail et ceci, associé à de bonnes performances sur le plan taille et type, devrait aboutir à des succès. Des femelles schimmels feront souvent mieux que des jaunes dans leur classe mais seront battues par un mâle jaune quand il s'agit d'un concours pour le meilleur verdier.
Notes Générales.	L'oiseau doit montrer une certaine fierté et se tenir bien positionné sur son perchoir, regardant fixement les visiteurs. Au cas où les intensifs et les schimmels sont jugés dans la même classe, le plus jaune gagnera. Si pourtant le schimmel déjà bien coloré est supérieur comme type, il prendra la tête.

Défauts	Défauts des Verdiers Maltais.
Type.	Un crâne étroit. Des yeux mal placés. Un bec trop grand ou trop petit. A éviter surtout un oiseau qui présente l'apparence d'une ligne droite du haut de la tête jusqu'à la queue, forme que l'on compare à « une piste de ski » ou l'oiseau est « long ». Cette ligne droite ne peut jamais permettre la forme arrondie que l'on recherche pour cet oiseau. <u>Pire encore</u> : Un dos creux. Difformité, oiseau en forme de poire, un surpoids au niveau de la poitrine ou au niveau du bas ventre résultant d'une mauvaise posture. L'oiseau ne devrait pas se tenir couché ou accroupi sur le perchoir. Mauvais port des ailes.
Mâles. Couleurs et Marques.	Inharmonie des couleurs : Une décoloration ou bien une présence trop forte de gris donnant une apparence trop foncée. Une présence de brun sur le poitrail et le ventre.
Femelles.	Un blanc trop étendu donnant l'impression d'un oiseau pâle.
Défauts Généraux.	Un oiseau qui se présente faiblement, peu dressé, pas confiant.




FIGURE 142 – Posture du Verdier Maltais (Major).

4.9 Bouvreuils

Bouvreuils

4.9.1 Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula europaea*)

Taille du corps : 15 cm.



FIGURE 143 – Bouvreuil pivoine Mâle. Sans trace de rouge sur le dos.
Photo H. Heinzel.



FIGURE 144 – Bouvreuil pivoine Femelle. Photo H. Heinzel.

4.9.2 Bouvreuil ponceau (*Pyrrhula pyrrhula pyrrhula*)

Taille du corps : 18 cm.

Remarques :

- Moins coloré que *europaea*.
- Sans trace de rouge sur le dos.
- Présence de lunules de queue.



FIGURE 145 – Bouvreuil ponceau Mâle. Photo H. Heinzel.

4.9.3 Bouvreuil pivoine ibérique (*Pyrrhula pyrrhula iberiae*)

Taille du corps : 13,5 cm.

Remarques :

- Plus coloré que les deux autres sous-espèces.
- Peut présenter des traces rouges sur le manteau.



FIGURE 146 – Bouvreuil pivoine ibérique Mâle. Photo H. Heinzel.



FIGURE 147 – Bouvreuil pivoine ibérique Mâle. Photo E. Gomez.



FIGURE 148 – Bouvreuil pivoine ibérique Femelle. Photo E. Gomez.

4.9.4 Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*)

Phénotype ancestral.



FIGURE 149 – Bouvreuil pivoine Mâle. Photo P. Rocher.



FIGURE 150 – Bouvreuil pivoine Femelle. Photo P. Rocher.

Taille du corps : 13,5 cm pour le Bouvreuil pivoine.
18 cm pour le Bouvreuil ponceau.

Remarque : Dimorphisme sexuel : Mêmes caractéristiques que le mâle avec les couleurs plus ternes. De plus, chez la femelle, le dos est gris brunâtre et la poitrine est gris brunâtre teinté de beige.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Calotte et contours du bec noirs. Nuque courte et bien remplie.
Dos. Épaules.	Gris bleuâtre. Sans trace de rouge, sauf ssp iberiae.
Gorge. Poitrine. Flancs.	Couleur rouge régulièrement répartie et délimitée par la calotte noire en-dessous des yeux.
Abdomen. Sous-caudales.	Blancs.
Rémiges.	Rémiges primaires et secondaires : Noires à reflets bleuâtres. Bande alaire gris blanc qui part du bord externe de l'aile et s'élargit vers le dos. Deux petites plumules rouges garnissent l'extrémité des rémiges tertiaires.
Croupion.	Blanc.
Queue.	Noir brillant.
Yeux.	Noirs.
Bec.	Noir, court et très bombé avec l'extrémité de la mandibule supérieure légèrement courbée.
Pattes. Doigts.	Noirs.
Ongles.	Noirs.

Défauts Généraux des Bouvreuils :

- 1) Calotte dentelée dans la nuque,
- 2) Bavette irrégulière sous le menton,
- 3) Reflets blanchâtres en dessous des yeux,
- 4) Couleur de la poitrine irrégulière,
- 5) Barre alaire n'allant pas jusqu'au bord de l'aile ou irrégulière,
- 6) Plumes rouges du dos absentes,
- 7) Creux dans la nuque,
- 8) Cassure à la nuque,
- 9) Trop étroit des épaules,
- 10) **Attention aux tailles intermédiaires.**

Couleur = Tête / Rémiges / Rectrices secondaires de la même couleur et présence de la flamme rouge chez les mâles et les femelles.

La présence de lunules de queue chez le Bouvreuil Ponceau n'est pas fautive.

4.9.5 Bouvreuil pivoine Mâle Brun (*Pyrrhula pyrrhula*)

Mutation Brune.



FIGURE 151 – Bouvreuil pivoine Mâle Brun. Photo P. Rocher.

Remarque : Les rectrices ont leur partie externe brun très foncé à reflets métalliques et leur partie interne brune, sauf pour les deux médianes entièrement brun foncé à reflets métalliques. Vue de dessous, la queue apparaît brune.

111

111. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

Taille du corps : 13,5 cm pour le Bouvreuil pivoine. 18 cm pour le ponceau.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Calotte brun très foncé tirant sur le noir.
Dos.	Gris clair avec reflets beiges.
Épaules.	Gris clair.
Poitrine. Gorge. Flancs.	Roses.
Ventre.	Tirant sur le blanc.
Rémiges.	<u>Rémiges primaires</u> : Brunes. <u>Rémiges secondaires</u> : Brun très foncé tirant sur le noir. Barre alaire gris clair.
Couvertures.	Brun très foncé tirant sur le noir.
Croupion.	Blanc.
Queue.	Brun très foncé avec reflets métalliques.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Mandibule supérieure brune. Mandibule inférieure couleur chair.
Pattes. Doigts.	Brun très clair.
Ongles.	Bruns.

Défauts rencontrés : Décoloration des rémiges et rectrices.

Défauts classiques des bouvreuils en mâles et femelles :

- Calotte dentelée dans la nuque,
 - Bavette irrégulière sous le menton,
 - Reflets blanchâtre en dessous des yeux,
 - Couleur de la poitrine irrégulière,
 - Barre alaire n'allant pas jusqu'au bord de l'aile ou irrégulière,
 - Plumes rouges du dos absentes,
 - Creux dans la nuque. Cassure à la nuque. Trop étroit des épaules.
 - Attention à la différence de tonalité du bec car de plus en plus ont le bec foncé comme chez le pastel,
- Défauts habituels des bouvreuils : Si les femelles bouvreuils sont colorées elles seront sanctionnées (pas de rouge chez les femelles).

Attention à la sous espèce ibéricus qui a du rouge dans le dos, l'écaillage rouge dans le dos est normal pour cette espèce. Chez le blanc (pas de panachage plaques) sinon ils seront pénalisés (déclassés).

4.9.6 Bouvreuil pivoine Femelle Brune (*Pyrrhula pyrrhula*)
Mutation Brune.



FIGURE 152 – Bouvreuil pivoine Femelle Brune. Photo KBOF.

Taille du corps : 13,5 cm pour le Bouvreuil pivoine. 18 cm pour le ponceau.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Calotte brun foncé tirant sur le noir. Joues beige brun.
Dos.	Beige brun lavé de gris.
Épaules.	Beige brun lavé de gris.
Poitrine. Gorge. Flancs.	Roses. Beige brun très uniforme.
Ventre.	Clair, tirant sur le blanc.
Rémiges.	<u>Rémiges primaires</u> : Brunes. <u>Rémiges secondaires</u> : Brun très foncé tirant sur le noir. Barre alaire gris beige.
Couvertures.	Brun très foncé tirant sur le noir.
Croupion.	Blanc.
Queue.	Brun très foncé avec reflets métalliques.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Mandibule supérieure brune. Mandibule inférieure couleur chair.
Pattes. Doigts.	Brun très clair.
Ongles.	Bruns.

4.9.7 Bouvreuil pivoine pastel (*Pyrrhula pyrrhula*)

Mutation pastel.



FIGURE 153 – Bouvreuil pivoine Mâle Pastel. Photo D. Vettese.

Remarque : Dimorphisme sexuel : Pour les femelles, mêmes caractéristiques que le mâle avec les couleurs du manteau et de la poitrine beige clair.

113

113. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.



FIGURE 154 – Bouvreuil pivoine Femelle Pastel. Photo UOF Chartier.

Taille du corps : 13,5 cm pour le Bouvreuil pivoine. 18 cm pour le ponceau.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Calotte brun noirâtre. Joues de couleur rosée.
Dos. Épaules.	Gris pastel (gris beige).
Poitrine.	Rose.
Abdomen. Sous-caudales.	Blancs.
Rémiges.	<u>Rémiges primaires et secondaires</u> : Gris foncé. <u>Barre alaire</u> : Gris beige clair. Taches roses sur des rémiges tertiaires.
Croupion.	Blanc.
Queue.	Gris foncé avec sus-caudales plus claires.
Yeux.	Brun foncé.
Bec.	Brun noirâtre.
Pattes. Doigts.	Brun foncé.
Ongles.	Foncés.

4.9.8 Bouvreuil pivoine Mâle Brun Pastel (*Pyrrhula pyrrhula*)

Mutation brun pastel.



FIGURE 155 – Bouvreuil pivoine Mâle Brun Pastel. Photo D. Vettese.



FIGURE 156 – Bouvreuil pivoine Mâle Brun Pastel. Photo D. Vettese.

Taille du corps : 13,5 cm pour le Bouvreuil pivoine. 18 cm pour le ponceau.

Zone du plumage	Couleur
Front. Calotte. Nuque. Lorums. Menton.	Brun noisette chaud. Léger voile rouge au vertex toléré.
Dos.	Gris beige très clair.
Poitrine. Gorge. Flancs.	Rouge rose.
Ventre.	Région anale blanche.
Rémiges.	Rémiges primaires : Beige clair. Rémiges secondaires et tertiaires : Brun beige. Bande alaire claire.
Croupion.	Blanc.
Queue.	Brun beige.
Yeux.	Bruns foncés.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Bruns.

4.9.9 Bouvreuil pivoine Femelle Brune Pastel (*Pyrrhula pyrrhula*)
Mutation brun pastel.



FIGURE 157 – Bouvreuil pivoine Femelle Brune Pastel. Photo UOF.

115

Taille du corps : 13,5 cm pour le Bouvreuil pivoine. 18 cm pour le ponceau.

Zone du plumage	Couleur
Front. Calotte. Nuque. Lorums. Menton.	Brun noisette chaud.
Dos.	Beige.
Poitrine. Gorge. Flancs.	Beige clair soutenu avec un peu de brun.
Ventre.	Région anale blanche.
Rémiges.	<u>Rémiges primaires</u> : Beige clair. <u>Rémiges secondaires et tertiaires</u> : Brun beige. Bande alaire claire.
Croupion.	Blanc.
Queue.	Brun beige.
Yeux.	Bruns foncés.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Bruns.

4.9.10 Bouvreuil pivoine blanc (*Pyrrhula pyrrhula*)

Mutation blanche.



FIGURE 158 – Bouvreuil pivoine Blanc. Photo KBOF.

Taille du corps : 13,5 cm pour le Bouvreuil pivoine. 18 cm pour le ponceau.

Zone du plumage	Couleur
Tête.	Blanche.
Dos. Épaules.	Blancs.
Poitrine. Gorge. Flancs.	Chez le mâle rose saumon clair. Chez la femelle blanche.
Ventre.	Blanc.
Abdomen. Sous-caudales.	Blancs.
Ailes.	Rémiges blanches deux couvertures rose saumon.
Croupion.	Blanc.
Queue.	Blanche.
Yeux.	Noirs.
Bec.	Couleur chair
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Blancs.

4.9.11 Bouvreuil pivoine jaune (*Pyrrhula pyrrhula*)

Mutation jaune.




FIGURE 159 – Bouvreuil pivoine Mâle Jaune. Photo R. Driesmans.

Dimorphisme sexuel : La femelle a les mêmes caractéristiques que le mâle mais les couleurs sont plus ternes.

Remarque : Cette mutation a été combinée aux autres variétés existantes.

117

117. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

Taille du corps : 13,5 cm pour le Bouvreuil pivoine. 18 cm pour le ponceau.

Zone du plumage	Couleur
Calotte. Tour du bec.	Noirs jusqu'en dessous des yeux.
Dos. Épaules.	Gris bleuâtre.
Poitrine. Gorge. Flancs.	Couleur jaune verdâtre régulièrement répartie.
Bas de l'abdomen. Sous-Caudales. Croupion.	Blancs.
Ailes.	Rémiges primaires et secondaires : Noires à reflets bleuâtres. Bande alaire gris blanc à partir du bord externe de l'aile en s'élargissant vers le dos. Deux plumules rouges à l'extrémité des rémiges tertiaires.
Queue.	Rectrices noir brillant.
Yeux.	Noirs.
Bec.	Noir, court et très bombé avec l'extrémité de la mandibule supérieure légèrement courbée.
Pattes. Doigts.	Noirs.
Ongles.	Noirs.

4.9.12 Bouvreuil pivoine Mâle brun pastel jaune (*Pyrrhula pyrrhula*)
Mutation brun pastel jaune.



FIGURE 160 – Bouvreuil pivoine Mâle brun pastel jaune.

Remarque : Même caractéristique que le brun pastel mais avec la face ventrale jaune.

118

118. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

Taille du corps : 13,5 cm pour le Bouvreuil pivoine. 18 cm pour le ponceau.

Zone du plumage	Couleur
Front. Calotte. Nuque. Lorums. Menton.	Brun noisette chaud. Léger voile rouge au vertex toléré.
Dos.	Gris beige très clair.
Poitrine. Gorge. Flancs.	Rouge rose.
Ventre.	Face ventrale jaune. Région anale blanche.
Rémiges.	<u>Rémiges primaires</u> : Beige clair. <u>Rémiges secondaires et tertiaires</u> : Brun beige. Bande alaire claire.
Croupion.	Blanc.
Queue.	Brun beige.
Yeux.	Bruns foncés.
Bec.	Couleur chair.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Bruns.

4.9.13 Bouvreuil pivoine Mâle Topaze (*Pyrrhula pyrrhula*)

Mutation topaze.



FIGURE 161 – Bouvreuil pivoine Mâle Topaze. Photo KBOF.

119

Taille du corps : 13,5 cm pour le Bouvreuil pivoine. 18 cm pour le ponceau.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Couleur corne, court et massif.
Yeux.	Rouge foncé.
Tête.	<u>Calotte</u> : Gris foncé avec un minimum de rouge dans la calotte. <u>Joues</u> : orange rouge.
Dos.	Gris bleu clair sans voile rouge.
Poitrine. Flancs. Gorge.	Orange rouge.
Ventre.	Orange rouge, blanc dans la partie inférieure.
Ailes.	Gris foncé, bien réparti avec une barre alaire plus claire partant du bord de l'aile. Flamme sur la dernière rémige tertiaire.
Queue.	Gris foncé en harmonie avec les rémiges.
Croupion.	Blanc.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur corne.

4.9.14 Bouvreuil pivoine Femelle Topaze (*Pyrrhula pyrrhula*)
Mutation topaze.



FIGURE 162 – Bouvreuil pivoine Femelle Topaze. Photo D. Vettese.

Taille du corps : 13,5 cm pour le Bouvreuil pivoine. 18 cm pour le ponceau.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Couleur corne, court et massif.
Yeux.	Rouge foncé.
Tête.	<u>Calotte</u> : Gris foncé. <u>Joues</u> : Gris brun clair.
Dos.	Gris-brun foncé sans voile rouge.
Poitrine.	Gris brun clair.
Flancs.	De même couleur que la poitrine.
Ventre.	Gris brun clair, blanc dans la partie inférieure.
Ailes.	Gris foncé, bien réparti avec une barre alaire plus claire partant du bord de l'aile. Flamme sur la dernière rémige tertiaire.
Queue.	Gris en harmonie avec les rémiges.
Croupion.	Blanc.
Pattes. Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Couleur corne.

4.10 Gros bec casse-noyaux

Gros bec casse-noyaux

4.10.1 Gros bec casse-noyaux (*Coccothraustes coccothraustes*)



FIGURE 163 – Gros bec casse-noyaux. Mâle et Femelle. Photo H. Heinzel.

Défauts :

- 1) Bavette irrégulière,
- 2) Couvertures des ailes irrégulières et incomplètes,
- 3) Couleur de la poitrine marbrée,
- 4) Flancs trop clairs,
- 5) Bord du collier gris irrégulier,
- 6) Cercle oculaire incomplet,
- 7) Bec écaillé,
- 8) Faucilles à l'extrémité des rémiges irrégulières,
- 9) Blessures au front.

4.10.2 Gros bec casse-noyaux Mâle (*Coccothraustes coccothraustes*)
Phénotype ancestral



FIGURE 164 – Gros bec casse-noyaux. Mâle. Photo P. Rocher.



FIGURE 165 – Gros bec casse-noyaux. Mâle.

Taille du corps : 18 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	<u>En hiver</u> : De couleur corne pâle. <u>En été</u> : De couleur bleu acier.
Yeux.	Gris brunâtre. <u>Cercles oculaires</u> : Brun rougeâtre.
Tête.	Le dessus de la tête est brun. Clair sur le front et foncé sur l'occiput. Le liseré frontal, les lorums, le menton et le tour du bec sont noirs. La région auriculaire et les joues sont de couleur brun jaunâtre. Le bas des joues et les parties inférieures du cou sont de couleur gris clair.
Dos.	Le dos, le manteau et les scapulaires sont de couleur brun foncé. Le bas du dos est brun grisâtre. Le croupion et les sus caudaux sont de couleur brun jaunâtre.
Gorge.	<u>Menton et Gorge</u> : Noir avec un léger liseré très pâle autour de la bavette (le minimum sera le meilleur).
Poitrine.	Gris brunâtre, pâle lavé de rose.
Flancs.	Brun grisâtre, plus foncés que la poitrine.
Ventre.	Gris blanchâtre avec le sous caudale blanc.
Ailes.	<u>Les rémiges primaires et secondaires</u> sont noires avec des reflets métalliques. L'extrémité des rémiges primaires internes et des rémiges secondaires externes sont en forme de faucille. <u>Les grandes couvertures alaires</u> sont blanches et forment une barre alaire.
Queue.	Courte. Les rectrices médianes sont rousses et les rectrices externes sont noires avec une extrémité blanche. Ceci forme une bande blanche à l'extrémité de la queue.
Pattes. Doigts.	De couleur brun chair.
Ongles.	Brun foncé.

4.10.3 Gros bec casse-noyaux Femelle (*Coccothraustes coccothraustes*)
Phénotype ancestral



FIGURE 166 – Gros bec casse-noyaux. Femelle. Photo P. Malburet.

La femelle a les mêmes caractéristiques que le mâle, mais les teintes sont plus pâles et plus grises.

L'extrémité de la queue de la femelle est moins blanche que chez du mâle.

122

122. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

4.11 Roselin githagine

Roselin githagine

4.11.1 Roselin githagine (*Rhodopechys githaginea*)



FIGURE 167 – Roselin githagine Mâle Plumage Nuptial. Photo H. Heinzel.



FIGURE 168 – Roselin githagine Femelle Plumage Nuptial. Photo H. Heinzel.

4.11.2 Roselin githagine (*Rhodopechys githaginea*)

Phénotype ancestral



FIGURE 169 – Roselin githagine Mâle Plumage Hivernal. Photo E. Gomez.

Défauts :

- 1) Plumage désordonné,
- 2) Ailes croisées ou pendantes,
- 3) Queue étalée.

123

123. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

Taille du corps : 12,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Orangé, court, puissant, assez large à la base.
Yeux.	Noirs.
Tête.	Assez étroite, faiblement arrondie, de forme élégante. <u>Cou</u> : Assez long. <u>Nuque</u> : Marquée Couleur de la tête : Gris-argenté.
Dos.	Gris-brunâtre.
Poitrine.	Gris, avec léger reflet rose lie de vin.
Flancs.	Du même gris que la poitrine.
Ventre.	Comme la poitrine, sauf la zone anale est gris clair.
Ailes.	Longues et fines. <u>Rémiges primaires</u> : Gris foncé. <u>Rémiges secondaires</u> : Gris-brun. <u>Couvertures</u> : Gris-brun. Le vexille externe des rémiges et des couvertures porte un étroit liseré clair.
Queue.	De longueur moyenne, légèrement échancrée. <u>Rectrices</u> : Gris foncé, bordées d'un liseré clair.
Pattes.	Assez longues, fines et de couleur chair.
Doigts.	Couleur chair.
Ongles.	Gris-beige.
Forme Générale.	Oiseau de forme élégante et fine.



FIGURE 170 – Roselin githagine Femelle Plumage Hivernal. Photo E. Gomez.
Remarque : La femelle est plus terne et le bec est plus clair.

4.11.3 Roselin cramoisi Mâle (*Carpodacus erythrinus*)

Phénotype ancestral



FIGURE 171 – Roselin cramoisi Mâle. Photo H. Heinzel.

124

124. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

Taille du corps : 13-13,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Brun.
Yeux.	Bruns.
Tête.	<u>Couronne et Nuque</u> : Rouge carmin. <u>Joues</u> : Brunes avec un voile rose.
Dos.	Brun voilé de rose.
Gorge.	Rouge carmin.
Poitrine.	Rouge carmin se transformant en rouge rose vers le ventre.
Flancs.	De beige à rose.
Ventre.	beige.
Ailes.	<u>Grandes rémiges</u> : Brunes foncées. <u>Rémiges secondaires</u> : Brunes foncées. <u>Petites couvertures</u> : Brunes foncées.
Croupion.	Rouge carmin.
Queue.	Brunes foncées.
Pattes.	brunes.
Doigts.	Bruns.
Ongles.	Bruns.

4.11.4 Roselin cramoisi Femelle (*Carpodacus erythrinus*)

Phénotype ancestral



FIGURE 172 – Roselin cramoisi Femelle. Photo H. Heinzl.

Taille du corps : 13-13,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Brun.
Yeux.	Bruns.
Tête.	<u>Couronne et Nuque</u> : Brun tirant sur le beige et strié de brun. <u>Joues</u> : Brunes beiges.
Dos.	Brun et strié.
Gorge.	Beige.
Poitrine.	Beige strié de brun.
Flancs.	Beige strié de brun.
Ventre.	beige.
Ailes.	<u>Grandes rémiges</u> : Brunes foncées avec le vexille externe beige. <u>Rémiges secondaires</u> : Brunes foncées. <u>Petites couvertures</u> : Brunes foncées avec un liseré beige.
Croupion.	Jaune orangé.
Queue.	Brunes foncées avec le vexille externe beige.
Pattes.	brunes.
Doigts.	Bruns.
Ongles.	Bruns.

4.12 Durbec des sapins

Durbec

4.12.1 Durbec des sapins (*Pinicola enucleator*)



FIGURE 173 – Durbec des sapins Mâle et Femelle. Photo H. Heinzel.



FIGURE 174 – Durbec des sapins Mâle en 1^{ère} année. Photo H. Heinzel.

4.12.2 Durbec des sapins Mâle (*Pinicola enucleator*)

Phénotype ancestral



FIGURE 175 – Durbec des sapins Mâle Adulte. Photo P. Rocher.

Taille du corps : 20 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Gris noir, puissant. Mandibule supérieure bombée. L'extrémité courbée vers le bas en forme de croc.
Yeux.	Noirs.
Tête.	Assez étroite et plate, rose carmin, reflets gris noirâtre sur la zone loreale et oculaire.
Cou.	Encolure large et puissante, nuque peu marquée, rose carmin.
Dos.	Large, rose carmin, marqué d'un écaillage gris noirâtre très régulier.
Gorge. Poitrine.	Entièrement rose carmin.
Flancs.	Étroite bande gris légère soulignant l'aile.
Ventre.	Le rose de la poitrine se dégrade en gris blanchâtre, plus clair sur la zone anale.
Ailes.	<u>Rémiges primaires</u> : Noirâtres, portant un fin liseré gris sur le vexille. <u>Rémiges secondaires</u> : Noirâtres, largement liserées de blanc, surtout vers l'extrémité. <u>Couvertures</u> : Noires avec bordure blanche, formant une double barre alaire très distincte.
Croupion.	Rose carmin.
Queue.	Assez longue et échancrée. <u>Rectrices</u> : Noirâtres, portant un très faible liseré gris brun.
Pattes. Doigts.	Gris-noir.
Ongles.	Gris-noir.

Remarque : La couleur rose carmin ne s'exprime qu'à partir de la 2^{ème} année.
En première année la couleur est orange plus ou moins intense.

4.13 Bec croisé

Bec croisé

4.13.1 Bec croisé des sapins (*Loxia curvirostra*)

Remarque : En première année la couleur des jeunes mâles peut être moins intensive.



FIGURE 176 – Bec croisé des sapins Mâle Adulte. Photo animalia.bio.

Défauts :

- 1) Couleur de la poitrine irrégulière,
- 2) Extrémité du bec cassé,
- 3) Dessin du sous-caudale irrégulier,
- 4) Dessin des joues irrégulier,
- 5) Couleur d'ensemble tachetée,
- 6) Stries entrecoupée surtout chez la femelle.

127

127. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

4.13.2 Bec croisé des sapins Mâle (*Loxia curvirostra*)

Phénotype ancestral



FIGURE 177 – Bec croisé des sapins Mâle. Photo UOF.



FIGURE 178 – Bec croisé des sapins Mâle. Photo animalia.bio.

Taille du corps : 16,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Brun gris foncé et croisé complètement. Racine de la mandibule inférieure plus claire. Les mandibules peuvent croisées d'un côté ou l'autre du bec.
Yeux.	Brun foncé.
Tête.	Front, vertex et nuque : Sont de couleur rouge plus ou moins intensif. Certains bec-croisé possèdent un dessin écaillé sur le vertex alors que d'autres ont le vertex de couleur uniforme (les deux sont valables). Dessin en forme de fer à cheval brunâtre sur les joues. <u>Lorums et régions auriculaires</u> : Brun foncé nuancé de rose. <u>Bas de la nuque</u> moins rouge et plutôt brunâtre.
Dos.	<u>Manteau et scapulaires</u> : Moins rouge que la poitrine mais plutôt rouge brunâtre.
Poitrine.	Brun rougeâtre.
Flancs.	Brun rougeâtre.
Ventre.	Blanc grisâtre ainsi que la région anale.
Ailes.	<u>Rémiges primaires</u> : De couleur noir brunâtre avec un étroit liseré rouge brunâtre le long du vexille externe. Le bout des rémiges possède un bord grisâtre. Couvertures sus alaires de couleur brun foncé. Les petites et les moyennes couvertures sus alaires ont un bord rougeâtre.
Queue.	<u>Rectrices</u> : De couleur noir brunâtre avec un étroit liseré rougeâtre. <u>Sous-caudale</u> : Grisâtre avec un dessin écaillé (forme de V).
Pattes. Doigts.	brun foncé.
Ongles.	Noirs.

4.13.3 Bec croisé des sapins Femelle (*Loxia curvirostra*)

Phénotype ancestral



FIGURE 179 – Bec croisé des sapins Femelle. Photo H. Heinzel.

Remarques : La femelle possède les mêmes marques que le mâle, mais la couleur de presque toutes les parties du corps est vert olive grisâtre.

La femelle est plus striée de brun dans l'ensemble que le mâle, notamment sur la tête, la poitrine, le dos et les flancs. Le croupion est jaune verdâtre.

La femelle possède un dessin frontal typiquement gris clair.

129

129. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.

4.13.4 Bec croisé bifascié (*Loxia leucoptera*)



FIGURE 180 – Bec croisé bifascié Mâle. Photo H. Heinzel.



FIGURE 181 – Bec croisé bifascié Femelle. Photo H. Heinzel.

4.13.5 Bec croisé bifascié Mâle (*Loxia leucoptera*)

Phénotype ancestral



FIGURE 182 – Bec croisé bifascié Mâle. Photo M. Gottschling.

130

Taille du corps : 14,5 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Couleur corne, assez long. Les mandibules se croisent à l'extrémité de façon très distincte.
Yeux.	Noirs.
Tête.	Entièrement rouge carmin, légèrement écaillée avec la zone loreale et le dessin des joues gris. Le sommet du crâne et la nuque portent une légère suffusion grise.
Dos.	Rouge carmin, voilé de gris et faiblement écaillé.
Gorge. Poitrine.	Rouge carmin.
Flancs.	Rouge carmin indistinctement lavé de gris.
Ventre.	Rouge carmin, se dégradant en blanc sale sur la zone anale.
Ailes.	Rémiges : Noires, liserées de blanc. Les <u>rémiges secondaires externes</u> sont plus largement liserées, surtout à leur extrémité. <u>Couvertures</u> : Noires avec une nette bordure blanche, qui dessine une double barre alaire très nette.
Croupion.	Rouge carmin, légèrement écaillé sur son pourtour.
Sous-Caudales.	Porte un dessin écaillé typique, qui doit être régulier.
Queue.	Assez courte, légèrement échancrée. <u>Rectrices</u> : Noires, très finement liserées de grisâtre.
Pattes.	Gris brun. Robustes et assez courtes.
Doigts.	Gris brun.
Ongles.	Couleur corne.

4.13.6 Bec croisé bifascié Femelle (*Loxia leucoptera*)

Phénotype ancestral



FIGURE 183 – Bec croisé bifascié Femelle. Photo R. Balestra.

Remarques :

La femelle possède les mêmes marques que le mâle, mais la couleur de presque toutes les parties du corps est vert olive grisâtre.

La femelle est plus striée de brun dans l'ensemble que le mâle, notamment sur la tête, la poitrine, le dos et les flancs. Le croupion est jaune verdâtre.

La femelle possède un dessin frontal typiquement gris clair.

4.13.7 Bec croisé perroquet (*Loxia pytyopsittacus*)



FIGURE 184 – Bec croisé perroquet Mâle. Photo H. Heinzel.



FIGURE 185 – Bec croisé perroquet Mâle (*Loxia scotica*). Photo H. Heinzel.

4.13.8 Bec croisé perroquet Mâle (*Loxia pytyopsittacus*)

Phénotype ancestral



FIGURE 186 – Bec croisé perroquet Mâle. Photo P. Rocher.

Défauts :

- 1) Manque d'uniformité dans la couleur,
- 2) Bec défectueux,
- 3) Stries trop fondues ou irrégulières chez la femelle.

Taille du corps : 17 cm.

Zone du plumage	Couleur
Bec.	Couleur corne, puissant, de forme assez lourde. Les extrémités des mandibules se croisent de façon plus courte que chez le bec croisé des sapins.
Yeux.	Noirs.
Tête.	Large, puissamment enchâssée dans les épaules. <u>Front et vertex</u> : De rouge carmin à rouge brique. <u>Lorums et nuque</u> : Voilés de brun. <u>Dessin des joues</u> : Brun.
Dos.	Rouge, fortement mêlé de brun et portant un léger dessin écaillé.
Gorge.	Rouge carmin à rouge brique uni.
Poitrine.	Rouge plus ou moins voilé de brun.
Flancs.	Rouge brunâtre.
Ventre.	Blanc grisâtre, légèrement strié sur les côtés.
Ailes.	<u>Rémiges</u> : Brun noirâtre, portant un étroit liseré plus clair. <u>Grandes couvertures</u> : Bordées de brun rougeâtre.
Croupion.	Rouge carmin à rouge brique.
Sous-Caudales.	Porte un dessin écaillé typique qui doit être régulier.
Queue.	Courte, échancrée. <u>Rectrices</u> : Brun noirâtre, étroitement bordées de brun.
Pattes.	Couleur corne, courtes et robustes.
Doigts.	Couleur corne.
Ongles.	Brun noir.

4.13.9 Bec croisé perroquet Femelle (*Loxia pytyopsittacus*)

Phénotype ancestral

Taille du corps : 17 cm.



FIGURE 187 – Bec croisé perroquet Femelle. Photo P. Rocher.

Remarques : La femelle présente le même dessin que le mâle.

Le rouge est remplacé par une teinte brun olive plus lumineuse à la poitrine et au croupion.

Les stries sont plus marquées.

132. Standard COM/OMJ Édition 2014. Mise à jour partielle CNJF le 10 mars 2024.